

**OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM
VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI**

Biologiya kafedrası



SITOLOGIYA

Bilim sohasi:	100000-Gumanitar fanlar
Ta'lim sohasi:	140000 –Tabiiy fanlar
Ta'lim yo'nalishi:	5140100-Biologiya

Guliston -2017

Sitologiya fanidan o'quv-uslubiy majmua O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 18.08. 2017 yil tasdiqlangan. Sitologiya fani namunaviy dasturi (№ BD – 5140100- 3.12) asosida tayyorlangan.

Tuzuvchi:

N.A.Ablakulova GulDU Biologiya kafedrası o'qituvchsi.

Taqrizchi:

A.Pozilov GulDU Biologiya kafedrası professori, biologiya fanlari doktori,
professor.

O'quv-uslubiy majmua Guliston davlat universiteti Kengashi tomonidan ko'rib chiqilgan va o'quv jarayonida qo'llashga tavsiya etilgan (2017 yil "____" ____dagi "____" sonli bayonnoma).

MUNDARIJA

I.	MODUL-1: Sitologiyaning predmeti va vazifalari.....	5
II.	MODUL-2: Hujayra tiplari.....	12
III.	MODUL-3 Sitoplazma va hujayraning vakulyar tizimi.....	14
IV.	MODUL-4: Mitoxondriyaning tuzilishi va vazifalari.....	19
V.	MODUL-5: Hujayra plastidalari, guruhlari, ultrastrukturaviy va kimyoviy tuzilishi.....	21
VI.	MODUL-6: Plastidalar va ularda fotosintez jarayoning amalga oshishi ...	25
VII.	MODUL-7: Endoplazmatik retikulum.....	28
VIII.	MODUL-8: Goldji apparati	31
IX.	MODUL-9: Lizosomalar.....	34
X.	MODUL-10: O'simlik hujayrasi vakuolasi.....	37
XI.	MODUL-11: Membranaga ega bo'lmagan organelalar.....	40
XII.	MODUL-12: Hujayra yadrosi	44
XIII.	MODUL-13: Hujayra reproduksiyasi. Mitoz va Meyoz.....	50
XIV.	MODUL-14: Xromosomalarning morfologiyasi va vazifasi	63
XV.	MODUL-15: Xromosomalarning mutasiyalarga uchirishi va uning oqibatlar.....	69
XVI.	MODUL-16: Hujayraning qayta tiklanishi va umrining davomiyligi.....	72
XVII.	MODUL-16: Amaliy mashg'ulotlar.....	78
XVIII.	MUSTAQIL TA'LIM	128
XIX.	GLOSSARIY	130
XX.	NAMUNAVIY VA ISHCHI DASTUR	134
XXI.	TEST	144
XXII.	NAZORAT SAVOLLARI	146
XXIII.	ADABIYOTLAR RO'YHATI	147

MA'RUZALAR KURSI
MODUL-1: Hujayra haqida umumiy ma'lumotlar.
Ma'ruza: Kirish. Sitologiya faniga kirish.

Reja:

1. Sitologiya fanining mazmunini
2. Sitologiya fanini o'rganish metodlari
3. Sitologiya fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan dunyo va O'zbekistonlik olimlar

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Sitologiya, sitologik metodlar, mikroskop, hujayra, organoidlar, o'simlik va hayvon hujayralari, gistologiya.

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Sitologiya hujayra haqidagi fan ekanligi, uning bo'limlari, qaysi fanlar bilan aloqadorlik borligi va rivojlanishini to'g'risidagi tushunchani hosil qilish.

1- savol bayoni: **Sitologiya** - tirik materiyaning tuzilishini elementar birligi bo'lgan hujayralarning kelib chiqishi, ishlashi va qayta tiklanishi haqidagi fanidir. U hujayralarning strukturasini, protoplazmaning nozik tuzilishini, undagi hayotiy protsesslarni sodir bo'lishini o'rgatadi. Sitologik tekshirishlarning ob'ektlari ko'p hujayrali organizmlarning hujayralari bakterial hujayralar, sodda hayvon - hujayralardir.

Ko'p hujayrali organizmlarning hujayralari to'qimalarning tarkibiga kiradi, ularning hayot faoliyatlari bir butun organizmni muvofiqlashtiruvchi ta'sirga bo'ysunadi. Bakteriya, sodda hayvonlarda "hujayra" va "Organizm" tushunchalari bir-biriga mos keladi; bunda biz mustaqil hayot kechira oladigan hujayra-organizmlar to'g'risida gapirishga xaqimiz. Bir hujayrali organizmlar olamida turli yashash muxitiga moslashgan bo'lgan juda xilma-xil formalar mavjud. Hujayra - organizmlar orasida biz juda murakkab tuzilgan va ancha sodda tuzilgan, geterotrof va autotrof, erkin yashovchi va parazit, suvda va quruqlikda yashovchi va boshqa formalarni uchratamiz. Tirik tabiat taraqqiyotida ko'p hujayralilarni kelib chiqishi organizmlarni ularning hujayralari o'rtasida funksiyalarni taqsimlanishi hisobiga moslanish uchun yangi imkoniyatlarni paydo qildi. Funksional mutaxassislashish natijasida juda ko'p xil to'qima hujayralari vujudga keldi. Masalan, sut emizuvchilar tanasida diametri 6-8 mk keladigan va shaklini doimo o'zgartirib turadigan kichik limfotsitlar bilan birga uzunligi xattoki 1 metr va undan ham ortik o'simtalarga ega bo'lgan nerv hujayralari bo'ladi.

Hujayrani tashkil bo'lishidagi filogenetik protsesslar asta-sekin murakkablashishning uzoq yo'li bosib o'tildi. Hozirgi vaqtda juda ko'p bakteriya va ko'k-yashil suv o'tlarining orasida tipik yadro va umumhujayraviy organoidlar kompleksiga ega bo'lmagan turlari uchraydi. Ammo bularda ham yadroning asosini tashkil etuvchi DNKning oqsil bilan birikmasi bo'ladi. Bu esa, yadro sitoplazma sistemalarini shakllanishini ba'zi oraliq stadiyalarini progressiv rivojlanishiga qobiliyatli ekanligiga guvohlik beradi. Bakteriya va ko'k-yashil suv o'tlarida shakllangan yadro bo'lmasada, ularni sitologiyada o'rganilishi zarur.

Viruslarga kelsak, ularni sitologiyani ob'ektlari qatoriga kiritishga asos yo'q. Chunki viruslarni strukturalari bilan hujayralarning tuzilishi o'rtasida umumiylik yo'q. Ular hujayraning hayot faoliyatini bioximik asosini tashkil qiluvchi fermentlarga ega

emas, shuning uchun o'zlarining modda almashuviga ega emas. Viruslarning o'sishi va ko'payishi faqat ular kiradigan hujayralarning fermentativ sistemasi faoliyati hisobiga amalga oshadi.

Hujayra, barcha tirik sistemalar kabi biologik evolyutsiya natijasida tug'ilgan, taraqqiy etayotgan, o'zining bir - butunligini ushlab turuvchi va qayta tiklovchi, tashqi muxitdan kelgan energiya va moddalar hisobiga ko'paya oladigan sistema hisoblanadi. Bundan ko'rinadiki hujayrani o'rganishda 3 ta asosiy problema-evolyutsiya, avtoregulyatsiya va avtoreproduksiyalarni hal qilishni ko'zda tutish kerak.

Biologiyani har qanday bo'limi tirik ob'ektlarning faqat ma'lum bir aspektda-morfologik, fiziologik, bioximik, genetik va boshqalarda o'rgansa, siologiya o'z ob'ekti- hujayrasini har tomonlama o'rganadi.

Hujayra barcha yashayotgan organizmlarning struktura, funksional va genetik asosi bo'lgani uchun hamma biologik fanlar sistemasining markazida bo'ladi. Sitologiya tirik tabiat xaqidagi fanning "Og'ir industriyasi" bo'lib, uning qay darajada taraqqiy etganligiga, biologiya, meditsina va qishloq xo'jaligining muhim muammolarini ishlab chiqishdagi muvaffaqiyatlariga bog'likdir.

Sitologiyaning metodlari va ma'lumotlaridan foydalanmay havfli o'sma, yaralarni bitib ketishi, nurdan zararlanish mexanizmlari, dorivor va zaharli moddalarni ta'siri, imunitet, gibridlashda pushtsizlik va boshqa amaliy jihatdan muhim muammolarni hal qilish mumkin emas.

Sitologiya mustaqil fan sifatida o'tgan asrning oxirida paydo bo'lsada, hujayra xaqidagi ta'limot XVII asrdan boshlangan. Sitologiyaning rivojlanishi mikroskopning kashf qilinishi uni takomillanishi bilan bog'lik bo'lgani uchun, sitologik tekshirishlarning material bazasi bo'lib xizmat qilgan texnik muvaffaqiyatlarga to'xtalish zarur.

2- savol bayoni: Sitologiya metodlari:

1. **Mikroskopiya** - eng asosiy metodlardan biridir. Turlari: MBR1, MBR3, MBI6, MBI11, MVBG, MBY3, MBI15, ME51, MBS1", MBS2, MBS3, MR Ergaval, Ampival, «Biolam -70», qora fondagi, yorug'lik mikroskopidan foydalanish, fazokontrastli, interfrension, fluoressent, polyarizasion, ul'trabinafsha va elektron mikroskoplar.

2. **Sitofizik tekshirish metodlari-** Rentgenstruktura analizi. Bu metod rentgen nurlari yordamida anorganik va Organik kristallarni, oqsil molekulalarining tuzilishini, nuklein kislotalar atomini, shuningdek gemoglobin, mioglobin, DNK kollagen va boshqalarning molekulyar struktura sini o'rganishda keng qo'llanilmoqda. Sitologik ob'ektlarni o'rganishda — fluoressent yoki lyuminessent mikroskoplar ham qo'llaniladi. Radioavtografiya — sitoximiyaning muhim metodlaridan biri bo'lib, radioaktiv izotoplarning qo'llanilishiga asoslangan. Bu metod bilan oqsillar, nuklein kislotalar biosintezi hujayra qobig'ining o'tkazuvchanligi, hujayrada moddalar to'planishi o'rganiladi.

3. **Ultrastruktura metodlari-** Polyarizasiy mikroskop yordamida hujayra strukturasidagi barcha komponentlarni jumladan, miofibrilalari, axromatin iplarini epitelii hujayralarining tebranuvchi kiprikchalarini kuzatish va o'rganish mumkin.


4. Bioximiyaviy tekshirish metodlari- Bu metod yordamida hujayradagi anorganik va organik moddalarni aniqlash mumkin. Buni o'zi bir necha metodlarga bo'linadi: Miqdoriy analiz metodi, Ajratilgan hujayra struktura sini o'rganish metodi.

5. Hujayra gomagenatlarni fraksiyalash- Ultrasentrifuga usullarida foydalaniladi

6. Sitoximiyaviy metod- bu metod o'z oldiga hujayra strukturasininig kimyoviy tuzilishini maqsad qilib qo'yadi.

7. Tirik hujayralarni tekshirish metodlari- bir necha tarmoqlarga bo'linadi: to'qimalar kulturası metodi, hujayra klonini olish metodi, to'qimalarni o'stirish, tirik hujayralarni bo'yash metodlari. Tirik hujayralarni va to'qimalarni mikroskopda tekshirish har xil maqsadlar uchun qo'llaniladi: hujayralarni har xil tashqi ta'sirlarda o'zgarishini o'rganish uchun, hujayradagi modda almashinishini qonuniyatlarini ochish uchun, hujayraviy tuzilishlarni o'rganish uchun, sitoplazmani okishini, hujayrani o'tkazuvchanligini bilish uchun va boshqalar uchun.

Tirik hujayralarni o'rganish uchun maxsus preparatlar tayyorlanadi. Mayda organizmlar predmet oynasiga bir tomchi suv bilan birga qo'yiladi, ustidan yopgich oyna bilan yopiladi va mikroskopda tekshirilaveradi.



8. Mikroinosyomka metodi- Bu metod ham ancha qulay hisoblanib, keng tarqalgandir. Hujayralarni va uning organoidlarini alohida-alohida rasmga tushrib o'rganishlar olib boriladi. Tirik ob'ektlar tadbiq qilinayotganda tuzilmalarni mikroskop ostida suratga olish alohida o'rin tutadi. Bu usul hujayralarda ketayotgan jarayonlarni normal, sekinlashgan, tezlashgan holda kinoga olishga imkon beradi. Buning uchun Sey-


traffer qurilmasidan foydalaniladi. U xoxlagan intervallarda suratga olish uchun xizmat qiladi. Uzoq dabom etadigan jarayonlarniekranda qisqa muddatda kuzatish uchun kinoga olinayotganda kamroq kadrlar qilinadi. Masalan: 1 minutda bitta kadr va hokazo. Natijada odatiy holatda 10 soat ketadigan jarayon ekranda 5-6 minutda kuzatish mumkin

9. Mikroxirurgiya metodi- Birinchi mikrooperasiya xayvonlar organizmi ustida o'tkazilib, bunda lupa yoki preparoval ignadan foydalanilgan holos. Mikrooperasiya hujayralarda qo'l yordamida murakkab asboblarsiz bajarilmoqda. Masalan bunga bir hujayrali ayrim suvo'tlar, amyoba va info'zoriyalar hujayra yadrosini boshqa organizmlarga ko'chirib o'tkazish misol bo'la oladi.

Kichik o'lchamli hujayralarda mikrooperasiya mikromanipulyator kashf qilingandan keyingina takomillashaboshladi. Mikromanipulyatorning bir necha xili yaratilgan. Xozirgi vaqtda eng murakkab mikroxirurgiya operatsiyalari qilina boshlandi. Bunda yadro, yadrocha va sitoplazma organoidlarini boshqa organizmlarga ko'chirib o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Masalan, bir amyoba yadrosi ikkinchi amyobaga, info'zoriya makronukleusi biridan ikkinchisiga ko'chirib o'tkazilmoqda. Yadroni ko'chirib o'tkazish sitoplazma va yadrodagi o'zgarishlarni, yadrosiz hujayraning funksiyasini ona hujayra yadrosi va sitoplazmasidagi muayan irsiy belgilarning qiz hujayralarga berilishi kabi masalalarni yechishga yordam beradi.

3- savol bayoni: Hujayra haqidagi ma'lumotlar XVII asrdan boshlangan. Sitologiya fanining rivojlanishi mikroskopning kashf etilishi bilan bog'liq. Uzoq yillar davomida birinchi mikroskop Gollandiyalik olimlar **Gans** va **Zahariy Yansenlar** tomonidan kashf etilgan deb qaralardi. Aslida birinchi mikroskopni **Galiley** tomonidan 1609-1610 yillarda ixtiro qilindi. **Batssi** tomonidan bu mikroskop silliqlandi. Keyinchalik 1617-1619 yillarda Angliyalik fizik va astrolog **Kornelius Drebel** tomonidan mikroskopning yangi modeli ishlendi. 1624 yilda **Galiley** o'z mikroskopini qayta ishladi, va u 30-40 marta kattalashtirib ko'rsatadigan bo'ldi. **Galileyning** mikroskopidan foydalanib 1625 yilda **Stelutti** hashorotlarni ko'zini fasetali tuzilishini ochdi. 1628 yilda **F.Chezzi** esa paprotniklarni sporangiysini o'rgandi.

Birinchi mikroskopik tajribalarni har tomonlama olim (fizika, astronomiya, geologiya, biologiya) London Qirollik jamiyatining kotibi Robert Guk (1635-1703) olib bordi. R.Gukning mutaxassisligi fizik edi. U mikroskopni texnik jihatdan takomillashtirdi. Uning mikroskopi 3 elementdan: yig'uvchi linza (kollektor), okulyar linza va ob'ektiv linzalardan tuzilgan.



Modul-1. Sitologiya faniga kirish

1.1.1-rasm. R.Guk yasagan mikroskop va yorug'lik mikroskopi

R.Guk mikroskop yordamida o'simlik hujayralarini o'rgangan. Po'kaklarni ko'ndalang kesimini mikroskop ostida tekshirib, uni yopiq pufakchalardan iboratligini ko'rdi va u (sellula) hujayra so'zi bilan ataydi va o'zining 1665 yildagi "Mikrografiya" nomli kitobida ifodalaydi.

R.Guk o'simlik to'qimalarini hujayralardan tuzilganligini aniqlaydi. Aynan shu hulosa bu sohadagi keying yo'nalishlarni aniqlab berdi.

Keyinchalik italiyalik **M. Mal'pigi** (1671), angliyalik **N. Gryu** (1673, 1682) o'simlik organizmlarining hujayra tuzilishini o'rgana boshlaganlar. Hujayralar ichini pufakcha yoki xaltachalar to'lg'azib turishini va ular gomogen suyuqlik ichida joylashganligini ko'rsatganlar. XVII asrning oxirida golland olimi **A. Levenguk** 200 marta kattalashtirib ko'rsatadigan linza yasab, mikroskopni takomillashtirdi. U turli o'simlik va xayvon hujayrasidagi yadroni ko'rishga muvaffaq bo'ldi, biroq u yadroni hujayraning mustaqil organoidi sifatida ajratib ololmadi. Angliyalik **Robert Broun** 1833 yili arxideya o'simligining hujayra yadrosini birinchi marta har tomonlama o'rgandi va u hujayraning asosiy komponentlaridan biri ekanligini isbotlab berdi. Mikroskop terminini fanga birinchi bo'lib **Iogan Faber 1625** yilda ishlatdi.

Hujayra tuzilishi xaqidagi ta'limotning yaratilishida rus olimi **P. F. Goryaninovning** xizmati katta. U 1827 yilda o'simlik hujayrasining tuzilishini bayon qilib berdi. 1838-1839 yillarda **Shvan va Shleyden** hujayra nazariyasining yaratilishiga asos soldi. 1848 yili **Gofmeystr** tradeskansiyning onalik hujayralarida xromosomalar shaklini chizgan va birinchi marta xromosomalarga asos solgan. 1876 yili **Van Beneden** va 1888 yili **Boveri** hujayra markazini, 1894 yili **Benda** mitoxondriyani, 1898 yili **Gol'dji** Gol'dji apparatini kashf qildilar. 1882 yili **Flemming** xayvon hujayralarida, **Strasburger** o'simlik hujayralarida xromosomalarni aniqladi. «Xromosomalar» terminini 1888 yili nemis olimi **Val'deyer** fanga kiritdi.

Amitozni 1841 yili xayvonlarda **Remak** o'simliklarda 1882 yili **Strasburgerlar** kashf qilganlar. Strasburger 1875 yili o'simlik hujayralarida mitozni sistemali isbotlab berdi. Nemis embriologi **V. Ru** barcha o'simliklar bilan xayvonlar hujayrasining bo'linishi umumiy ekanligini isbotlab berdi. **Strasburger** 1884 yili profaza, metafaza, anafaza terminini **Lauaze, Geydengayn** esa 1894 yili telofaza terminini fanga kiritdilar. 1884 yilda **Van Beneden** reduksion bo'linish (meyoz)ni kashf qildi. **Former va Mur** esa bu terminni 1905 yili fanga kiritdi.

A. Levenguk XVII-asrning to'rtinchi yirik mikroskopisti edi. Uning mutaxassisligi savdogar bo'lib, umrining deyarli 50 yilini mikroskop ostida mayda organizmlarni kuzatishga bag'ishladi va 1680 yilda London Qirollik jamiyati (Hozirgi fanlar akademiyasiga o'xshaydi) ga a'zo qilib saylandi. **Levenguk** o'z kuzatishlarini 1696 yilda "**Tabiat sirlari**" nomli asarda bayon qildi. U bir hujayrali organizmlarning boy olamini ochgan, hayvonlarning hujayralari – eritrotsitlar va spermatozoidlarni¹ ko'rgan birinchi olim bo'lgan. Lekin, **Levenguk** bu kuzatishlarini yetarlicha baholay olmadi va hayvonlarni hujayraviiy tuzilishlari xaqida xulosa chiqarmadi.

XVIII–asrda hayvon va odamning jinsiy hujayralari tekshirildi va murtakning boshlang'ich taraqqiyoti ozmi, ko'pmi bayon etildi. Gametalarning jinsiy ko'payishdagi ahamiyati umuman to'g'ri tushunilgan bo'lsada, tuxum hujayralari va spermalarning otalanish protsessidagi nisbiy roli ko'p tomonlama noaniq, ularning nozik tuzilishlari esa noma'lum bo'lib qoldi. Ko'pchilik olimlar, masalan, **A. Levenguk Svammerdam, Malpigi, Galler va Bonnelar** jinsiy ko'payishni moxiyatini yaxshi tushunmadilar. Ular jinsiy hujayralardan bulg'uvchi organizmning to'la tashkil topgan murtagi joylashgan bo'ladi deb, preformizm (preformare- avvaldan shakllangan) nazariyasini ilgari surdilar. Preformistlar ikki guruxga bo'linib, ulardan ba'zilar spermaning ichida (animalculare- animalkulistlar), qolganlari esa tuxum hujayraning ichida (obium-ovistlar) bo'lg'usi organizmning uni hamma organlari bilan tula tashkil topgan mayda Murtagi joylashgan deb hisobladilar, binobarin bu bilan ular individual taraqqiyotni qism va organlar kattaligini ortib borishiga tenglashtirdilar.

XVIII- asr o'rtalarida preformistlar orasida "**Joylab qo'yish nazariyasi**" tarqaldi. Bunga binoan eng birinchi urg'ochini tuxumdoniga u yaratilgan momentda barcha keyingi avlodlarini murtaklari joylab qo'yilgan bo'ladi. Hatto Italiya olimi **Antonio Vallisneri** (1661-1730) **Momo Havoning** tuxumdonida o'tgan hozirgi yashayotgan va kelgusi avlodlarni hammasini tayyor murtaklari joylab qo'yilgan deb hisobladi.

Bu nazariyaga qarshi o'laroq **Epigenezning** (epigenesis- keyin kelib chiqmoq) tarafdorlari fikricha butun qism va organlar embrional taraqqiyot protsessida yangidan kelib chiqadilar. Epigenez nazariyasining asoschisi va yirik namoyondasi Peterburg fanlar akademiyasining a'zosi **Kaspar Fridrix Volf** edi. U 1759 yilda 26 yoshida "**Kelib chiqish nazariyasi**" nomli asar yozib dissertatsiya yoqladi. **Volfning** hayvonlarni embrional taraqqiyoti ustidagi ishlari, turlarning o'zgarmasligini ko'rsatuvchi dalillardan biri sifatida foydalanilgan preformizm nazariyasining

¹ Odam spermatozoidini Levenguk rahbarligida ishlagan student Gamm 1675 yilda ochdi

asossizligini ishonarli qilib ko'rsatib berdi, Lekin **K.Volfning** ilmiy epigenez nazariyasi o'sha vaqtda rivojlanmay qolib ketdi. Taxminan 50 yildan keyin 1828- yilda Peterburg fanlar akademiyasining akademigi **Karl Maksimovich Ber** o'zining "**Xayvonlar taraqqiyoti tarixi**" asari bilan epigenezni yanada rivojlantirdi. Ber sut emizuvchilar va odamning tuxumini ko'rgan, uni rivojlanishini o'rgangan birinchi olim. Peterburg fanlar akademiyasi Berning 50 yillik ilmiy faoliyatini nishonlab, maxsus medal ta'sis etib, unga quyidagi so'zlar yozib qo'yildi: tuxumdan boshlab u odamga odamni ko'rsatdi.

XIX asrning boshlaridan o'simliklarning har xil organ va to'qimalarni hujayraviy tuzilishlarini ko'pchilik olimlar tasvirlashlari biologlarni hamma o'simliklar hujayralardan tashkil topgan deb asta-sekin ishonishiga olib keldi. Diqqatni "shilimshiq shira" deb ta'riflangan hujayraning ichidagi narsaga qaratila boshlandi.

Hujayra haqidagi ma'lumotlarni bizning o'zbekistonimizdagi olimlar ham o'zlarining tadqiqotlari bilan munosib darajada boyitdilar.

Z.P.Boganseva (1907-1987) lola o'simligining sitologiyasi bo'yicha tadqiqotlarni olib bordi. "Lolalar spermogenezi va uning kariosistematikasi uchun ahamiyati" (1937) "ko'knoridoshlar oilasidagi chatishmaslikni bartaraf etish" (1945), "Lolalar morfologiyasi, sitologiyasi va biologiya" (1962), "Qumli cho'llardagi sho'ralarning poliploidiyasi" (1970) nomli kitoblaridagi ma'lumotlar sitologiyani boyishiga munosib hissa qo'shgan.

V.A.Rumi o'z tadqiqotlari bilan sitologiya faniga munosib xissa qo'shgan olimlardan hisoblanadi. Uning "G'o'zaning spermatogenezi" (1964), "G'o'zaning changdonida topetum to'qimaning hosil bo'lishi va mohiyati" (1966) nomli asarlarida ayrim shuvoq, saksovul va g'o'za turlarining changlanishi, urug'lanishi, makro-mikrosporogenezi, erkak va urg'ochi gametofitlarini o'rganishga va shu asosda uning sistematika hamda embriologiyasiga oid embriologik belgilarni aniqlashga qaratilgan ilmiy izlanishlari sitologiya faniga qo'shgan munosib xissasi bo'ldi.

Sitologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlar o'zbekiston fanlar Akademiyasining ko'plab tarmoq institutlarida, ilmiy ishlab chiqarish markazida ko'plab olimlar samarali ishlarni olib bormoqdalar. Masalan **F.K.Komilova, V.P. Pechenisin, J.Yu.Tursunov, X.O.Berdiqulov, B.Sh.Ismoilxo'jaev, M.A.Qo'chqorv**larning olib borgan ilmiy tadqiqotlari sitologiyaga ham tegishli.

Respublikamizning oliy o'quv yurti milliy universitetda ham ko'p yillar davomida **I.A.Raykova** rahbarligida o'simlik hujayrasining tadqiqiga bag'ishlangan ilmiy ishlar ko'p amalga oshirilgan. Hozirgi davrda ham uning izdoshlari muvaffaqiyatli davom ettirishmoqda.

Nazorat savollari:

1. Sitologiya faniga qachon asos solindi? Hujayra haqidagi ma'lumotlar qachon boshlangan?
2. Hujayraviy shakillarning qanday xillari mavjud?
3. Viruslar sitologiyaning ob'ekti qatoriga kiradimi? Ha bo'lsa nega? Yo'q bo'lsa nima uchun? Izohlang.
4. Birinch mikroskop qachon kim tomonida kashf etildi?
5. Sitokinezning ma'nosi?
6. Sitologiya metodlari?
7. Mikrokinosyomkaning ahamiyati?

8. Hozirgi eng zamonaviy mikroskop?
9. Hozirgi zamon sitologiya fani vazifalari?
10. Sizningcha sitologiyani o'rganishda qaysi metod eng afzali? Nima uchun izohlang.

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- Hujayra nazariyasining yaratilish tarixi.
- O'simlik va hayvon hujayrasining o'xshashlik va farqli tomonlari.

Mavzuga oid adabiyotlar:

1. Ю. С.Ченсов. Общая цитология. М., Изд. МГУ, 1984
2. Билич Г.Л. Биология, Цитология, Гистология, Анатомия человека.
3. Т. В. Boyqobilov. v b Sitologiya T. O'qituvchi 1980 y.
4. I. Sottiboyev va v b O'simlik hujayrasi T. O'qituvchi.
5. I.Badalxodjaev, T.Madumarov Sitologiya. 2013.
6. Karp G . Cell and molecular biology. USA, 2013. – P. 850.

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-2: Hujayra tiplari to'g'risida umumiy ma'lumotlar

Ma'ruza: Hujayra tiplari

REJA:

1. Sitologiyaning tekshirish ob'ektlari
2. Prokariot hujayralar va eukariot hujayralar
3. Viruslar

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Sitologiya, prokariot, eukariot, virus, parenxima, prozinxima, hayvon, hujayra

1- savol bayoni: Sitologik tekshirishlarning ob'ektlari ko'p hujayrali organizmlarning hujayralari, bakterial hujayralar, sodda hayvon hujayralaridir.

Hujayra biologik faollikni asosiy birligi bo'lib u muhitda o'zini o'zi hosil qilish xususiyatiga ega. Unda hayotiy xususiyatlarning barcha hossalari jamlangan, sharoit yaxshi bo'lganda ularni o'zida saqlashi va avlodlarga o'tkazilishi mumkin.

Hujayralar bajaradigan vazifasi, joylashishiga ko'ra turlicha shakl va kattalikka ega: kichik limfositlar 4-7 mk, tuxum hujayralari 200 mk gacha va mushak hujayralari bir necha santimetrgacha boradi. Uzun va qisqa o'simtali nerv hujayralari o'zidan impuls o'tkazish xususiyatiga ega. Erkak jinsiy hujayrasi - spermatazoid bajaradigan funksiyasiga ko'ra xivchin tutadi.

Hujayralar turli kattalikka va shaklga ega bo'lishiga qaramay, ularning tuzilishi umuman o'xshashdir. Barcha hujayralar sitoplazma, yadro va hujayra qobig'idan tashkil topgan. Hujayraning barcha asosiy qismlari — sitoplazma oqsillar, yog'lar va uglevodlardan iborat. Protoplazmaning ti- riklik xususiyatlari undagi oqsil bilan bog'liqdir.

Sitoplazma — hujayraning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u hujayra pardasi va yadrosidan tashqari hujayraning barcha tarkibiy qismlarini o'z ichiga oladi. Sitoplazma

bir tomondan hujayra pardasi, ikkinchi tomondan esa yadro qobig'i bilan chegaralangan. Sitoplazmaning asosiy elementlari membranalar va donador tuzilmalardan iborat. Bular tuzilishi turlicha bo'lgan trofik, sekretor, pigment va boshqa kiritmalar, shuningdek, hujayra organellalaridir. Bulardan tashqari, hujayralarda maxsus organellalar, ya'ni tonofibrillalar, miofibrillalar va neyrofibrillalar uchraydi. Hamma organella va kiritmalar sitoplazmaning shaklsiz xususiy mod^{asi} — gialoplazmada yotadi. Sitoplazma termini «protoplazma» termini bilan bir xil tushunchani anglatmaydi.

2- savol bayoni: Tabiatda hujayraviy shakillarning **prokariot** va **eukariot** xillari mavjud. **Prokariot** hujayralar-juda ham mayda, 300-500 nm diametrga ega. Ularni morfologik ajratib turadigan yadrosi yo'q. Bunday hujayralarda membranali sistemalar, hujayra markazi bo'lmaydi. Genetik apparat halqali xromosomadan iborat, u asosli oqsil gistonlarni tutmaydi. Ular uchun hujayra ichi harakati va amyobaoid harakatlanish harakterli emas. Bunday hujayralar mitoz yo'li bilan bo'linmaydilar. Bu tip hujayralarga bakterialar va ko'k-yashil suv o'tlari kiradi.[1]

Eukariot – hujayralar tuzilishi 2 xil bo'ladi. Ulardan birinchisi bitta hujayradan tashkil topadi va fiziologik jihatidan to'liq qimmatli individ hisoblanadi. Shu munosabat bilan ularda organlar vazifasini bajaradigan mayda tuzilmalar bo'ladi.

Eukariot hujayralar ichidagi strukturalarning yuqori darajada tashkillanishi kompartmentalizatsiya yo'li bilan amalga oshadi. Kompartamentlarni shakillanishida biologik membrana muhim rol ni egallaydi. Eukariot hujayralarda kompermentalizatsiya tufayli barcha strukturalar o'rtasida vazifalar taqsimoti amalga oshadi. Shu bilan birga turli organellalar bir-birlari bilan muayyan aloqada bo'ladi.

Bakteriya hamda sodda hayvonlarda "hujayra va organizm" tushunchalari bir biriga mos keladi bunda biz mustaqil hayot kechira oladigan hujayra organizmlar to'g'risida gapirishga haqlimiz. Bir hujayrali orhanizmlar olamida turli yashash muhitiga moslashgan juda murakkab shuningdek ancha sodda tuzilgan *geterotrof* va *avtotrof*, *erkin* va *parazit*, *suvda* hamda *quruqlikda* yashovchi formalarni uchratamiz.

Ikkinchi hil eukariot hujayralarga **ko'p hujayrali** organizm hujayralaridir. Ular to'qimalarning muvofiqlashtiruvchi ta'siriga bo'ysingan holda tashkillanadi va vazifa bajaradi. Hujayralarning tashkil bo'lishidagi filogenetik jarayonlar asta-sekin murakblashishning murakkab yo'lini bosib o'tdi. Hozirgi vaqtda juda ko'p bakteriya va ko'k yashil suv o'tlarining tipik yadro va umumkompleks organoidlarga ega bo'lmagan turlari uchraydi. Ammo bularda ham yadroni asosini tashkil etuvchi DNK ning oqsil bilan brikmasi bo'ladi. Bu esa yadro va sitoplazma tizimlari shakillanishining ba'zi oraliq bosqichlarini progressiv rivojlanishiga olib keladi. Bakteria va ko'k-yashil suv o'tlarida shakillangan yadro bo'lmasada ularni sitologiyada o'rganish zarur.

3- savol bayoni: **Viruslar-** sitologiyaning ob'ektlari qatoriga kiritishag asos yo'q, chunki ular o'rtasida umumiylik yo'q. Ularda hujayra hayot faoliyatini biokimyoviy asosini tashkil qiluvchi fermentlar bo'lmaydi. Shu sababli o'zlarining modda almashinuviga ega emas. Viruslarning o'sishi va ko'payishi hujayralarning fermentativ sistemasi faoliyati hisobiga amalga oshadi. Viruslar ham hujayralar kabi ikki asosiy komponentdan – nuklein kislotalar va oqsillardan tashkil topgan. Lekin shunga qaramay ularni materiya uyushmasining hujayraviy shakli deb bo'lmaydi.

O'simlik hujayrasining shakli va o'lchamlari judayam turli tuman va o'simlikning qaysi qismida bajaradigan vazifasiga bog'liq, tig'iz joylashgan hujayralar o'zaro tiqilishib joylashganligidan ko'p hollarda ko'p qirrali bo'ladi. Odatda ko'p qirralisi 4-6 burchakdan iborat 14 qirrali. shuning uchun kesmalarda 4-6 qirrali ko'rinadi. Alohida o'sayotgan hujayralar yumaloq, lappaksimon, yulduz, g'o'la shakllarga ega bo'lishi mumkin. uzunligi va eni ko'p farqlanmaydiganlarni *parenxima* hujayralar deb atalib voyaga yetganida odatda tirik bo'ladi. Bargda va ho'l mevalarda ko'p hollarda parenxima hujayralari ko'p.

O'simlik tanasidagi hujayralar ko'pincha ma'lum yo'nalishda siqilganligidan ancha cho'zilgan bo'ladi. Ularni *prozenxima* hujayralar deyiladi. Ikki uchi cho'ziq, bunday hujayralar yog'ochlik uchun hos bo'lib voyaga etganida o'lik holda bo'ladi. O'simliklardagi voyaga yetgan hujayralar huyvondagilardan farqlanib deyarli hamma vaqt doimiy o'zgarmas shaklga ega bo'ladi, bu ularning qattiq po'sti bilan izohlanadi.

Hujayraning katta-kichikligi ma'lum chegaralarda va u o'simlikni turkumi va hujayra tipigi bog'liq. o'simlik hujayrasi juda kichkina, uni mikroskop orqali ko'rish mumkin holos. Murakkab tuzilgan o'simliklarda ularning kattaligi 10-100 mkm (ko'pincha 15-60 mkm keladi). Suv g'amlovchi va oziq moddalar tutgan hujayralar, masalan kartoshka tuganagining parenxima hujayralari, ho'l mevalarning hujayralari odatda katta bo'ladi. Pishgan tarvuz, limon, apelsin, mandarinlarning yumshoq etini hujayralari ancha katta, bir necha millimertgachaligidan ularni shunday ko'rish mumkin. Ayrim prozenxima hujayralar masalan, kanopning lub tolasida 40 mm, qichitqio'tda esa hatto 80 mmga yetsa ham ko'ndalang kichkinaligicha qoladi.

Nazorat savollari:

1. Hayotning tuzilish darajalari
2. Prokariotlarga misollar keltiring. Biologik ahamiyati
3. Eukariot organizmlarchi?
4. Viruslarning o'ziga hosligi
5. Hujayra shakillari?
6. Hujayra shakillari nimalarga bog'liq?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

1. Hujayra tiplari
2. Nima sababdan hozirgi prokariot hujayralar saqlanib qolgan? Rivojlanmagan?

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-3: SITOPLAZMA.

MAVZU: HUYAYRANING VOKULYAR TIZIMI

REJA:

1. Tashqi sitoplazmatik membrana.
2. Membranali strukturalarning birlashash harakterlari
3. Fagotsitoz va pinotsitoz.

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Membrana, hujayralarning bir-birlari bilan birlashishi, o'simlik hujayrasi qobig'i, fagotsitoz, pinotsitoz

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Hujayralarning membranasi tuzilishi, vazifalari va ahamiyati to'g'risida tushuncha hosil qilish

1-savol bayoni: O'tgan asrlardayoq yorug'lik mikroskoplari yordamida o'simlik hujayralarini qalin qobig'ini, ko'pchilik sodda hayvonlarning zich kutikulasini ko'rishga erishilgan edi.

Ammo, elektron mikroskopik tekshirishlarni ko'rsatishicha bunday strukturalar tashqi sitoplazmatik membrananing qo'shimcha qismlari ekan holos. Ular juda ko'p hayvon hujayralarida bo'lmaydi, natijada ko'p vaqtgacha ularda qobiqning bor-yo'qligi muammo bo'lib keldi, uni yorug'lik mikroskoplarida ko'rib bo'lmadi.

Elektron mikroskopik tekshirishlar barcha o'simlik va hayvon organizmlarining har qanday hujayralari, bakteriya va sodda hayvonlar juda yupqa sitoplazmatik membrana yoki plazmolemma deb ataluvchi tashqi qobiqqa ega ekanligini ko'rsatdi. Bunday qobiqning qalinligi 75 A atrofida bo'ladi va uning yorug'lik mikroskoplarida ko'rinmasligi tabiiydir.

Tashqi sitoplazmatik membrana doimo 3 qavatdan tashkil topadi. Tashqi va ichki qavatlar bir qator joylashgan oqsil molekulalaridan, o'rta qavat esa, ikki qator joylashgan lipid molekulasidan iborat bo'ladi. Har bir qavatning qalinligi taxminan 25 A dir. Membrananing bunday tuzilishini birinchi bo'lib J. Daniyelli (1934, 1952) aniqlagan. Keyinchalik 3 qavatli membrana, elementar membrana deb ataldi. Bu birinchi marta aksonlarni miyelinli qobig'ini tekshirishda (Shvan hujayralarida) aniqlandi.

Elementar membrana ko'pchilik o'simlik va hayvon hujayralarida, sodda hayvonlarda va bakteriyalarda ham topildi. Shuning uchun elementar membrana hamma organizmlar hujayralari uchun xos bo'lgan biologik strukturadir.

Ammo, N.Sharon (1970) bakterial hujayraning zich-mustaxkam qobig'ini aminokislota va qandlarni qoldigidan iborat bitta gigantik molekuladan tashkil topgan deb faraz qiladi. Ana shu qobiq juda yupqa plazmolemmanni qoplab olib, uni ximoya qiladi.

Ba'zi hujayralarda elementar membrana yagona qobiq shaklida bo'ladi. Masalan, qonning shaklli elementlarini, jigar, oshqozon osti bezi, buyrak, ichak epiteliysi, teri, muskul hujayralarini, amyobani va boshqalarni qobiqlarini keltirish mumkin.

Lekin ko'pchilik hujayralarda tashqi qobiq bir necha elementar membranadan tashkil topgan bo'lib, murakkabroq tuzilishga ega. Bunga aksonning miyelinli qobig'ini misol qilish mumkin. Elektron mikroskopik tekshirishlarni ko'rsatishicha u bir-biriga juda zich joylashgan elementar membranalar naboridan iborat ekan.

Sodda hayvonlarning qobig'i-pellikula ham bir-biridan unchalik uzoq bo'lmagan oraliqda joylashgan bir necha elementar membranadan tashkil topgan bo'ladi.

Keyingi yillarda olib borilgan elektron mikroskopik tekshirishlar hujayra organoidlaridan endoplazmatik tur, mitoxondriy, lizosomalarning ham tashqi

sitoplazmatik membranaga egaligini ko'rsatdi. Bu esa, hujayraning membranali strukturalarining tuzilishini birligidan dalolat beradi.

Sitoplazmatik membranani hujayralarning bo'linishida va boshqa protsesslarda hosil bo'lishi xaqida quyidagicha tasavvurlar bor: elementar membrana sitoplazmada, qandaydir organoidlarda yoki yadroda odatda yangidan hosil bo'lmaydi; har bir yangi membrana hujayrada avvaldan mavjud bo'lgan membrana asosida yoki matritsa bo'lib xizmat qiladigan membranani qoldig'idan kelib chiqadi.

Sitoplazmatik membrananing funksiyasi.

Tashqi sitoplazmatik membrana juda ko'p muhim biologik funksiyalarni bajaradi. Ulardan biri shuki, membrana hujayra bilan tashqi muxit o'rtasidagi doimiy modda almashinuvini tartibga solib turadi. Bu uning o'tkazuvchanlik xususiyatiga asoslangan. Hozirgi vaqtda membrana juda mayda teshikchalarni-poralarni mavjudligi aniqlangan ($d=8\text{Å}$) ular orqali ma'lum kattaliklardagi ion va molekulalar o'tadi.

Tashqi membrana fermentativ aktivdir. Unda fosfataza gruppasiga kiruvchi fermentlar (ishkoriy fosfataza, ATP-aza) va moddalarni parchalab hujayraga kiraoladigan holga keltiradigan boshqa bir necha fermentlar topilgan. Sitoplazmatik membrana hujayraning ovqatlanishida faol qatnashadi. Bunda hujayra membranasini harakatchanligi, uning turli ko'rinishdagi har-xil o'simtalar hosil qilishi namoyon bo'ladi. Bu o'simtalar yordamida ovqatlik va boshqa qattiq donachalarni shuningdek, suyuqlikni mayda tomchilarini ushlaydi. Tashqi membrana hujayrani ichidagi narsalarni tashqi muxitdan ajratish bilan ximoya yoki mexanik rolni o'ynaydi. Membrananing eng muhim va o'ziga xos xususiyatlaridan biri qisman shikastlanganda oson va juda tez qayta tiklanishidir. Juda ko'pchilik hujayralarning yuzasida ularning funksional faoliyati bilan bog'liq bo'lgan har-xil strukturalar hosil bo'ladi. Masalan, ichak epiteliysi yuzasida juda ko'p bir-biriga yaqin joylashgan o'simtalar mikrovorsinkalar bor ($lq0,5-3\text{mkm}$, $dq500-1000\text{ Å}$) 2 ta mikrovorsinka oralig'idagi masofa 200 mkm dan ortmadi.

2- savol bayoni: Hujayralarning bir-birlari bilan birlashadigan joyidagi maxsus strukturalar.

Ko'pchilik to'qimalarning hujayralari (prizmatik epiteliy) bir-biri bilan maxsus mutaxassislashgan strukturalarsiz birikadi. Hujayralarning bir-biriga tegib turuvchi yuzalari "Sementlovchi" moddaning juda yupqa qavati hisobiga birikadi. Bu qavat oqsil va karbon suvlarni o'zida tutadi. Har xil epitelial to'qimalarni, tomirlarni endoteliyalarini, miokardni hujayralari bir-birlari bilan maxsus tuzilma desmosoma orqali birikadi. Har bir desmosoma yonma-yon turgan hujayraning yuzasini qalinlashishidan hosil bo'ladi. Bir birlari bilan yonma-yon turgan hujayralarni tashqi membranasini xech qachon qo'shib ketmaydi, ular odatdagi 3 qavatli strukturasini saqlaydi. Har ikkala hujayrani orasida doimo yoriqsimon oraliq ($100-150\text{ Å}$) ko'rinib turadi. Hujayrani desmosoma bor joyi bilan bir-biriga mustaxkamroq birlashadi. Bu xodisani mexanizmi hali yaxshi tekshirilmagan.

Membranali strukturalarning birlashish harakteri.

Sementlovchi modda hujayralarni bir-biriga mustaxkam biriktirishshiga qaramay, u elastik xususiyatga ega. Hujayralarni bir-birlari bilan bog'lash bilan birga u ularni

qandaydir harakatlanishini, qaytadan gruppalanishini ta'minlaydi. Odam va hayvonlarda doimo qon elementlari yangilanib turadi. Qon hosil qiluvchi (ilik, kora jigar va limfatik tugunlar) to'qimalarda retikulyar hujayralarning bir qismi ajralib chiqadi va qonning shaklli elementlarini hosil qiladigan hujayralariga aylanadi, ular rivojlanib qonga kiradi. Xuddi shu kabi spermatozoid va tuxum hujayralar ham yetilganda jinsiy bezlar to'qimalaridan ajraladi. hujayralararo bog'lanishni bu dinamikligi hamma ko'p hujayrali organizmlar uchun xos bo'lib hujayralar kontaktini muhim xususiyatlaridan biridir. Hujayraviiy bog'lanishlarni o'ziga xosligi va uni hosil qiluvchi faktorlar hujayralarni bir-biridan ajratish yo'li bilan o'rganiladi. Masalan, Moskona sut emizuvchilar buyragi to'qimalarining hujayralarini va fibroblastlarini o'rgandi. Tripsin yordamida hujayralarni bir-biridan ajratdi (to'qimalar kulturasida) va ayrim-ayrim hujayralar suspenziyasini oldi, so'ng har ikkala xil hujayralarni aralashtirib yubordi va maxsus muxitda o'stirdi. Bir necha soatdan keyin hujayralar o'z tiplari-xillari bilangina birikkanini aniqladi. Bu ko'pchilik bulutlarda va boshqa hayvonlarda ham qilingan.

O'simlik hujayralarining qobiqlarining o'ziga xos tuzilishi

O'simlik hujayralari, hayvon hujayralaridan farq qilib, tashqi sitoplazmatik membranaga qalin po'st qo'shilgan bo'ladi, u membrana usti qurilmasi bo'lib hisoblanadi. 2 ta qo'shni hujayralar qobiqlari orasida hujayraaro modda bo'lib, qobiqlarni maxkam birlashtiradi.

O'simlik hujayrasi qobiqlarining muhim belgilaridan biri ularda yorituvchi mikroskoplarda yaxshi ko'rinadigan katta teshiklar-poralarni bo'lishidir. 2 ta qo'shni hujayralar poralari qat'iy bir-biri rufarasiga joylashadi, ular yordamida qo'shni hujayralar sitoplazmasi o'rtasida kontakt amalga oshadi.

Ko'pchilik avtotrof o'simlik hujayralarining qobiqlari tarkibiga selluloza, gemitsellyuloza va pektin, zamburug'larda esa-xitin kiradi.

Elektron mikroskopni tekshirishlarni ko'rsatishicha o'simlik hujayrasi qobiqlari poralarida ko'pgina uzun, nozik fibrillar bo'ladi. Har bir fibrillni diametri 250-300 A. Fibrillar hujayralarni uzun o'qiga paralel holda yoki spiral holda joylashadi. Poralar bor joyda ular g'ovak kigizga o'hshash narsani xosil qiladi. Bularni *plaz madesma* kanallari deb ham ataladi. O'simlik qobiqlari ham birinchi navbatda maxanik funksiyani bajaradi. Xuddi skelet kabi o'simlikni mustahkam tayanchi bo'ladi. Suvni ko'p porlanishidan va infeksiyani kirishidan saqlaydi.

3- savol bayoni: Fagotsitoz protsessi sitoplazmatik membrananing aktiv faoliyati va harakatlanuvchanligi bilan bog'liq.

Fagotsitoz xodisasini **I.I.Mechnikov** tomonidan topilgan. Fagotsitoz-bu hujayralarni nisbatan qattiq donachalarni aktiv yutishidir (**gr-phagos-yemoq, kytos-hujayra**).

Fagotsitoz tabiatda keng tarqalgan bo'lib, hayvonot dunyosi taraqqiyotini, sodda hayvonlardan boshlab hamma pogonalarida uchraydi. Juda ko'p sodda hayvonlar, ayniqsa, amyobalar uchun fagotsitoz ovqatlanish usulidir. Amyoba tanasini istagan qismi bilan ovqatlikni ushlaydi. Bunda amyoba ovqatlikni atrofini oqib o'tadi va ovqatlik sitoplazmaga kirib qoladi, u yerda xazm bo'ladi.

Fagotsitoz va hujayra ichida xazm qilish, tuban umurtqasizlarda katta rol o'ynaydi. Yuqori darajada taraqqiy etgan, xazm organlariga esa bo'lgan organizmlarda fagotsitoz protsessi ximoya vazifasini bajaradi. Organizmga tushib qolgan yot tanachalarni chiqarib tashlaydi. Bundan tashqari fagotsitoz parchalanayotgan (degeneratsiyaga uchrayotgan) to'qimalardagi o'lgan hujayralarni yo'qotishda ham katta ahamiyatga ega. Masalan: amfibiylarni metamorfozida itbaliqni dumini yo'qolishi protsessi fagotsitoz yo'li bilan boradi.

Sut emizuvchilarda fagotsitoz vazifasiga oq qon tanachalari va makrofaglarga kiruvchi biriktiruvchi to'qima gistotsitlari, suyak miyasining retikulyar hujayralari va shuningdek, jigarni va gipofizni endoteliya hujayralari ega. Shuning uchun bu hujayralarni fagotsitoz faoliyati organizmni unga tushgan yot tanachalardan va zararli mikroorganizmlardan saqlashda katta ahamiyatga ega.

Leykotsit va makrofaglarni faoliyati tufayli organizm ko'pchilik kasalliklarga beriluvchi bo'lmaydi. Bu asosda **I.I. Mechnikov** immunitetni fagotsitar nazariyasini yaratdi.

Hujayralar nisbatan katta tanachalardan tashqari ancha mayda bo'lgan kolloid tabiatli tanachalarni ham ushlashi va xazm qilishi mumkin. Bunday mayda tanachalarni fagotsitozini elektron mikroskop tekshirishlarida aniqlanadi va ultrafagotsitoz deb ataladi. Bunga misol qilib makrofaglarni tirik holda bo'yovchi bo'yoq moddalarini ushlashi va sitoplazmada to'plashini olish mumkin.

Pinotsitoz

Sodda hayvonlar va ko'p hujayrali organizmlar faqat qattiq zarrachalarni ushlashgagina emas, balki tashqi muxitdagi suyuqlik tomchilarini yutish xususiyatiga ham egadirlar. Buni birinchi bo'lib **Lyuis** 1831 yilda makrofag va fibroblastlarni o'sishini o'rganayotib kuzatgan edi.

Suyuqlik tomchilarini ushlash va yutish protsessi ichishni eslatadi, hujayralar atrofdagi suyuqliklarni xuddi ichadi. Shuning uchun Lyuis bu xodisani **pinotsitoz (gr-pino- ichaman, kytos-hujayra)** deb nomlangan.

Makrofag va fibroblastlarda suyuqlikni yutish sitoplazmani tashqi qismidan do'ng yoki o'simta hosil bo'lishidan boshlanadi. Bu o'simta psevdopodiilarga o'xshaydi. Ular dastlab mayda tomchilarni o'raydi, keyin yuqori qismlari bir-biri bilan yopishadi, tomchilar sitoplazma ichida qoladi.

Amyobalarda sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Dastlab sitoplazmada konussimon do'ng hosil bo'ladi. Uni uchida kichkina voronkasimon botiq hosil bo'ladi. Keyin u ingichka kanal shaklini oladi. Suyuqlik tomchilari kanalni tubidan ichkariga ajralib kiradi. Pinotsitoz tomchilari kattaligi 50 °A dan bir necha mk gacha bo'ladi. Xamma o'simlik va hayvon hujayralarida pinotsitoz kuzatilgan.

Pinotsitoz xodisasini elektron miroskop bilan nozik tekshirishlar shuni ko'rsatdiki hujayraga kiruvchi tomchi membranani bir qismi bilan o'rab olinadi. Pinotsitoz tomchi ajralganda membrana chetlari birlashib ketadi. Shunday qilib, pinotsitoz tomchisini hosil bo'lishidan tashqari sitoplazmatik membra aktiv qatnashadi va har bir pinotsitoz tomchisini devori membranani bir qismidan hosil bo'ladi. Pinotsitoz yo'li bilan hujayraga har xil moddalar erigan holda, kolloid eritma holida va suspenziya holida kiradi.

Bu yo'l bilan hujayraga tashqi membrana orqali kira olmaydigan yirik molekulali moddalardan oqsillar, nuklein kislotalar, nukleoproteidlar kiradi.

Hujayraga kirgan moddalar keyinchalik sitoplazmada foydalaniladi. Bu pinotsitoz tomchilarini lizosomalar bilan birikishi tasdiqlaydi. Bu eng so'ngi vaqtlardagina aniqlandi. Lekin ular qanday o'zgarishlarga uchrashi hozircha aniq emas. Hozirgi vaqtda bu protsesslar juda ko'p olimlar tomonidan o'rganilmoqda.

Nazorat savollari:

1. Elementar membrana nima?
2. Sitoplazmatik membrananing vazifasi nimalardan iborat?
3. Usimlik hujayrasi qobigining tuzilishi qanday?
4. Fagotsitoz nima?
5. Pinotsitoz nima?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- Organoidlar membranalarining o'xshashlik va farqli tomonlari
- Pinositozni lizosomalar bilan birikishi

Mavzuga oid adabiyotlar:

1. Yu. S. Chensov. Obshaya sitologiya. M., Izd. MGU, 1984
2. Билич Г.Л. Биология, Цитология, Гистология, Анатомия человека.
3. T. B. Boyqobilov. v b Sitologiya T. O'qituvchi 1980 y.
4. I. Sottiboyev va v b O'simlik hujayrasi T. O'qituvchi.
5. I. Badalxodjaev, T. Madumarov Sitologiya. 2013.
6. Karp G. Cell and molecular biology. USA, 2013. – P. 850.

MA'RUZALAR KURSI MODUL-4: MITOXONDRIYA. MAVZU: MITOXONDRIYANING TUZILISHI VA VAZIFASI

REJA:

1. Mitoxondriyalarning kashf etilishi.
2. Mitoxondriyalarning hujayradagi ahamiyati

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Mitoxondriya, ATF, ADF energiya, membrana, DNK, oqsil, xondrioma, matriks, kristalar, uglevod, yog'lar.


1-savol bo'yicha dars maqsadi: Mitoxondriyalarning paydo bo'lishidagi gipotezalardan to'g'ri hulosa chiqarishi

1- savol bayoni: Mitoxondriya dastlab, 1902 yilda Benda tomonidan ochildi. Barcha organizmlarning hujayralarida topilgan. Ularning soni, kattaligi va shakli turli hujayralarda turlicha. Yorituvchi mikroskoplarda yaxshi ko'rinadi, ammo ularning nozik tuzilishlari elektron mikroskop yordamidagina aniqlandi.

Mitoxondriyalar tashqi membrana bilan koplangan. Uni ostida esa ichki membrana joylashgan. Har bir membrana 3 qavatli tuzilishga ega. Tashki va ichki

membranalar orasida torgina bo'shliq bo'ladi. Har ikkala membrana mitoxondriyani po'stini tashkil etadi.

Ichki membranadan mitoxondriyaning ichki bo'shlig'iga qaragan o'simtalar chiqadi, bular taroqlar yoki kristlar deb ataladi. Bular ATF hosil qiluvchi yuzani kengaytirish uchun xizmat qiladi. Mitoxondriyaning ichki bo'shlig'i gomogen modda bilan to'lgan bo'lib, u matriks deyiladi. Oxirgi vaqtda mitoxondriyani matriksida ribosomalar topildi.



4.1- rasm. Mitoxondriyaning tuzilishi

Mitoxondriyalar murakkab tuzilishga ega bo'lib, ularning tarkibida oqsillar, lipidlar va nuklein kislotalari bor. RNK va DNK lar oz miqdorda bo'ladi, va o'zining maxsus fermentlari-oqsillarni sintezida qatnashadi. Bu mitoxondriyalarda DNK sintez qilinishidan darak beradi.

Ohirgi vaqtlarda mitoxondriyaning funksiyasi mufassal o'rganildi. Ularda energiya ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan fermentlar sistemasi borligi aniqlangan. Shuning uchun mitoxondriyalarni hujayraning "Energetika sistemasi" deb nomlash mumkin. Fermentlar ta'sirida uglevodlarni, aminokislotalarni, yog' kislotalarini oksidlashdan chiqqan energiyalar hujayra tomonidan bevosita ishlatilmay mitoxondriyalarda sintezlanadigan ATF da yigiladi.

Mitoxondriyalar yangidan kelib chiqmaydi, balki avvalgilardan bo'linish natijasida hosil bo'ladi. Oxirgi ma'lumolarga ko'ra mitoxondriyani hosil bo'lishida yadro qobiqi va nukleoplazmalar ishtirok etadi.

Mitoxondriylar o'simlik va hayvonlar hujayralarida tuzulishi va bajaradigan vazifalariga ko'ra umuman olganda bir xil bo'lib ayrim tomonlari bilan farqlanadi holos. Yorug'likdan foydalanib ishlatiladigan mikroskoplarda mitoxondriylar ko'rinmaydi. Fazo-kontrast mikroskoplarda uni tirik hujayralarda ko'rish mumkin. Ularni kattaligi 2,5-5 mkm, kesmasi esa 0,5-1 mkm keladi.


Mitoxondriylarning shakli, kattaliklari, ularni soni va bu organellalarning sitoplazmadagi holati doimo o'zgarib turadi. ular donador, tayoqcha yoki ip shaklida bo'lib doimo harakatda turadi. elektron mikroskoplarda ular odatda cho'ziq yumaloq yoki kamdan kam hollarda gantelsimon, piyolasimon, tarmoqlangan ko'rinishlarga ega.

Hujayrada mitoxondriylarning soni uning xili, rivojlanish bosqichi va holatiga bog'liq bo'ladi. Odamda bir necha donadan bir necha yuzlab, ko'pincha minglab miqdorda. Ayrim suv o'tlarida bitta mitoxondriy bo'lsa, ajratuvchi hujayralarda juda ko'p. Hujayradagi mitoxondriylarning majmuiga *xondrioma* deyiladi.

Elektron mikroskop yordamida uning tuzilishi aniqlangan. mitoxondriy qo'sh-tashqi va ichki membrana bilan o'ralgan ularning orasidagi bo'shliq (10 nm ga yaqin) suyuqlik bilan to'lgan. tashqi membrana mitoxondriyni sitoplazmadan ajratib turadi va moddalar almashinuvini boshqaradi. Ichki membrana tashqisidan ximiyaviy tarkibi bilan farqlanadi. Ichki membrana mitoxondriy ichiga yo'nalgan turlicha uzunlikdagi yassi o'simta yoki naycha ko'rinishidagi mitoxondriy *kristalari* deb ataladigan o'simalarni hosil qiladi. Kristalar orasi *matriks* gomogan tuzulma bilan to'lgan.

Kristalar bu organellalarning mahsus faolligi bilan bog'liq. Ular mitoxondriy ichki membranasining yuzasini ancha kattalarshtiradi. o'simliklar mitoxondriylaridagi kristalar ma'lum tartibdagi yo'nalishga ega emas, odatda tartibsiz joylashganday ko'rinadi. Kristalar orasidagi matriksda gialoplazmadagiga nisbatan maydaroq tuzilgan ribosomalar, ingichka iplar-mitoxondriy DNKsining fibrillari bo'ladi.

Mitoxondriylarning asosiy vazifalari-ATFni ADF dan hosil qilish, ya'ni boshqacha aytganda hujayrani energiyaga bo'lgan talabini qondirish hisoblanadi. Mitoxondriylardan ajralgan energiyaga boy ATF molekulari hujayraning hayotiy faoliyatini ta'minlashda, uni bo'linishida, moddalarni shimish va ajratish yo'li, sintez jarayonlarida foydalaniladi. bu jarayonda ATF yana qaytadan ADF ga aylanadi va u yana mitoxondriylarga qaytadi. Mitoxondriylar xloroplastlar bilan hujayrani energiyaga bo'lgan deyarli barcha talablarini xloroplastlar bo'lmagan hujayralarda yakka o'zlari qondiradi.



4.2- rasm. Mitoxondriyada energiya hosil bo'lish jarayoni

ATF molekularida to'planadigan quvvat mitoxondriylarda turli oziq moddalarni ulardan asosan saxarozani oksidlanishidan olinadi. Shu tufayli mitoxondriylarda ATF hosil bo'lishida fosfat kislotasi qoldig'ini ADF ga birikishi ro'y beradi, shu tufayli bu jarayon fosforlanib oksidlanish deyiladi. Hujayraning nafas olishi deb ataladigan

oksidlanish jarayoni juda ko'p reaksiyalardan iborat bo'lib turli fermentlar yordamida bir necha bosqichda o'tadi. Buning natijasida oziq moddani parchalanishidan ajralgan issiqlik holda yo'qolib ketmaydi, balki ATF holdagi makroergik bog'larda to'planadi. Nafas olish jarayonida oziq moddalar oksidlanib karbonat angidridgacha parchalanadi, molekula holdagi kislorod va suv ajraladi. suv hujayrada qoladi, so_2 protoplastdan chiqib ketadi, uning bir qismi fotosintezda foydalanishi mumkin. shuning uchun bir qarashda nafas jarayoni kislorod olish korbonat angidrid ajratish bilan ifodalanadi.

Mitoxondriylarda yadroga bog'liq bo'lmagan holda o'zidagi ribosomalar yordamida mitoxondriy DNK nazoratida oqsil hosil qiladi. Ba'zi hujayralardagi mitoxondriylar efir moylarini (uglevodorodlar) hosil bo'lishida ishtirok etadigan lipidlarni jadal ravishda sintezlaydi.

Mitoxondriylar doimo mavjud bo'ladigan. yangidan hosil bo'lmay hujayra bo'linishida qiz hujayrada teng taqsimlanadigan organella hisoblanadi. Mitoxondriylarning sonini ortishi ularni bo'linish yoki kurtaklanishi bilan ro'y beradi deb hisoblaniladi. Bu mitoxondriylarning o'zini nuklein kisotalai hisobiga amalga oshib ularning o'sishini ta'minlayoladi. Bu holat to'liq mustaqillikni anglatmaydi, zero mitoxondriylarning rivojlanishi yadroning nazorati ostida turadi, shu tufayli mitoxondriylar yarim mustaqil organella hisoblanadi.

Mitoxondriydar doimo harakatda, burilgan, egilgan holda hujayrani bir qismidan ikkichi qimiga o'tib turadi, bundan tashqari o'zaro yopishib ham qoladi. Mitoxondriylar hujayrani qaysi qismida energiya zarur bo'lsa, o'sha erda to'planadi. Agar membranadan moddalar faol holda qo'shni hujayralarga o'ta boshlasa, mitoxondriylar membrana yuzasi bo'ylab joylashadi. Bir hujayrali harakatchan suvo'ildarda mitoxondriylar xivchinlar asosida to'planadi, uning harakatini ta'minlash uchun quvvat bilan ta'minlab tursa kerak.

Nazorat savollari:

1. Mitoxondriyalarning kashf etilishi to'g'risidagi qaysi gipotezaga qo'shilasiz? Nima sababdan
2. Mitoxondriyalarning vazifasi va hujayradagi o'rni?
3. ATF hosil bo'lish prossesini tushuntirib bering/
4. Nima sababdam mitoxondriya yarim avtonom organoid hisoblanadi?
5. Plastidalar bilan o'xshashlik va farqli tomonlari?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- Mitoxondriyalarning tuzilishi va vazifasi
- Energiya hosil bo'lishdagi ishtiroki

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-5: PLASTIDALAR.

MAVZU:HUJAYRA PLASTIDALARINING TA'RIFI, GURUHLARI, ULTRASTRUKTURAVIY VA KIMYOVIY TUZILISHI.

REJA:

1. Plastida hillari, tuzilishi va vazifalari
2. Plastidalarining ultrastrukturaviy va kimyoviy tuzilishi

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Plastida, xloroplast, xromoplast, leykoplast, stroma, tilakoid, granalar

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Plastidialarni hujayra hayotidagi ahamiyatini bilish

1- savol bayoni: 1676 yilda A.Levinguk yashil o'simlik hujayralarida yashil donachalarni kuzatdi va ularni xromotofor deb nomladi. Keyinchalik Shimper (1883) yashil barg hujayralarida yashil donachalardan tashqari sariq to'q sariq va hatto rangsiz donachalarni kuzatdi. Va ularni barchasini plastidalar deb atadi.

Plastidlar o'simlik hujayralari uchun xos organoid bo'lib, unda turli moddalarni sintezi, birinchi navbatda fotosintez amalga oshadi. Shu tufayli o'simlik va hayvonlarda modda almashinish ham turlicha bo'ladi.

Yuqori o'simlik hujayralari sitoplazmasida asosan 3 xil plastidlar uchraydi: 1) Yashil plastidlar- xloroplastlar; 2) qizil oranj va boshqa rangli xromoplastlar; 3) rangsiz- leykoplastlar. Bular bir biriga o'tish xususiyatiga ega. Masalan, Xloroplastlar meva pishishi bilan yoki barglarning rangi kuzda o'zgarishida xromoplastlarga aylanadi. Tuban o'simliklarda, masalan, suv o'tlarda, faqat bir xil plastidlar-xromatoforlar ma'lum.


Yuqori o'simliklarda fotosintez faqat yorug'likda xloroplastlarda yuz beradi. Ko'pchilik o'simliklarda xloroplastlarini diametri 4-6 mk. Xloroplastlarni soni har bir o'simlik uchun o'ziga xos bo'ladi. Xloroplastlar eng oz bo'lganda 1-5 dona bo'ladi.

Xloroplastlarning tuzilishi va funksiyasi.

Xloroplast tashqi va ichki membrana bilan uralgan bo'ladi.

Elektron mikroskopik tekshirishlarni ko'rsatishicha yuqori o'simliklarning xloroplastlari tarkibiga gruppada joylashgan ko'p sonli kirralar kiradi. Har bir kirra 2 qavatli membranadan hosil bo'ladi va yassi haltacha ko'rinishida bo'lgan doira plastinadan iborat. Bu plastinalarning juda ko'pchiligi bir biri ustiga taxlangandek joylashadi. Qirralar stromada joylashgan maxsus plastina-lamella yordamida o'zaro birikadi va yagona sistemani hosil qiladi.

Xloroplastlarni faqat kirralari yashil pigmentni ushlaydi, stroma esa rangsiz bo'ladi. Elektron mikroskopni ko'rsatishicha xlorofill kirraning plastinalarini o'rtasida joylashadi. Har bir plastina tashqi tomonidan oqsil molekulasini katlami bilan chegaralangan, ularning oralig'ida esa xlorofil molekulasini va lipid katlami molekulasini joylashadi.



5.1-2- rasm Plastidalar tuzilishi

Xloroplastning bunday tartibli tuzilishi uning asosiy funksiyasi - fotosintez protsessi bilan bog'liq.

Fotosintezning birlamchi mahsulotlari- qand va kraxmallar dastlab xloroplastning stromasida qirralar va ularning biriktiradigan plastinalar orasida joylashadi, so'ng o'simlikda tuplanadigan qismlarga tashiladi.

Yashil suv o'tlarida fotosintez protsessi xromatoforalarda amalga oshadi. Ular uz tarkibida kirralarni tutmaydi. Birlamchi sitez mahsulotlari bularda-har xil karbon suvlar bo'lib ular perenoidlar deb ataluvchi maxsus strukturalar atrofida tuplanadi.

Xloroplastlarni rangi xlorofilgagina bog'lik emas; ularda yana sarikdan kizil jigarranggacha bo'yalgan karotin va karotinoidlar, shuningdek fiqobilinlar va boshqa pigmentlar ham bo'lihi mumkin. Keyingilariga qizil va ko'k yashil suv o'tlarida uchrovchi fikotsianin va fikoeritrinlar ham kiradi. Xromoplastlar odatda sarik, ok, kizil yoki kungir ranglarga bo'yalgan bo'ladi.

Xromoplastlar kelib chiqishi jihatidan xloroplastlar taraqqiyotining oxirgi etapi bo'lishi kerak. Bunda xlorofil asta sekin buzila boradi va karotinoidlar yigiladi. Xromoplastlar shuningdek, o'zida karotinoidlarni yiguvchi proplastid yoki leykoplastlardan rivojlanishi ham mumkin.

Plastidlarning navbatdagi xili- leykoplastlar rangsiz bo'ladi. Ular o'simlikni bo'yalmagan qismlarida joylashadi. Leykoplastlarga misol qilib, kartoshka va ko'pgina boshqa o'simliklar tuganaklarida uchrovchi aminoplastlarni olish mumkin. Aminoplastlarda ikkilamchi kraxmalni mono- va disaharidlardan ikkilamchi sintezi bo'ladi. Bundan tashqari plastidlarni oqsillar sintezini amalga oshiruvchi organoid ekanligi ham aniqlangan.

Oqsillarni sintezi xloroplastlarda yaxshiroq o'rganilgan. Bu xloroplastlar stromasida joylashgan ribosomalarda amalga oshiriladi. Bu ribosomalar sitoplazmadagilardan kimyoviy tarkibi, kattaligi va strukturasi jihatidan biroz farq qiladi. Oqsillar sintezi ustidan kontrol xloroplast stromasida bo'ladigan diametri 30-35 °A keladigan ingichka ipsimon DNK tomonidan amalga oshadi. U xloroplastlarni o'zida sintezlanadi. Bundan tashqari na xloroplastlarda RNK ham topilgan.

Fotosintez protsessida xlorofil qanday rol o'ynaydi, va bu protsessda quyosh nurlari spektrining ayrim qismlari qanday ahamiyatga ega degan masalalarni aniqlashda K.A.Timiryazevning xizmati juda katta. Timiryazev xlorofilni "Kuyosh bilan hayot o'rtasidagi bog'lovchi zanjir" deb, xlorofil donasini esa, kuyosh nuri kimyoviy energiyaga aylanib, yerdagi butun hayotining manbai bo'lib qoladigan bir fokus, olam bo'shlig'idagi bir nuqta deb qaradi. Timiryazev qizil nurlar (tulqin uzunligi 730 dan 680 nm gacha) hammadan ko'p yutilishini, spektrning ko'k binafsha qismidagi nurlar (tulqin uzunligi 470 nm va undan kamroq) bir muncha kamroq yutilishini aniqladi.

2-savol bayoni: Xloroplastlarning matriksida 1-2 % karatinoidlar va fermentlar, oz miqdorda DNK va RNK, ribosomalar va yog' tomchilar bo'ladi. Xloroplastning 75 % suv va 25 % quruq moddadan iborat. Quruq moddani 30-45 % oqsil, 10 % magniy, mis, temir rux birikmalari, 10-15 % zaxira oziq moddalari, 20-40 % lipidlar tashkil qiladi.

Xloroplastlarning yashil pigmenti tilokoidlarni ichida joylashgan, shuning uchun stroma rangsiz ko'rinadi. Xlorofil donachalarining kattaligi 70- 120 A keladigan glabulalardan tuzilgan. Glabulaning ichida kvantosomalar bo'lib ular fotosintezni amalga oshiradi. Xloroplastlar sitoplazma ichida doim harakatlanadi. Yorug'lik ta'sirida ular hujayra ichidagi o'rnini o'zgartirishi mumkin. Kuchli yorug'lik xloroplastlarda **manfiy fototaksis** qo'zg'atib ular hujayraning yon devoriga to'planadi. Va o'zlarining qirralarini yorug'lik manbaiga qaratadi. Kuchsiz yorug'lik xloroplastlarda **musbat fototaksis** qo'zg'atib ular hujayrani yorug'lik manbaiga nisbatan perpendikulyar jolashgan devoriga to'planadi. Va o'zlarini keng sathini nurga toblaydi.

Nazorat savollari:

1. Plastidalar kim tomonidan o'rganildi?
2. Plastida turlari?
3. Plastida qismlari
4. Plastidalar kimyoviy tuzilishi?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- Xloroplastlar va leykoplastlar hujayra hayotidagi ahamiyati
- Plastidalar hosil bo'lish jarayoni

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-6: PLASTIDALAR. MAVZU-2: PLASTIDALAR VA ULARDA FOTOSINTEZ JARAYONING AMALGA OSHISHI

REJA:

1. Fotosintez apparatining pigmentlari
2. Fotosintez jarayoni to'g'risidagi olimlar qarashlari
3. Fotosintez

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Plastida, xloroplast, xloroplast, leykoplast, stroma, tilakoid, granalar, fotosintez,

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Plastidalar fotosintez jarayonidagi ahamiyatini bilish

1- savol bayoni: Xlorofil pigmentlari murakkab strukturali organik moddalar bo'lib tarkibidagi magniy atomi to'rtta pirol halqasiga bog'langan va tusi yashildir. Bularga xlorofil-A, xlorofil-B, xlorofil-S, xlorofil-D va bakterioxlorofil kiradi. Ko'k yashil xlorofil $(S_{55}N_{72}O_6N_4Mg)$ va yashil xlorofil $(S_{55}N_{70}O_6N_4Mg)$ tarkibiga ega. Suv o'tlarining xromotoforida yashil suv o'tlar bilan birga qizil pigment fikoeritin $(S_{35}N_{47}N_4O_8)$ qizil suv o'tlarida va yashil suv o'tlarida uchraydi. Ko'k pigment fikatsian $(S_{34}N_{42}N_4O_9)$ ko'k yashil suv o'tlarida va ba'zan qizil suv o'tlarining xromotoforida xlorofil va fikoeritin pigmentlari bilan birga uchraydi.

2- savol bayoni: O'simliklarning oziqlanishi haqida birinchi fikr yuritgan kishi Aristotel edi. 1771 yilda ingliz olimi Jozef Pristli tajriba o'tkazdi. (qalpoq, sichqon, yalpiz). Lekin bu jarayonning borishi uchun o'simlikka yorug'lik ham kerak ekanligini 1778-1779 yilda gollandiyalik vrach Inxenxauz juda ko'p tajribalar bilan isbotladi. 1782 yilda Jan-Senebe o'simliklar havodan karbonat angidridni o'zlashtirib kislorod ajralishini ya'ni havoni tozalashni ularni havodan oziqlanishi bilan bog'liq ekanligini aniqladi. 1782 yilda shvesariyalik olim Geodor Sossur o'simliklar oziqlanishida faqat

karbonat angidrididan emas balki tuproqdagi suv va mineral moddalardan ham foydalanishni isbotladi. K. Timiryaziv o'z tajribalari asosida yorug'lik xloroplastni qo'zg'atish uchun kerak emas balki suv va karbonat angidrididan organik modda sintez bo'lishi uchun energiya manbai bo'lib xizmat qilishini isbotladi

3- savol bayoni: Ma'iumki, tirik tabiatda uchraydigan biologik jarayonlar ichida fotosintez o'zining ko'lami va mohiyati bilan asosiy o'rinni egallaydi. Muhit moddalaridan biologik moddalarni hosil qilish jarayonlarini birgalikda assimilatsiya nomi bilan birlashtirish mumkin. Assimilatsion jarayonlar natijasida tirik materiyani asosiy komponentlari tuziladi va ularning ko'pchiligi uglerodli birikmalardir. Organik moddalarning biologik sintezi assimilatsiyaning eng muhim jarayoni-uglerod assimilatsiyasi deb ataladi. Fotosintezda hosil bo'luvchi organik moddalar o'z ishiga quyosh energiyasi hisobiga o'simlik tomonidan yig'ilgan energiyani va o'zlashtirilgan moddalarni oladi. Fotosintez jarayonida hosil bo'lgan energiya biosferadagi tiriklik manbayining asosi hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda yashil o'simliklar yerdagi hayotning manbasi bo'lib xizmat qiladi. Fotosintez jarayoni tufayli planetamizdagi energiyani eng ko'p miqdori zaxiralanadi. Yashil o'simliklar yil davomida fotosintez

natijasida 100 mid tonnadan ortiq organik massani hosil qiladi. Fotosintez jarayonida yer sharimizga yetib kelayotgan quyosh energiyasining 45.1013 megakaloriya qismi fotosintezning turli ko'rinishdagi mahsulotlari sifatida jamlanadi. Ushbu jarayonda yashil o'simliklar tomonidan 130 mid t. CO_2 va 130 mid t. suv qayta ishlanadi. Bundan tashqari fotosintezlovchi hujayralar ushbu jarayon tufayli

o'zlarining har xil moddalarga bo'lgan talabini qondiradi. Dastlab, fotosintezlovchi hujayralarda uglevodlar sintezlanganligi tufayli ular o'zlarining shu moddaga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. So'ngra ushbu birikmalardan boshqa organik moddalar, masalan, oqsillar va yog'lar sintezlanadi. Fotosintez jarayonida hosil bo'luvchi birlamchi uglevod bu fruktozofosfatdir. Keyinchalik fruktozofosfatdan boshqa biopolimerlar va monomerlar, masalan, kraxmal, selluloza, kletchatka, oligosaxatidlar, disaxaridlar va monosaxaridalar hosil bo'ladi. Ammo uglevodlarning o'simlik to'qimalari bo'ylab asosiy tashiluvchi fonnasi saxarozadir. U plazmaning to'rsimon naychalari bo'ylab tashilib o'simlikning boshqa hujayralari to'lanidan metabolik jarayonlarda ishlatilishi yoki zaxira holida to'planishi mumkin. Uglevodlarning zaxira formalari faqatgina kraxmal holatidagina bo'lib qolmasdan, balki disaxarid-saxaroza (shakarqamish, qand lavlagi) yoki monosaxarid-glukoza (uzum) ko'rinishlarida ham bo'lishi mumkin. 169 Bizning planetamizda sodir bo'ladigan biologik jarayonlar ichida fotosintez asosiy o'rinni egallaydi. Yorug'lik energiyasi ishtirokida anorganik moddalardan, ya'ni suv va karbonat angidriddan organik modda hosil bo'lib, atmosferaga kislorod ajralib chiqadi. Fotosintez jarayonida suvning fotolizi natijasida atmosfera havosiga ajralib chiqadigan O₂ tiriklik olamining nafas olishi uchun zarur bo'lgan yagona kislorod manbayidir. Hozirda atmosfera havosining 115 qismini tashkil qilgan kislorod ham avtotrof o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi evolutsiyasi mobaynida hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki hozirda mavjud bo'lgan o'simliklar dunyosi, atmosfera havosida deyarli kislorod bo'lmagan sharoitda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Yashil o'simliklar va suv o'tlari uchun fotosintez jarayonini quyidagi umumiy tenglama orqali ifodalash mumkin.


yorug'lik



xlorofill

Ushbu tenglik, asosan, fotosintezning ikkita alohida-alohida qismlaridan iboratdir.

yorug'lik




(1)

xloroplastlar

Bu energiyaning o'zgarishi yorug'lik reaksiyasidir.

yorug'lik



+ 6H₂

0 (2)

xloroplastlar

Bu moddalamin6 o'zgarishi qorong'ulik reaksiyasidir. Biofizik nuqtayi nazaridan fotosintez, energiyalami konversiyasidan iborat, bunda pigment yutgan energiyasini elektronga va asta-sekin kimyoviy bog'lami hosil qilishga sarflaydi. Fotosintezning yorug'lik reaksiyalari barg xloroplastlarining tilakoidlari membranalarida ro'y bersa, qorong'ulik reaksiyalari xloroplastlarning stroma qismida ro'y beradi. Ma'lumki, fotosintez yashil o'simliklarning bargida sodir bo'ladi. Bargning hujayraviiy tuzilishi fotosintezga, nafas olishga va transpiratsiyaga moslashgan. Uning ustki va ostki tomoni po'st bilan qoplangan. Qoplovchi to'qima epidermis bir qator zich hujayralardan

tuzilgan va ular yorug'likni yaxshi o'tkazadi. Po'stni o'rtalarida barg og'izchalari joylashgan va ular ko'proq barg plastinkasining ostida bo'ladi. Og'izchalar orqali gazlar almashinuvi sodir bo'ladi. Ustki po'st ostida tayoqchasimon, zich joylashgan hosil qiluvchi hujayralar (mezofil) joylashadi. Ularda xloroplastlar ko'p. Bulami tagida esa dumaloq formadagi hujayralar tarqoq holda joylashib bo'shliqlar hosil qiladi, bu bo'shliq gazlar va suv almashinuvida ishtirok etadi.

Nazorat savollari:

1. Xlorofil pigmentlari qanday strukturalardan iborat?
2. Karatinoidning organizmdagi roli?
3. Josef Priestli ishlari?
4. Fotosintezning amalga oshishi?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- Fotozintez jarayonini izohlang
- Xlorofil pigmentlari umuman mavjud bo'lmagan o'simliklar bormi?

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-7: ENDOPLAZMATIK RETICULUM (EPR)

MAVZU: ENDOPLAZMATIK RETICULUM (EPR)

REJA:

1. Endoplazmatik to'ring kashf etilishi va struktura tuzilishi
2. Silliq va donador endoplazmatik to'ring funksiyasi

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Endoplazmatik to'r, pufakchslar, kanalchalar, sarkasoma, kalsiy deposi, silliq EPR

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Endoplazmatik retikulum to'g'risida tushunchaga ega bo'lish

1- savol bayoni: Hujayraning bu organoidi 1945-1946 yillarda ochildi. K.Porter, A.Klod va Fulmanlar fibroblastlarni sitoplazmasida to'rsimon strukturani ko'rib qoldilar va ularni elektron mikroskop yordamida batafsil tekshirishdilar. Bu strukturalar

sitoplazmaning ichki qismlarida – endoplazmada joylashganligi uchun endoplazmatik to'r yoki endoplazmatik retikulum deb nomlandi.

Endoplazmatik retikulum (ЭПР) (лат. reticulum — setka), yoki endoplazmatik to'r ma'nosini bildiradi. Mikroskop ostida ko'p sonli mayda vakuolalar, kanallar yig'indisi sisternalar to'rga o'xshash (retikulum) tuzilmani hosil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Donador EPT ingichka kanallar, sisternalar haltachalardan iborat bo'lib uchi yopiq membrana bilan chegaralangan. Sisternalar kengligi 20 nm tashkil etadi. Membranalar yuzasi mayda 20 nm tuzilmalar bilan qoplangan bo'lib bu tuzilmalarni 1 chi marta Dj. Paladi ta'riflagan bo'lib ular ribonukleoproteidlardan tuzilganligini aytadi.

Turli hujayralardan tayyorlangan ultra yupqa kesmalarni elektron mikroskopik tekshirishlarni ko'rsatishicha endoplazmatik tur membrana bilan chegaralangan murakkab kanallar sistemasidan, vakuollardan va sisternlardan iborat ekan.

Endoplazmatik turning membranasi ham uch kavatli tuzilishga ega. Endoplazmatik turni kay darajada taraqqiy etganligi hujayralarning kay darajada differensiallanganiga bog'lik. Bo'linayotgan hujayralarda u kam taraqqiy etgan, yetilgan hujayralarda esa yaxshi taraqqiy etgan bo'ladi.

Endoplazmatik tur membranalarini nozik kuzatishlarni ko'rsatishicha, bu membranalarning sirtida yumalok, qattiq granulalar joylashgan ekan, ular ribosomalar deb ataladi.

Membrananing ba'zi joylarida bu granulalar bo'lmaydi. Shuning uchun endoplazmatik turni ikki turi farq qilinadi: 1) granulyar yoki dagal; 2) sillik endoplazmatik to'rlar. Endoplazmatik tur membranasi kimyoviy sostavi bioximik analiz orqali aniqlandi. Uning tarkibida oqsillar va lipidlar mavjud. Undan tashqari bir qancha fermentlarga, masalan, ATF – azaga ega.

Bu organoid barcha o'simlik va hayvon hujayralarida topilgan, ammo bakteriyalarda bor-yukligi aniq emas.

Granulyar endoplazmatik turni oqsil sintezida ishtirok etishi aniq isbot etilgan. Sillik endoplazmatik tur membranalarida glikogen va lipidlarni sintezlanishi aniqlangan.

Endoplazmatik turning har ikkala xilining kanallarida, vakuollarida va sisternlarida sintez mahsulotlaridan oqsillar, yoglar va glikogenlar tuplanadi.

Hozirgi vaqtgacha endoplazmatik turni kaysi materialdan hosil bo'lishi aniqlanmagan. Ammo, bu organoidni tashqi sitoplazmatik membrana bilan yakindan aloqada ekanligi ana shuning hisobiga yoki yadro bilan yakindan aloqada bo'lgani uchun uning membranasi hisobiga endoplazmatik tur membranasi hosil bo'lsa kerak deb taxminlash mumkin. Bu taxminni quyidagi analiz tasdiqladi. Bugdoyning endospermasini elektron mikroskopik tekshirishda uning hujayralarida yadroning membranasi haltasimon o'simtalar hosil qilishi aniqlandi, undan esa endoplazmatik turning sisternlari hosil bo'ladi.

Uning йўғонлиги 5-6 nm atrofidagi membrana bilan o'ralgan kanalchalar, pufakchalar va g'o'lachalar tuzilmasidan tashkil topgan bo'lib gialoplazmaning hamma tomonlariga tarmoqlangan.

Endoplazmatik to'rning ikki turi:


1. Donador endoplazmatik to'r;

2. Silliq endoplazmatik to'r [2]

Granular endoplasmic reticulum




Agranular endoplasmic reticulum



7-1 rasm. Donador va silliq EPR ning tashqi ko'rinishi

2- savol bayoni: Silliq EPT va donador EPT hujayrada har xil vazifani bajaradi. Endoplazmatik bor joylarda lipidlar, steroidlar va oqsil sintez qilinadi va tashiladi. EPT ning muhim hususiyati sintez uchun kerakli bo'lgan oziiq moddalarni to'playdi. EPT yadro membranasini hosil bo'lishida ishtirok etadi. Muskul to'qimalarida EPT ning muhim formasi sarkoplazma uchraydi.

Silliq EPT juda ko'plab metabolizm jarayonida ishtirok etadi. Silliq EPT uglevod almashinuvida, zaxarli moddalarni zararsizlantirishda, kalsiy to'plashda ishtirok etadi. EPT da kalsiy ionlarini 10–3 molni tashkil qiladi, sitoplazmada ularning miqdori 10-7 molga teng (tinch holatda). Inozitoltrifosfat stimuli ta'sirida kalsiy EPT dan diffuziya yo'li bilan ajralib chiqadi. EPT ga kalsiyni qaytishi aktiv transport orqali amalga oshadi. Buyrak usti bezidagi steroid garmonlari hamda umtrqali hayvonlarni jinsiy garmonlari silliq endoplazmatik to'rda hosil bo'ladi. Uglevodlar jigarda glikogen ko'rinishida yig'iladi. Silliq EPT jigar hujayralarida zaharli moddalarning har qanday ko'rinishini zararsizlantiradi. Oqsil sintezi. Ko'ndalang muskul toqimasidagi vakuola va kanallarni silliq EPT o'rab turadi.



7-2 rasm. EPR ning yadro atrofida joylashishi

Nazorat savollari:

1. EPR ning kashf etilishi
2. Sarkoplazma nima?
3. Kalsiy deposi funksiyasini izohlang

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- EPR ning hosil bo'lish jarayonini tushuntiring. Nima uchun?
- Qaysi organoidlar bilan uzluksiz bog'liq? Sabab?

MA'RUZALAR KURSI
MODUL-8: GOLJE APPARATI

REJA:

1. Golji apparatining kashf etilishi va morfologik tuzilishi
2. Golji apparatining vazifalari

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Golje kompleksi, ses, medial, trans, diffuz, proksimal, distal, hujayra

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Golje apparatining tarkibiy qismlarini farqlay oladi,

1- savol bayoni: 1898 yilda Italiyalik mikroskopis K.Goldji o'zi ishlab chiqqan to'kimalarni kumush bilan bo'yash metodini qo'llab, nerv hujayralarida qandaydir noma'lum tanachalarni ko'rdi. Bundan bir necha yil ilgari Ispan gistologi S.Raman-Kahal buni kuzatgan edi. 1906 yilda bu ikki olim o'zlarining nerv hujayralari ustidagi nozik tekshirishlari uchun "Nobel" mukofotiga sazovor buldilar. Goldji bu strukturani

to'rsimon apparat deb atadi. Keyinchalik bu muhim organoidi Goldji nomi bilan – Goldji kompleksi yoki apparati deb nom oldi.

GA ni 2 xil strukturaviy holati mavjud:

1. To'rsimon
2. Diffuz (o'simlik, umrtqasiz hayvonlar hujayralarida)


Hozirgi vaqtda Goldji apparatida polisaharidlarni va lipidlarni sintezi bilan bog'liq bo'lgan fermentlar topilgan. Yorituvchi mikroskoplarda bu organoidning sekretor xususiyati aniqlandi. Goldji apparatini funksiyasini ochishda D.N.Nasonovning klassik ishlari katta ahamiyatga ega.

1914 yilda Raman-Kahal ichakning bakalsimon hujayralarini tekshirib, bu organoid atrofida mayda shilimshiq tomchilar yig'ilganini ko'rdi. Raman-Kahal hujayrada shilimshiqning ishlab chiqaruvchi "fabrika" bo'lib, xuddi o'sha organoid xizmat qiladi deb taxmin qildi. 1970 yilda M.Nyutra va Sh.Lebblonlarning elektron mikroskopik tekshirishlari bu fikrni to'g'riligini tasdiqladi. Bu olimlarni tekshirishlaricha ba'zi hujayralardagi Goldji apparatida lizosomalar hosil bo'ladi. Bu organoid hujayrada bir tipdagi granulalarni hosil kilgach, navbatdagi tipdagi granulani sintez qilishga kirishadi. Ularning fikricha Goldji apparati ribosoma kabi sintetik xususiyatga ega. Oqsil sinteziga javob beradigan ribosomalar kabi bu organoid, aftidan, turli xil murakkab karbonsuvlarni sintez qiladigan asosiy joy bo'lsa kerak. O'simlik hujayralarida Goldji kompleksi hujayra qobig'ini hosil bo'linishida ishtirok etadi. Elektron mikroskop yordamida GA ti 3 xil bo'limlardan tuzilganligi aniqlandi:

1. SIS bo'limi
2. Medial bo'lim
3. Trans bo'lim

GA da 2 ta zona ajratiladi:

1. Proksimal
2. Distal



8.1- rasm. Golje kompleksining ko'rinishi

GA ning membranali pufakchalari EPT da sintezlangan mahsulotni to'plash, kimyoviy o'zgarishi va yetilishida ishtirok etadi. GA ti sisternalarida polisaxaridlar va mukoproteidlar sintezi kechadi va eng muhimi GA ti ishtirokida sekret mahsulotlari hujayradan tashqariga chiqariladi.

2-savol bo'yicha dars maqsadi: Golje apparatining vazifalarini va boshqa organoidlar bilan bog'liqligini anglash

2- savol bayoni: Golje apparatining asosiy vazifalari:

1. Endoplazmatik to'rdagi ribosomalarda sintezlangan eksport oqsili endoplazmatik to'r sisternalarida to'planadi va golji apparati membranalari zonasiga tashiladi.
2. Metabolik jarayon boradi. (oqsillar modifikasiyaga uchraydi)
3. Polisaxaridlar sintezi -o'simliklarning yangi hosil bo'lgan hujayralarida yadro atrofi-da Golje apparatining aktivligi oshib unda hujayra devoir matriksi polisaxaridlarning sintezi amalga oshadi.
4. Yangi hujayra devori mahsulotlarini sintezlaydi- golje apparati pufaklari hujayra plastinkasining kerakli joyiga mikronaychalar orqali birikib bu yerdaplazmatik membranaga qo'shiladilar va yangi hujayra devoir mahsulotlarini sintezlaydilar.
5. GA da mutsin glikoproteini sintezlanib, shilimshiq moddani hosil qiladi. (ichak, nafas olish yo'li, o'simlik ildizi, hasharotho'r o'simliklar)-bu modda mukopolisaxaridlarga boy bo'lib ichkariga qarab o'sayotgan ildizni tuproq zarrachalariga ishqalanishdan saqlaydilar. GA mum-o'simlik yelimini sintezlaydilar.
6. Lipidlar transportida ishtirok etadi. Hazm qilish jarayonida lipidlar parchalanib ingichka ichakda yog' kislotalari va gliserol ko'rinishida so'riladi. So'ng endoplazmatik to'rda lipidlar qayta sintezlanadi, ular oqsil qobog'I bilan qoplanib GA orqali plazmatik membranaga o'tib bu yog'lar limfa tizimiga tushadi.
7. Qisqaruv vakuolasi hosil bo'ladi. (tuban o'simliklarda)-qisqarish vaqtida u plazmatik membrane bilan qo'shib ichidagi mahsuloti ekzositoz yo'li bilan tashqariga chiqadi.
8. Plazmatik membranani yangilanib turishida ishtirok etadi.
9. Lizosomalar hosil bo'lishida-GA hamma eukariot hujayralarda uchraydi (sut emizuvchilarning eritrositlaridan tashqari) . Lekin hamma hujayralarda ham oqsil, lipid va polisaxaridlar sintezlanavermaydi. Lekin shunga qaramay bularda GA yaxshi rivojlangan bo'ladi. Chunki bu hujayralarda lizosomalar hosil bo'lib GA bunda ishtirok etadi.

Nazorat savollari:

1. GA ning kashf etilishi?
2. GA ning strukturaviy tuzilishi?
3. GA ning qismlari?
4. GA da qanday sintetik jarayonlar boradi?

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-9: LIZOSOMALAR

REJA:


1. Lizosomalarning kashf etilishi, tuzilishi va turlari
2. Lizosomalarning vazifalari
3. Peroxisomalar

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Lizosoma, peoksisoma, enzim, ferment, prolizosomalar, postlizosomalar, telolizosoma, avtofagomalar

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Lizosomalarni tuzilishi va turlarini farqlay olish


1- savol bayoni: Lizosomalarni 1955 yilda belgiyalik bioximik (sitolog) De Dyuv tomonidan (sichqon)topilgan. (Nobel). Lizosomalarni gidrolitik fermentlarga ega ekanligini payqadi. Kalamush jigaridan olingan fraksiyalarni o'rganish mobaynida olim ularning ba'zilar turli moddalarni parchalash xususiyatiga ega bo'lgan gidrolitik fermentlarga ega ekanligini payqaydi. Bu fermentlar maxsus sitoplazmatik tanachalar LIZOSOMALAR ekanligi va ularning fermentlari faqatgina lizosoma membranasi shikastlanganda, shok holatlari yuzaga kelganda yoki lizosomalarning o'zi boshqa bir vakuola bilan qo'shilganda faollashadi.



Birlamchi lizosomalar dastlabki hosil bo'lgan lizosomalar hisoblanadi. Ular mayda 100 nm kattalikdagi vakuolalar. Ular qalinligi 50-90 nm keladigan membranalar bilan o'ralgan. Ichi fosfotaza fermentiga to'lgan bo'ladi. Pinositoz va fagositozda ishtirok etadi va ikkilamchi lizosomalarni hosil qiladi.

Morfologiyasiga qarab lizosomalarning 4 tipi farqlanadi.

1. Birlamchi L
2. Ikkilamchi L
3. Autofagosomalar
4. Telolizosomalar (qoldiq tanachalar)



9.2- Avtofagosomalarning hosil bo'lish jarayoni

2-savol bo'yicha dars maqsadi: Lizosomalarni hujayra hayotidagi muhim ahamiyatini tushunib etadi

2- savol bayoni: Lizosomalar hujayra hayotida muhim vazifani bajaradi.

1. Turli moddalarni parchalash
2. Bir-biri bilan qo'shilish
3. Moddalar manomerlargacha parchalanib gialoplazmaga chiqariladi
4. Hujayra ichi mahsulotlarini o'zgartirish (qalqonsimon bez, tiroglobulinni-tiroksinga)
5. Sanitar
6. Avtolizda (o'z-o'zini yemirishda)
7. Rekonstruksiyalash (qayta qurish)
8. Zahira moddalarni parchalash

Bular biologik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan oqsil nuklein kislotalari va polisaharidlarni parchalaydi. Bu moddalar hujayraga ovqat sifatida fagotsitoz va pinotsitoz yo'li bilan kiradi. Lizosoma ularni parchalanishida -lisisida katnashadi. Shuning uchun bu organoidni nomi ham lizosoma (lisis- eritish va soma-tana) deb nomlangan. Lizosomalarning yigindisini hujayralarning "ovqat xazm qilish sistemasi" deb atash mumkin, chunki ular hujayraga kirayotgan barcha moddalarni o'zgarishida ishtirok etadi.

Undan tashqari lizosomalarni fermentlari ta'sirida hujayraning ulgan ba'zi bir strukturalari, yoki butun bir hujayralar xazm bo'lib ketishi mumkin. Lizosomalar ba'zi bir organlarni, masalan, it balikni dumini rezorbsiyasida, yuk bo'lishida asosiy rolni o'ynaydi.

Lizosomalarni fermentlar o'zi turgan hujayrani ham xazm qilib yuborishi mumkin. Olimlarni fakricha hujayralarni "o'zini xazm bo'lib ketishidan" lizosomalarni membranalari saqlaydi. Bu membranani bir butunligini buzilsa hujayra va uning organoidlari xazm bo'lib ketishi mumkin. Lizosomalar hozirgi vaqtda barcha hujayralarda topilgan.

7 Mikronaychalar.

Oxirgi vaqtda mikronaychalarni tuzilishi xaqida juda ko'p ishlar paydo buldi. Ular turli o'simlik va hayvon hujayralarida bayon qilindi. Mikronaychalar nerv hujayralarini, epiteliya hujayralarini, qon tomirlarni endoteliyalarini, silliq va ko'ndalang yo'lli muskul to'qimalari hujayralarini, Sodda hayvonlarni, oshqozoni subepidermal hujayralarini, tarvuzni, elodeyaning barglarini va boshqa o'simliklarni elektron mikroskopik tekshirishlar natijasida ochildi. Ular ko'pchilik hujayralarda topilgani uchun hujayra organoidlarga kiritildi. Har bir mikronaycha 2,5mk atrofida bo'lib, diametri 200-300 A. Mikronaychalar shoxlanmaydi. Ular 3 kvatli membranalariga ega. Mikronaychalar ko'proq hujayra membranasiga yaqin joylashadi. Mikronaychalar undan tashqari hujayra organoidlari bilan ham yakindan aloqada bo'ladi. Kimyoviy tuzilishi hozircha noaniq. Ba'zi olimlar ularni tayanch vazifasini bajarsa kerak deb, ya'ni sitosklet deb qarashadi. Mikronaychalarni boshqa organoidlar bilan aloqasi ularni kanallarida suyuqliklar sirkulyatsiya qilsa kerak deb taxmin qilishga asos bulmoqda.

Ba'zi olimlar mikronaychalarni strukturasi axromatin ipchalar qoldigi bo'lsa kerek deb taxmin kilmoqdalar. Bulrni barcha hujayralarda toptlganligi ularni hujayrani hayot faoliyatida muhim ahamiyatga ega ekanligidan darak beradi, shuning uchun ham bu soxadagi tekshirishlar davom ettirilmoqda.

3-savol bo'yicha dars maqsadi: Peroxisisomani hujayra hayotidagi muhim ahamiyatini tushunib yetadi

3- savol bayoni: Eukariot universal organoididir. Lizosomalar kabi K.D.Dyuv tomonidan topilgan. Bir qavat membrana bilan o'ralgan bo'lib, membranalari suyuq mozayka tuzilishga ega. Ichida NUKLEOIDI bo'ladi. U fibril va mikronaychalardan iborat bo'lib uratoksidaza fermentiga ega. Lizosomalardan farq qilib, faqat mavjud peroksomonning bo'linishi orqali ko'payadi. Shuning uchun o'z peroksomalarini yo'qotgan hujayra ularni qayta tiklay olmaydi.

Vazifalari:

1. P-malarning karalaza fermenti yordamida vodorod peroksidini suv va kislorodga parchalaydi.
2. Yog' kislotalarni parchalaydi.
3. Etil spirtini 50% I bu yerda asetildegid va sirka kislotasigacha parchalaydi

Peroksisomalar 3 guruhni tashkil qiladi

1. Glioksisomalar- yog'larga boy urug'larda lipidlarni saxarozaga parchalanishida ishtirok etadi.
2. Mitoxondriya va plastidalar bilan bog'liq bo'lib nafas olishda ishtirok etadi. (barglarda)
3. Boshqa turdagi to'qimalarda uchraydigan differensialanmagan peroksisomalar



9-3 rasm. Peroksisoma ko'rinishi

Nazorat savollari:

1. Lizosomalar qachon kim tomonidan qanday organizmlarda kashf etilgan?
2. Lizosomalar qaysi organizmlarda ko'proq topilgan?
3. Lizosomalar tipi?
4. Avtofagiya nima?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- Lizosomalar faoliyati qanday amalga oshadi?
- Lizosomalarning hujayra ichidaga mahsulotlarni o'zgartirishdagi ishtiroki.

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-10: VAKUOLA. MAVZU: O'SIMLIK HUYAYRASI VAKUOLASI

REJA:

1. Vakuolaning tuzilishi va ahamiyati.
2. Hujayra shirasining tarkibi

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Vakuola, osmos, tonoplast, fagositoz, pinositoz, avtoliz, hujayra shirasi.

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Vakuolaning tuzilishini o'rganadi va ahamiyatini biladi

1- savol bayoni: Barcha o'simlik hujayrasi sitoplazmasida vakuolalar bo'lib ular muhim ahamiyatga ega. Yosh hujayralarda bir nechta mayda vakuolalar bo'lib , ixtisoslashgan sari ular bir-biriga quyilib yirik vakuolalarni hosil qiladi. U ko'p hollarda hujayrani 80 % qismini egallaydi. Vakuola (lot- vacuus – bo'sh) ma'noni anglatadi. Vakuolalar ichi

suyuqlik bilan to'lgan membranali haltacha. Hayvon hujayralarida kichik 3 turdagi vakuolalar uchraydi:

1. Fagositoz
2. Hazm qilish
3. Qisqarish
4. So'rish

O'simlik hujayrasi sitoplazmasida muhim fiziologik ahamiyatga ega bo'lgan vakuolalar mavjud.


1. Turgor osmotik
2. Rang berish
3. To'plash

Vakuolalar hujayraning 80-90% egallaydi. Vakuolani plazmatik membranaga o'xshash memrana TONOPLAST o'rab turadi.

O'simlik hujayrasi vakuolasi muhim quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Suv konsentrlangan hujayra shirasi ichiga osmos yo'li bilan tonoplast orqali o'tadi.
2. Gullar, mevalar rangini belgilaydi (antosian)
3. Avtolizda ishtirok etadi (gidrolitik fermentlar)
4. Vakuolalarda hujayra metabolizmining chiqindi moddalari saqlanishi mumkin: oksalat kalsiy kristallari, alkaloidlar va tanin moddasi.
5. Zahira ozuqa moddalar to'planadigan joy
6. Lizosoma faolligini boshqaradi

Markaziy vakuolaning eng muhim hususiyatlaridan biri hujayrani turgor bosimini ushlab turishdan iborat. Vakuolada molekulalar uning erigan *osmotik* konsentrasiyasini hosil qiladi. Vakuola shirasining molekulyar konsentrasiyasi hujayra tonoplast membranasining yarim o'tkazish xususiyati, vakuolani osmometr sifatidagi rolini yuzaga keltiradi. Hujayraga mustahkamlik va turgor-taranglik hususiyatlarini paydo qiladi.



10-1 rasm. Vakuolada osmos-turgor jarayoning sodir bo'lish jarayoni.

2-savol bo'yicha dars maqsadi: Vakuolaning kimyoviy tarkibini biladi

2- savol bayoni: Hujayra shirasida doimo bo'ladigan moddalar qatoriga qandlar, ulardan saxaroza hamda glyukoza va fruktoza kiradi. Yetilayotgan urug'larning hujayralaridagi vakuolada kolloid eritma holida oqsil to'planganligi tufayli ular oqsilli vakuola deb ham aytiladi. Urug' quriyorganda yetilishini ohirida vakuoladan suv chiqib ketishi bilan oqsil konsentrasiyasi ortadi bu esa uni kristal holiga o'tishiga olib keladi. Bunday vakuolalarni ALEYRON donalari deyiladi.

Hujayra shirasida organik kislotalardan limon, olma qahrabo, sovun kislotalari boshqalaridan ko'p uchraydi. Bu kislotalar hali yetilmagan mevalarda ko'p bo'ladi. Mevalar yetilishi davrida bu kislotalar nafas jarayonida sarflanib ketadi, shu tufayli mevalardagi nordonlik yo'qoladi Organik kislitalarning tuzlari hujayradagi osmotik jarayonlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Hujayra shirasi tarkibida oshlovchi moddalar –taninlar ko'p uchraydi. Bu azotsiz organik birikmalar fenollar hosilalari bo'lib burushtiruvchi mazzaga ega.

Alkoloidlar- azotli geterosiklik achchiq tamli moddalar hisoblanadi. Ular ishqoriy xususiyatga ega va hujayra shirasida odatda tuzlar holida bo'ladi. Hozirgi kunda 2000 dan ortiq alkoloidlar tavsiflangan. Alkoloidlardan kafein, atropin, xinin tibbiyotda dorivor sifatida keng foydalaniladi. Bir qator o'simliklarni masalan lolaqizg'aldoq, qoqio'ni jarohatlanganda ajraladigan sut shirasi ham vakuola suyuqligi hisoblanib ular alkoloidlarga boy hisoblanadi.

Glikozidlar- qandlarni spirtlar, aldegidlar, fenollar va boshqa birikmalar bilan hosil qilgan tabiiy birikmalar hisoblanadi. O'simliklardagi glikozidlarning ancha-munchasidan tibbiyotda foydalaniladi. Hujayra shirasining tarkibidagi pigmentlardan flavinoidlar hujayra shirasiga qizil, ko'k yoki safsar tus bersa, boshqalari sariq rang beradi. Gulning tojbargini nihoyat darajadagi rang barang tovlanishlari antasianlarning mavjudligi belgisi. Vakuola o'simlik hujayrasida tashlandiqlarni va moddalarni g'amlab turish hamda turgorlik-taranglikni ta'minlash vazifalarini bajaradi.

Katta vakuoladagi ionlar va qandlarning konsentrasiyasi hujayra po'stidagidan odatda katta bo'ladi. Bunga vakuola po'sti tonoplastni bu moddalarning diffuz holda tarqalishiga ancha qarshilik qilish va shu bilan birga suvni oson o'tkazishi sabab hisoblanadi. Mana shu holat OSMOS deyiladigan jarayon tufayli ro'y beradi. Hujayra shirasiga o'tayotgan suv protoplastga, u orqali esa po'stga bosim ta'sirini ko'rsatib uning tarangligini –TURGOR holatda bo'lishiga olib keladi.

Nazorat savollari:

1. Vakuolaning hujayra hayotidagi ahamiyati?
2. Qanday tipdagi vakuolalarni bilasiz?
3. Qanday vazifalarni bajaradi?
4. Vakuola qanday hosil bo'ladi?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- Vakuolaning osmos va turgordagi ahamiyatini tushuntiring
- Lizosomalarni boshqarishdagi rolini tushuntirin

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-11: MEMBRANAGA EGA BO'LMAGAN ORGANELLALAR

REJA:

1. Ribosomalar
2. Sentiola, bazal tanacha, kiprikcha, xivchin
3. Hujayraning tayanch-harakat tizimi. Sitoskelet

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Ribosoma, sentiola, bazal tanacha, kiprikcha, xivchin, sitosketsentrafuga, subbirlilik, inisiatsiya, elongasiya, terminasiya

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Ribosomalarni hujayradagi ahamiyati va vazifalarini biladi



1-savol bayoni: Ribosomalar diametri 20 nm ga teng mayda organoidlar. Birinchi marta elektron mikroskop yordamida 1953 yilda **J.Pallade** tomonidan topilgan. Ayrim adabiyotlarda ribosomalar 1880 yilda Gansteyn tomonidan ochildi va dastlab mikrosomalar deb ataldi deb ham yuritiladi. Uning nozik tuzilishlari faqat elektron mikroskop orqaligina aniqlandi. Ribosomalar dumaloq shaklli bo'lib, diametri 150-350 Å keladi. Ichak tayoqchasini elektron mikroskopik tekshirishlar bu bakteriya ribosomasini har xil kattalikdagi 2 subbirlilikdan iborat ekanini ko'rsatdi. Katta subbirlilikni, kichik subbirlilik bilan birikkan joyi qabariq yuzaga ega, ikkinchisini esa shu joyi biroz botiq bo'ladi. Katta sub-birlilikni ko'ndalang kesigi 150-180 Å bo'lib, uchburchak, trapetsiya yoki ko'pburchak shaklidir. Har ikkala sub-birlilik yadrocha hosil bo'ladi, ammo ularning birikib, ribosoma hosil qilishi sitoplazmada amalga oshadi.

Ribosomalar tarkibida ribosomal RNK va oqsillar mavjud bo'lib (ribonukleoproteinlar), ularning o'zaro munosabatlaridan 2 subbirlilik tuziladi: katta va kichik. Ribosomalar juda kichik bo'lganligi uchun hujayrani diferensial sentrafugalashda ular eng oxirida ajraladi ya'ni sedimentatsiyalanadi. Ular prokariotlarda 70 S (Svedberg) birligi bo'lib, sentrafugadagi sedimentasiya birligini ifodalaydi. Oqsil sintezida ishtirok etish. Ribosomalarda aminokislotalar bir-biriga ulanib, uzun polipeptidni hosil qiladi. Ribosoma oqsil sintezida molekulalarning bir-biri bilan bog'lanadigan joy bo'lib xizmat qiladi. Subbirliliklar bir-biri bilan muloqatda bo'lib oqsil sintezlovchi yoki translatsiyada ishtirok etuvchi faol markazlarni hosil qiladi.

Oqsil sintez jarayoni 3 bosqichga bo'linadi:

1. Inisiatsiya
2. Elongasiya
3. Terminasiya

Oqsil sintezini amalga oshirishda hamma ribosomalar ham aktiv rol o'ynamaydi. Oqsil sintezi ko'proq endoplazmatik tur membranalarida joylashgan ribosomalar ishtirokida bo'ladi. Yadrodagi ribosomalarda yadro oqsillari sintez bo'ladi. Mitoxondriya va plastidlardagi ribosomalar esa o'sha organoidlarning oqsillarini sintez qilishda ishtirok etadi.



11.1 va 2 rasmlar. Ribosomaning ichki tuzilishi va oqsil biosintezining amalga oshishi

Eukariot hujayralarda ribosomalarning 2 xil guruhi uchraydi: erkin ribosomal va EPT bog'langan ribosomal. EPR-sekresiya oqsillari.

Avval aytilganidek, juda ko'p ribosomal granulyar endoplazmatik tur membranalariga joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari ancha ko'p miqdor ribosomal sitoplazmani asosiy moddasi ichida erkin holda joylashgan. Ular xech qanday membranali strukturalar bilan bog'lik emas.

Ribosomal yadroda ham topilgan. Ulardan bir qismi karioplazmada erkin joylashsa, qolganlari esa ipsimon strukturalar bilan bog'liq bo'ladi.

Hozirgi vaqtda ribosomal mitoxondriyalarda va o'simlik hujayralarining plastidalarida ham topilgan. Ribosomal ribonukleoproteidlarning bo'lakchalari bo'lib, ular deyarli bir xil mikdordagi oqsil va RNK dan iborat. Har bir ribosomaning molekulyar og'irligi 3 mln. atrofida bo'lib, uning 60% i ribosomal RNKga, 40% i esa oqsilga to'g'ri keladi. Bitta ribosomada 2,3 ta RNK joylashadi. Ribosomal har bir hujayraning albatta bo'ladigan organoididir.

Oxirgi tekshirishlarni ko'rsatishicha 5-70 ribosomadan iborat ribosoma kompleksi bir bo'lib, sintezda ishtirok etar ekan. Buni *poliribosoma* deyiladi. Bunda ribosomal bir-birlari bilan ingichka iplar bilan bog'langan, ular I-RNK molekulasidan iborat. Ribosomal hujayraning qayerida hosil bo'lishi xaqidagi masala hozirgacha aniq yechilgan emas, ammo ribosomalarning 1) yadrochada hosil bo'lishi, so'ng ularni yadroga o'tishi, undan esa sitoplazmaga o'tishi ancha ishonarli dalillar bilan isbotlandi. 2) ribonukleoproteid, aminokislota va fermentlardan sitoplazmada hosil bo'lishi mumkin.

2-savol bo'yicha dars maqsadi: Sentiola, bazal tanacha, kiprikcha, xivchinlarni hujayradagi ahamiyatini o'rganish

2-savol bayoni: **Sentriola**-tuzilmasi 1875 yilda **V.Flemming** 1876 yilda **Z.Beneden** tomonidan topilgan. Hayvon hujayralari uchun hos. Bo'linayotgan hujayralarda bo'linish dukini hosil qilishda ishtirok etadi. Sentriolani hosil qilishda aylana boylab joylashgan mikronaychalarning 9 ta tripleti ishtirok etadi. Tripletning birinchi mikronaychasi (A) 13 globulyar subbirliklardan tuzilgan. 2-ch va 3-ch mikronaychalar (B,C) A mikronaychadan to'liqmasligi bilan ajralib 11 globulyar birlikdan tuzilgan. S-

laning mikronaychalari tizimi $(9+3)+0$. Interfaza hujayralarida ikkita yonma-yon joylashgan sentriolalar bo'lib, ular diplosoma deyiladi. Ularning biri ona ikkinchisi qiz sentriola deb ataladi. Sentriolalar soning oshishi *duplikasiya* deyiladi.


Titik organizmlarning har xil hujayralari maxsus harakat moslamalariga kiprik va hivchinlarga ega. Yorug'lik mikroskoplarida ular hujayraning ingichka o'simtalari shaklida ko'rinadi. Ularning asosida sitoplazmada yazshi bo'yaluvchi mayda donachalar bazal tanachalar bo'ladi. **Kiprikchalar** hujayra sitoplazmasining ingichka silindrsimon o'sig'i bo'lib, diametri 200 nm ga teng. Bu o'siq asosidan ustki qismigacha plazmatik membrana bilan qoplagan bo'lib, kiprikcha markazida mikronaychalar tizimi joylashadi. Kiprikchadagi mikronaychalar tizimini **aksonema** deyiladi. Kiprikchalar aksonemasi bazal tanacha va sentriola mikronaychalar tizimidan farqli ravishda 9 triplet dan iborat bo'lmay, balki aksonema devorini hosil qiluvchi 9 juft periferik va 1 juft markaziy mikronaychadan iborat. Umuman kiprikchalar mikronaychalar tizimini $(9 \times 2) + 2$ deb yozish mumkin. Sentriolada esa bu tizim $(9 \times 3) + 0$ ga teng. Bazal tanacha va kiprikchalar aksonemasi uzviy bog'liq bo'lib, ular bir-biriga davom etuvchi tuzilmani hosil qiladi. Aksonemadagi A mikronaychalar tarkibida dinein oqsili topilgan. Mikronaychalar tarkibidan bu oqsil olib tashlansa aksonemalar harakatdan to'xtaydi. Undan tashqari tublin oqsili uchraydi. **Harakat a'zolari.** (xivchin, to'lginsimon, ichak epitelisi) Dinein oqsili, miozin va aktin.

3-savol bo'yicha dars maqsadi: 3. Hujayraning tayanch-harakat tizimi, sitosketni hujayradagi ahamiyatini o'rganish

3-savol bayoni: Hujayraning sitosketini 1. Mikrofilamentlar 2. Mikronaycha 3. Oraliq filamentlar hosil qiladi.

Mikrofilamentlar ko'p hujayrali organizmlarning qisqaruvchi tuzilmalari – miofilamentlarni hosil qiladi. Funktsional birligi SARKOMER. Miofilament mayda profi-fibrillardan iborat. Pr-larning ingichkasi AKTIN oqsilidan, yo'g'onlari MIOZIN oqsilidan iborat. Silliqliq muskullarda ham aktin-miozin kompleksi bor, lekin sarkomerlar hosil qilmaydi.

Mikrofilamentlar- ingichka oqsil iplari. Harakat qiluvchi hujayralarning psevdopodiyalarida, mikronaychalar tarkibida ko'p. Suv o'tlarining xloroplastlari harakatini mikrofilamentlar amalga oshiradi. O'simlik hujayrasidagi sikloz ham Mikrofilamentlar bajaradi. **Oraliq filamentlar-** mikronaychalardan kichikroq mikrofilamentlardan kattaroq bo'lgani uchun ham shunday nomlanadi. Epiteliyda KERATIN, mushakda-DESMIN, biriktiruvchi to'qima, tog'ay, suyak to'qimasida VIMENTIN oqsilidan iborat. (oyoq va qo'l kafti epitelisi) Oraliq filamentlar birlashib TONOFIBRILLARNI hosil qiladi, ular desmosomalar bilan bog'lanib SKELETNI hosil qiladi.



Gambar 8. Rangka sel atau sitoskeleton.

Membranasiz, tublin oqsilidan iborat tuzilma bo'lib euklariotlar uchun hosdir. Sitoplazmada erkin joylashib, bo'linish duki tarkibida, sentriolalar, bazal tanachalar atrofida uchraydi. Kiprikcha va xivchinlarni asosiy hosil qiluvchi elementlari. Ichi bo'shliq to'liq silindirlar uni hosil qilishda 13 subbirlikdan iborat bo'lgan protofilamentlar ishtirok etadi. Mikronaychalar o'zi yig'ilib hosil bo'ladi. Buning uchun tublin oqsili, magniy ionlari bo'lishi va kalsiy ioni bo'lmasligi kerak. Sitoplazma mikronaychalari-gialopazmadagi mikronaychalar asosan sitoplazma hosilalari: nerv hujayralari, shaklini o'zgartiruvchi hujayralarda bo'ladi. Ularning vazifasi elastik lekin turg'un sitosketni hosil qiladi. Vazifasi 2 xil: 1. Sklet 2. Xarakat. Sklet vazifasi hujayra shaklini muvozanatlab turadi. Xarakat vazifasi: pinositoz, fagositoz, lekositlar, fibroblastlar. (Temir yo'l)

Nazorat savollari:

1. Ribosomalarning turlari mavjudmi?
2. Oqsil biosintezidagi roli?
3. Ribosomaning anatomik tuzilishi?
4. Hujayra tashqi organoidlari?
5. Mikronaychalarning hosil bo'lish jarayoni?
6. Oraliq filamentlar nima? Nima sababdan shunday nomlangan?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

- Ribosomaning kimyoviy tarkibi
- Harakatlanmayrdigan hujayralarda sentriolaning roli

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-12: YADRO. MAVZU: HUYAYRA YADROSI

REJA:

1. Yadroning kashf etilishi, struktura tuzilishi va vazifasi
2. Yadroning kimyoviy tarkibi

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Yadro, yadrocha, karioplazma, xromarin, xromasoma, membrane, DNK, oqsil biosintezi

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Yadroning hujayradagi ahamiyati va vazifalarini biladi

1-savol bayoni: Birinchi marta Angliyalik **Robert Broun** 1833 yili arxideya o'simligining hujayra yadrosini birinchi marta har tomonlama o'rgandi va u hujayraning asosiy komponentlaridan biri ekanligini isbotlab berdi.

Yadro bo'linishga qobiliyatli har qanday o'simlik va hayvon hujayralarining muhim qismidir. U sitoplazmadan odatda aniq chegara bilan ajralib turadi. Bo'yalmagan tirik hujayralarda yadro bir jinsli pufakchadek ko'rinadi. Ba'zan yirik yoki mayda donachali strukturalar ko'rinadi. Xamma hollarda ham o'zining yorug'lik sindirish ko'rsatkichi bilan farqlanadigan yadrocha ancha aniq ajralib turadi.

Bakteriyalar va ba'zi ko'k-yashil suv o'tlari shakllangan yadroga ega emas; ularni yadrolari yadrochasiz va sitoplazmadan aniq ko'rinadigan yadro membranasi bilan ajralib turmaydi. Lekin yadroning asosiy komponenti irsiy axborotni olib yuruvchi xromosomalar hamma hujayralarda bo'ladi.

Yadroni tuzilishi va funksiyasi o'tgan asrni oxiridan to hozirgi kungacha jadal suratlar bilan o'rganilmoqda, Uning bo'linish protsessidagi va bo'linish oralig'idagi - interfaza holatlari kuzatiladi. Quyida interfaza yadrosining tuzilishi bilan tanishamiz.

Yadroning shakli, soni va yadro-sitoplazma munosabati.

Yadroning shakllari har xil va ko'pchilik hollarda hujayraning shakliga mos keladi. Dumaloq hujayralarda yadro dumaloq, cho'ziqlarda, masalan silliq muskul hujayralarda yadro ham cho'ziq bo'ladi. Lekin ko'pchilik shoxlangan hujayralarida, masalan nerv hujayralarda yadro odatda dumaloq bo'ladi.

Yadroni soni turli hujayralarda turlicha bo'ladi, bir yadroli hujayralar tipik bo'ladi. Ammo, ba'zi jigar va togay hujayralari ikki yadroli, ko'ndalang yo'lli muskul tolalari ko'p yadroli, suv o'tlaridan vasheriya hujayralari xattoki bir necha yuz yadroli bo'lishi mumkin.

Yadro-sitoplazma munosabati deganda yadroning xajmini, sitoplazma xajmiga nisbati tushiniladi. Bu ma'lum tip hujayralarda, muayyan sharoidda o'zgarmas bo'ladi. Buning ma'nosi shuki, ma'lum xajm yadro, ma'lum massa sitoplazmani kontrol qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ma'lumki, zigota maydalanayotganda borgan sari kichik o'lchamli blastomerlar hosil bo'lib boradi, ammo yadro bilan sitoplazma xajmi o'rtasidagi nisbat doim saqlanadi.

Yadro qobig'i-2 qavatli bo'ladi: ichki va tashqi yadro membranalaridan iborat. Ular orasida perinuklear bo'shliq joylashadi. Tashqi yadro membranasi odatda endoplazmatik to'r kanallari bilan aloqada bo'ladi. Har bir membrana elementar membrana tuzilishiga ega.

Yadro qobig'i juda ko'p teshiklarga (poraga) ega. Ular tashqi va ichki membranalarni birikishidan hosil bo'ladi, ularning soni turlicha.

Bu teshiklar orqali karioplazma sitoplazma bilan bevosita kontakt (aloqada) da bo'ladi. Teshiklar orqali ancha katta molekulali nukleozitlar, nukleotidlar, aminokislota va oqsillar oson o'ta oladi. Shunday qilib, sitoplazma va yadro o'rtasida aktiv almashinuv amalga oshadi.

Yadro shirasi-karioplazma. U stukturasiz holda xromosoma va yadrolarni o'rab turadi. Yadro shirasini ilashimlilik sitoplazmaning asosiy moddasi ilashimlilikidek. Yadro shirasini kislotaliligi sitoplazmaniqidan biroz yuqori. Karioplazmada oqsillar va RNK bo'ladi. I. B. Zbarskiyning bergan ma'lumotlariga qaraganda sichkonning jigar hujayrasi karioplazmasida 92-98% (quruq og'irligi) globo'lin fraksiyasi oqsili va 2-8% RNK bo'ladi. Yana yadroda nuklein kislotani sintezida ishtirok etuvchi fermentlar va ribosomalar bo'ladi.

Yadrocha-Yadrocha tipik interfaza yadrosining doimiy qismi bo'lib, membranaga ega bo'lmagan birdan bir strukturadir. Uning kattaligi har xil bo'lib, u hujayraning funksional holatiga bog'lik. Yirik yadrochalar odatda embrional hujayralarda yoki oqsilni aktiv sintezlayotgan hujayralarda, sut emizuvchilarni ootsitlarida, nerv hujayralarida va ba'zi bezlar hujayralarida uchraydi. Yadrochalar aktiv maydalanayotgan tuxum hujayralarda bo'lmaydi. Ba'zan hujayralar bir qancha yadrochaga ega bo'ladi, ularni ko'pchiligi amfibiyalarni sotsitlarini intensiv o'sish davrida hosil bo'ladi.

Yadrocha fizik xususiyatlariga ko'ra yadroning zichlanganroq qismi hisoblanadi. Yadrochaning ximiyaviy tarkibi RNK konsentratsiyasi biroz yuqoriligi bilan ajralib turadi. Yadrochani asosiy komponentlari kislotali oqsillar (fosfoproteinlar) va RNK dir. Bulardan tashqari yadrochada bog'langan yoki erkin holdagi kalsiy, kaliy, magniy, temir va rux fosfatlari uchraydi. Yadrochada DNKni mavjudligi aniqlanmagan. Yadrochalarning funksiyasi sito-plazmani ta'minlovchi ribosomalarni hosil qilish yoki yigishdir. Buni quyidagi misolda ko'rish mumkin. Ba'zi bakalar ustida o'tkazilgan eksperimentlarda (xeporis) gomozigota holidagi tuxumda yadrocha bo'lmagan. Bunda otalangan tuxum blastula stadiyasigacha rivojlangan. Blastomerlarni yadrolarida ribosomalar hosil bo'lmaydi, murtak o'ladi, blastula stadiyasigacha taraqqiy etishi ovogonez vao'tidagi hosil bo'lgan ribosomalar hisobiga bo'ladi.

Binobarin, ribosomalar yadrochalarda shakllanadi, lekin ribosomalarning hosil qiluvchi RNK va oqsillar xromosomalar bilan aniqlanadi. Hozirgi vaqtda yadrochada yigiladigan RNK ni DNK qismidan hosil bo'lishi aniqlangan. Yadrochaning oqsili kandan hosil bo'lishi hozirgacha aniq emas. Kurinishicha u yadrochani o'zida hosil bo'lib RNK bilan birlashib, ribosomani hosil qiladi. Yadrocha doimiy struktura emas: u mitozni boshlanishiga yukolib ketib, telofazaning oxirida yana hosil bo'ladi. Yadrochaning RNK va oqsili yoki yadrochaning tashkilotchisi oblastiga tarqaladi yoki RNK yangidan sintezlanadi, so'ng RNK va oqsil yadrocha tashkilotchisi oblastida tuplanadi.

Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra yadrochalar yadro membranasi orqali sitoplazmaga chiqar ekan. Yadrochalar bir biri bilan qo'shilib ketishi yoki ko'rtaklanishi mumkin.

Hujayrada yadroning vazifasi

O'tgan asr oxirlarida o'tkazilgan tajribalarda amyoba yoki infuzoriyalarning yadrosiz qismlarini kesib olingan, ular bir qancha vaqtdan so'ng o'lgan. Mufasssalroq tekshirishlarni ko'rsatishicha yadrosini olib tashlangan amyobalar yashaydi, ammo operatsiyadan so'ng tezdayoq ovqatlanmay quyadi va biroz vaqtdan so'ng o'ladi. Agarda yadrosizlantirilgan hujayraga yana yadroni olib kirilsa, normal hayot faoliyat tiklanadi, bir qancha vaqtdan so'ng amyoba bo'lina boshlaydi. Yadrosizlantirilgan dengiz kiprisi tuxumi partenogenetik ko'payishga stimulyatsiya qilinganda maydalanadi, ammo bu ham keyinchalik oladi.

Ayniqsa qiziq tajribalar bir hujayrali yirik suv o'ti atsetabulyariyada qilinadi. Yadrosizlantirilgandan so'ng u yashabgina qolmay ma'lum vaqtgacha yadrosiz qismlarini tikladi. Binobarin, yadro olib tashlanganda hammadan avval ko'payish xususiyati buziladi, qandaydir vaqtgacha hayot faoliyat saqlansa ham, oxiri bunday hujayralar o'ladi. Biokimyoviy tekshirishlarni ko'rsatishicha yadrosizlantirilganda hujayra RNK sintezlamas ekan. Oqsil sintezi esa ancha vaqtgacha yadrosizlantirilganga qadar shakllangan informatsion RNK va ribosomalar hisobiga davom etadi.

Yadroning rolini yanada yakkolroq illyustratsiyasini sut emizuvchilarning yadrosiz eritrotsiti berishi mumkin. Bu tabiatni o'zi tomonidan quyilgan eksperimentdir. Eritrotsitlar yetilib borib gemoglobin tuplaydilar, keyin yadrosini tashlab yuborib, 120 kun davomida yashaydilar va ish bajaradilar. Ular ko'paya olmaydilar. Yadrosi olib tashlangan retikulotsit deb ataluvchi hujayralar ham oqsil sintezini davom ettiradi, ammo RNK sintezlay olmaydilar.

Yadroni olib tashlash sitoplazmaga yadroning xromosomasida joylashgan DNK molekulasida sintezlanadigan yangi RNK larni kelishini to'xtatadi. Ammo, bu sitoplazmada avvaldan mavjud bo'lgan informatsion RNK ni oqsilni sintez qilishini davom ettirishiga halakit bermaydi. RNK yemirilgandan so'ng oqsil sintezi tuxtaydi, ammo eritrotsit uzok vaqt yashaydi va unchalik ko'p oqsil sarf bo'lmaydigan funksiyasini bajaradi.

Yadrosini olib tashlangan dengiz kiprisi tuxumi ovogonez vaqtida tuplangan RNK hisobiga yashashni davom ettiradi va bo'linishi ham mumkin.

Yadro RNK sintezini murakkab koordinatsiyasi va regulyatsiyasini amalga oshiradi. Xamma uch xil RNK DNK dan hosil bo'ladi. Turli metodlar bilan (radiografiya) aniqlanishicha RNK sintezi yadroda-xromatin va yadrochada boshlanadi va sintezlanib bo'lgan RNK esa sitoplazmaga o'tadi.


Shunday qilib, yadro sitoplazmada bo'ladigan oqsilni sintezini dasturini tuzadi. Ammo yadro o'zi ham sitoplazmaning ta'siriga uchraydi, yadroni normal ishlashi uchun zarur bo'lgan, sitoplazmada sintezlangan fermentlar yadrochaga o'tadi. Masalan, sitoplazmada DNK - polimeraza fermenti sintezlanadi, usiz DNK molekulasi avtoreproduksiyasi bo'lmaydi.

Shuning uchun, yadro va sitoplazmaning o'zaro ta'siri to'g'risida gapirish lozim. Bunda kiz hujayralarga beriluvchi irsiy informatsiyani o'zida tutuvchi yadro ustunlik rolini o'ynaydi.

Olimlar mikroxirurgiya metodi yordamida shoxlangan va dumalok amyobalarning yadrolarini almashtirdilar. Bunda yadroning ta'sirida amyobalarning

tanasi shakli o'zgaradi. Agar oddiy amyobani yadrosini olib, shoxlangan amyobaga, shoxlangannikini oddiy amyobaga ko'chirilsa u holda usha yadroni ta'sirida oddiy amyoba shoxlangan amyobani shakliga kiradi va aksincha. Demak, yadro irsiy belgilarni tashuvchi mexanizm bo'lib xizmat kilar ekan.

Buni tut ipak qurtini chatishtirish ustidagi tajribalar ham tasdiqlaydi. Bunda faqat otalik yoki onalik jinsiy hujayralardan avlodlar olindi. Bunda otalikni sitoplazmasi saqlanadi. Lekin avlodda belgi, masalan, rang yadro tomonidan olib kiriladigan belgiga xos bo'ladi.



12.1- rasm. Yadro qobig'i va yadro poralaridagi jarayon

2-savol bo'yicha dars maqsadi: Yadroning kimyoviy tuzilishini biladi

2-savol bayoni: Yadroning kimyoviy tuzilishini o'rganishda ultratsentrifuga yordamida yemirilgan hujayralardan yadrolarning toza fraksiyasini ajratishga erishildi, ular kimyoviy analiz qilinib, alohida komponentlarni nisbatlari aniqlandi.

Yadroning quruq moddasini asosiy massasini 70-96%ini oqsillar va nuklein kislotalar tashkil qiladi; undan tashqari yadroda lipidlar va boshqa sitoplazmaga xos moddalar bo'ladi.

Yadro oqsillari 2 tipda bo'ladi. 1). gistonlar yoki protaminlar - asosiy oqsillar. Protaminlar baliklarni spermasida, boshqa hamma hujayralarda esa gistonlar topilgan. Yadrodagi gistonlarni miqdori nisbatan doimiy va DNK miqdoriga proporsional o'zgaradi. DNK bilan ular dezoksiribonukleoproteinlarni hosil qiladi. 2).yuqoriroq molekulyar og'irlikka ega bo'lgan kislotali oqsillarning yadrodagi miqdori turlicha bo'lishi mumkin.[1]

Asosli oqsillar yadro xromatini tarkibiga kiradi; kislotali oqsillar esa ko'proq yadro qobiqlarida, yadrochada va karioplazmada bo'ladi.

Lipidlar miqdori juda oz bo'lib, asosan yadro qobig'ida joylashadi.

Mineral moddalardan yadroda fosfor, kaliy, natriy, kalsiy va magniylar topilgan.

Yadroning fermentlari- Yadroning fermentlari giston emas oqsillardan tashkil topgan.

Yadroning nuklein kislotalar metabolizmidagi qatnashuvchi fermentlari eng muhimlaridir. Ularga DNKni sintezini amalga oshiruvchi DNK-polimeraza kiradi.

RNK-polimeraza esa DNK bilan shuningdek, fermentlardan nukleozionrifosfataza va gistonatsetilazalarga ham bog'liqdir.

Yadroda nukleozitlarni metabolizmi bilan bog'lik bo'lgan adenozin dezaminaza, nukleozitfosfarilaza va guanazalar ayniqsa ko'p topiladi. Yadroda yana eruvchi glikoliz fermentlaridan aldolaza, yenulaza, piruvatkinaza va 3-glitseraldegitfosfat degidrogenazalar uchraydi. Bu fermentlarni bo'lishi ATFni yadroda hosil bo'lishini asosiy yo'li glikolitik aktivlikdan kelib chiqadi deb xulosa chiqarishga asos bo'ladi.

Nuklein kislotalar-dastlab yadroda topildi va ajratib olindi. Ularning 2 xili ma'lum: DNK va RNK deyarli hamma vaqt yadroda bo'ladi, RNK esa ham yadroda va sitoplazmada bo'ladi. DNK molekulasiining strukturasi jihatidan ximiyada ma'lum bo'lgan bironta ham birikmaga o'xshamaydi. DNK molekulasi bir-birining atrofida spiral shaklida buralgan 2 ta paralel zanjirdan iborat. DNKdagi qo'shaloq spiral juda uzun bo'ladi, deyarli 5mk ga yetadi. DNK molekulasi eng yirik oqsil molekulasidan 50 barobar uzunroq. Shunga muvofiq holda DNK molekulyar og'irligi juda katta bo'lib, 10 malnga yetadi. Yaqinda moluklyar og'irligi 130 mln li DNK topildi, uning molekulasiining uzunligi 50-60 mk. Bu raqamlar qo'shaloq spiralga ta'luqli bo'lib, har bir ipga uning yarmi to'g'ri keladi.

Ximiyaviy jihatdan DNKning har bir zanjiri polimer bo'lib, uning monomerlari nukleotidlardir. Nukleotid 3ta molekulaning: 1) azotli asos-purin yoki pirimidin, 2) oddiy karbon suv-pentoza-riboza yoki dezoksiriboza, 3) fosfat kislota molekulalarining ximiyaviy yo'l bilan birlashidan hosil bo'lgan birikma.

DNK molekulasiining tuzilishida 4 xil nukleotid katnashadi. Bular azotli asosining strukturasi jihatidangina farq qiladi.

Bir nukleotiddagi azotli asos adenin deb ataladi, nukleotid ham xuddi shu nom bilan ataladi. 2- nukleotidning azotli asosi guanin, nukleotidi guanin deb yuritiladi. 3- nukleotiddagi azotli asos sitozi deb nukleotidi esa sitozi nukleotidi deb yuritiladi. Nixoyat 4- nukleotiddagi azotli asos timin deb, uning nukleotidi timin nukleotidi deb yuritiladi.

Nukleotidlarni nomlarini qisqargan holda ularning birinchi harflari bilan nomlanadi, ya'ni: Adenin-A, Guanin-G, Sitozi-S va Timin-T.

Har bir DNK da nukleotidlar kat'iy, muayyan va hamisha doimiy tartibda joylashadi. Har xil DNKlar faqat nukleotidlarning joylanish tartibi bilan farqlanadi.

Sungi yillarda tekshirishlarni ko'rsatishicha DNK ning bir zanjiridagi nukleotidlarning joylanishi 2-zanjirdagi nukleotidlar tarkibiga kat'iy bog'lik. Bir zanjirdagi nukleotidni rufarasiga 2- zanjirni nukleotidi joylashadi va DNK molekulasida shotisimon ko'rinishni hosil qiladi. Tekshirishlarni ko'rsatishicha pogonalar azotli asoslarni xoxlagancha kombinatsiyada birikishidan hosil bo'lmas ekan. Molekulalarning konstruksiyasi mustaxkam bo'lishi uchun pogonalari bir xil uzunlikka ega bo'lishi kerak. Lekin adenin bilan guanin o'zlarining kattaligi jihatidan timin bilan sitoziandan ancha yirik. adenin va guanin 12 A bo'lsa, timin va sitozi 8 A. Har 2 la zanjir orasidagi masofa esa 20 A ga teng. Bu har bir pogonani azotli asosini kattaroq, 2-sini esa kichikroq bo'lishini ko'rsatadi. Bu holda quyidagi kombinatsiyalar bo'lishi mumkin:

ADENIN-TIMIN	GUANIN-TIMIN
ADENIN-SITIZIN	GUANIN- SITIZIN

Ammo, azotli asosni ximiyaviy tuzilishi bir-birlari bilan xoxlagan kombinatsiyalarda birikishiga imkon bermaydi: Adenin sitozi bilan, guanin esa timin bilan birika olmaydi. Shuning uchun DNKning molekulyar shotisi quyidagicha pogonalargagina ega bo'ladi:

ADENIN-TIMIN	TIMIN-ADENIN
GUANIN-SITIZIN	SITIZIN-GUANIN

DNKning qo'shaloq zanjiri molekulasida azotli asoslar xuddi shu kombinatsiyadagina uchraydi. Agar qandaydir usul bilan DNK molekulasidan biror azotli asosni olib tashlasak, uni o'rnini faqat xuddi shunday asos olishi mumkin, boshqalarini kattaligi jihatidan ham, ximiyaviy bog hosil qilish jihatidan ham to'g'ri kelmaydi.

Maktabda bu temani o'tishda xuddi shu o'rinda o'quvchilarga unchalik murakkab bo'lmagan masala, ya'ni DNKni bir zanjiridagi nukleotidlarni tartibi aniq bo'lgan holda, 2- zanjirdagi nukleotidlarni tartibini aniqlashni topshirishimiz mumkin. DNKni bir zanjiri doskaga chiziladi, o'quvchilar esa 2-zanjirini to'ldirishadi. Bu bilan o'quvchilarda DNK avtoreproduksiyasi kao'ida dastlabki tushincha hosil bo'ladi.

Molekulyar pogonani hosil bo'lishi uchun adenin timinning zaruriy to'ldiruvchisi hisoblanadi, guanin va sitozi bir-birini to'ldiruvchilari bo'ladi. Shularni hisobga olganda DNK molekulasini har 2la zanjirini nukleotidlari bir-biriga to'ldiruvchilardir.

Agar DNK molekulasining zanjiridan birisi tegishli nukleotidlarga va fermentlarga ega bo'lgan ximiyaviy muxitda ushlab mumkin desak u holda zanjir avtomatik ravishda 2-sini to'zib olar edi. Bunda hosil bo'lgan 2- zanjir avvalgisini to'ldiruvchisi bular edi.

Shunday qilib qulay sharoidda kerakli nukleotidlar yetarli bo'lganda maxsus fermentlar ishtirokida ajralgan DNK zanjirlaridan DNK molekulasini hosil bo'ladi. Bu DNK reduplikatsiyasi yoki avtoreproduksiyasi deyiladi. Hujayralar bo'linishidan avval xuddi shu yo'l bilan DNK miqdori 2 xisga ortadi va kiz hujayralaridagi DNKni miqdori ona hujayralardagi bilan tenglashadi.

DNK reduplikatsiyasi oqsil-fermentlarning faoliyati natijasida amalga oshadi. Ferment DNK polimeraza 2 zanjirli DNK molekulasini buylab guyo "urmalab" boradi va orqasida 2ta yangi DNK hosil bulaveradi.

Rnk-ribonuklein kislotasi-strukturasida qo'shaloq spiral bo'lmaydi. Ular DNKni zanjirlaridan biri kabi tuzilgan. RNK ham DNK kabi polimer. Ularni monomerlari ham nukleotidlardir. Ular ham 4 xil bo'lib, ulardan 3 tasini azotli asosi DNKdagi bilan bir xil - A, G, S. DNKdagi timinni urniga RNKda unga yaqin bo'lgan uratsil bo'ladi. T bilan uni farqi timindagi metal gruppani ortikligidandir. Shuning uchun timinni metiluratsil deb yuritiladi. Yana DNK bilan RNKni farqi karbon suvli qismini harakterida ham DNKda dezoksiriboza bo'lsa RNKda riboza bo'ladi. Shuning uchun DNK va RNK deb nomlangan. Nukleotidlar DNKdagidek bir-biri bilan uglevod va fosfor kislotasi orqali birikadi.

DNKdan farq qilib, RNKning miqdori doimiy emas. Oqsil sintezi bo'layotgan hujayralarda uning miqdori ortadi.

RNK ni bir necha xillari bor. Ulardan biri transport RNK (T-RNK). Bu RNK ning molekulasini ancha qisqa, hammasi bo'lib, 80-100 nukleotiddan tashkil topgan. Molekulyar og'irligi esa 25-30 ming ga teng. T-RNK faqat sitoplazmada bo'ladi. Ularning vazifasi aminokislotalarini oqsil sintezlanayotgan ribosomaga tashishdan iborat. Umumiy RNKning 9-10%ni tashkil etadi.

RNKning 2- xili informatsion RNK- I-RNK molekulasini 300-3000 nukleotiddan iborat bo'lib molekulasining og'irligi 20000-1mln

I-RNK molekulasini ham yadro va sitoplazmada bo'ladi. uning vazifasi DNKdan ribosomada sintezlanayotgan oqsil strukturasi ga informatsiyani olib o'tishdan iborat. Uning miqdori umumiy RNKni 1 % ini tashkil qiladi.

RNK ning 3 xili ribosomal RNK (r-RNK) dir. Bu eng uzun RNK bo'lib, uning tarkibiga 3-5 ming nukleotid kiradi, molekulyar og'irligi 1-1,5 mln. R-RNK ribosomaning ko'pgina qismini tashkil qiladi. Umumiy RNK ning 90% ini tashkil qiladi.

Nazorat savollari:

- 1.Yadroning tuzilishi qanday?
2. Nuklein kislotalar qanday tuzilgan?
3. Yadro qobig'i qanday tuzilgan?
- 4.Yadrochani ahamiyati.

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

3. Hujayra yadrosi
4. Yadrosi olib tashlangan hujayralardagi holatlar?

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-14: HUJAYRA REPRODUKSIYASI MAVZU: MITOZ. MITOZ FAZALARI.

REJA:

1. Mitoz, mitotik aktivlikni boshqarilishi.
2. Amitoz

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Mitoz, profaza, metafaza, anafaza, telofaza, interfaza, amitoz, hujayra, sikl endomitoz, avtisentetik, meyoza, paxinema, leptonema, diakinez

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Somatik hujayralarning ko'payishdagi hodisalarni biladi. Mitozni amitoz bilan farqlaydi.

1-savol bayoni: Hujayralarning bo'linishi umumiy reproduksiya (qayta ishlab chiqarishning bir qismidir. Hujayra elementar biologik sistema sifatida bo'linish yo'li bilan o'zining uzuliksiz hayotini davom ettiradi.

Ko'p hujayrali organizmlar bitta hujayradan zigotadan bo'linish yo'li bilan rivojlanadilar. Bu organizmning o'sishi hujayralarning sonini ortishi bilan bo'ladi. Bir hujayrali organizmlar bo'linishida 2 ta organizm hosil bo'ladi, ya'ni bo'linish bu turning individini sonini ortishi uchun xizmat qiladi.

Katta organizmlarda o'sish tuxtagan bo'lsa, hujayralarning bo'linishi davom etadi. Bu bilan fiziologik reproduksiya amalga oshiriladi.

Ammo, hamma hujayralar ham bo'linavermaydi. Masalan, sut emizuvchilarning nerv hujayralari rivojlanishning ma'lum etaplarida bo'linishdan tuxtaydi.

Mitoz- O'simlik, hayvon va sodda hayvonlar uchun umumiy bo'linish usuli mitozdir. Bu protsessning biologik ma'nosi shuki, bunda ikkita kiz hujayralar hosil bo'lib, ular bir xil sondagi xromosamalar va ularda bo'lgan DNK ga ega.

Mitozga tayyorgarlik. Ko'payayotgan hujayralar hayotida bo'linish oralig'idagi davr- interfaza va aynan mitoz farqlanadi.

Interfazada hujayra o'sadi, ishlaydi va mitozga tayyorlanadi. Hujayralarning bo'linishga tayyorlanishida qator jarayonlar amalga oshadi.

1. Sitoplazmaning hamma makromolekulali komponentlarining ikkilanishini ta'minlovchi hujayraning o'sishi
2. Xromosomalarning reduplikatsiyasi
3. Mitotik markazlarning ikkilanishi
4. Mitotik apparatning oqsillarini sintezi
5. Energiya zaxirasini tuplanishi

Hujayraning o'sishida bir vaqtning o'zida yadro va sitoplazmaning massasi oradi. Bunda yadroning sitoplazmaga nisbati hamma tip hujayralar uchun nisbatan o'zgarmas bo'lib qoladi.

Otalangan tuxumninng maydalanishida o'sish fazasi bo'lmaydi. Bo'linish juda tez bo'ladi va borgan sari mayda hujayralar hosil bo'ladi. Somatik hujayralar esa bo'linishdan so'ng, avvalgi kattaligiga o'sib yetadi, keyin mitozga kirishadi. Mitoz vaqtida sintetik protsesslar vaqtincha tuxtab turadi. Bunda I-RNK ni hosil bo'lishi va sitoplazmaga o'tishi tuxtaydi.

Mitoz hujayrani hamma qismini o'z ichiga olsa ham ko'proq yadroni tabiati (xromosomalarni hosil bo'lishi) va mitotik apparatni hosil kilayotgan hujayra markazining (sentrion) fuksiyasi qiziqtiradi.

Hujayralarning mitotik bo'linishi quyidagi 4 ta bosqichga ajratiladi: profaza, metofaza, anafaza va telofaza.

PROFAZA Bo'linishni boshlanishi, hujayrani qanday shaklli bo'lishidan kat'iy nazar uning qutblanishi bilan harakterlanadi. Kutblanish sentriolalarni qarama-qarshi tomonga tarqalishi va ular orasida vereteno (duk)ni hosil bo'lishi bilan amalga oshadi. Qutblarni mavjudligi bo'linayotgan hujayra ekvatori tekisligini (yuzasini) belgilaydi. Sentriolalarni va vereteno iplarini mitotik apparat deb ataladi. Sentriolalarni tarqalishi ertaki profazada boshlanadi, mitotik apparatni to'liq shakllanishi esa profazani oxirida tugaydi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda sentriola ham hujayrani avtoreproduksilovchi sistemasiga karar ekan. Hujayra bo'linishi boshlanguncha sentriolalar ikkilangan, ya'ni soni ikki marta ortgan bular ekan.

Ajratib olingan mitotik apparatni analiz qilishni ko'rsatishicha, uni 90 protsenti oqsillardan, qisman RNK, polisaharid va lipidlardan iborat ekan. Mitotik apparatning oqsillarini mitoz boshlanguncha ham sitoplazmada bo'ladi. Mitotik apparatning iplari sitoplazmani boshqa qismga nisbatan zichlanganroqdir.

Shunday qilib, profaza davrida sitoplazmada ikkilangan sentriolalar qutblarga tarqalar ekan, mitotik apparatni avval sintezlangan oqsillari esa veretenoni hosil kilar ekan.

Bu fazada yadro biroz bo'rtadi, xromosomalarning spirallanishi natijasida xromatin iplari yugonroq bo'lib qoladi. Keyinroq spirallanishni davom etish natijasida xromosomalar yugonlashadi va alchida iplar shaklida ko'rinadi. Bu vaqtda xromosomalarni qo'shaloq ekanligi bilinadi. Shu bilan birga yadrocha erib ketadi. Ko'p hollarda yadrochani RNK si yukolib ketmay xromosoma bilan bog'lik bo'ladi. Profazaning oxirgi bosqichi yadro qobig'ini yemirilishi bo'ladi. Ultrabinafsha nurlarni ta'siri ostida profazaning boshlanishini orqaga qaytarish, ya'ni interfazaga qaytarish mumkin ekan. Ammo profazaning o'rtasidan qaytarish mumkin emas-baribir hujayra bo'linadi.

METAFAZA Yadro qobig'i erib ketgandan keyin xromosomalar sitoplazmada tartibsiz holda joylashadi. Metofazada xromosomalar kaltalashadi va ekvatorga kuchib ekvaor plastinkaisni hosil qiladi. Xromosomalarning bu harakati metakinez deb ataladi.

Kalta tortgan xromosomalarda markaziy tortma G'peretyajkaG' sentromera yoki kinetoxor aniq ko'rinadi. Ko'p kuzatishlarni ko'rsatishicha metakinezda asosiy rol ni kinetoxor o'ynaydi. Bu vaqtda mitotik apparat tuligicha tashkil topgan bo'ladi. Ularning iplari orasida kinetoxorlarga birikkan, bir qutbdan ikkinchi qutbga tortilgan iplarni ko'rish mumkin. Elektron mikroskopni ko'rsatishicha vereteno iplari diametri 150-200 A keladigankanallar tutamidan iborat ekan. Ular hamma vaqt kinetoxor bilan bog'lik bo'ladi. Xromosomalar 2 qutbni o'rtasida joylashadi. Kinetoxorlari buzilganda xromosomalar harakat qila olmaydilar.

Metofazada xromosomalarning joylanishi veretenoni faoliyatidan kelib chiqadi. Xromosomalar birlamchi tortma rayonida kayrilgan bo'ladi, kinetoxorlar aniq ekvator tekisligiga joylashadi.

Agarda metofazada kolxitsin ta'sir ettirilsa, vereteno yemiriladi, xromosomalar qutblarga tarqala olmaydi. hujayra bo'lina olmay, tetraploid bo'lib qoladi.

Metofazada xromosomalar yaxshi ko'ringan uchun ularni sanash oson bo'ladi .


ANAFAZA. Bu fazada xromosomalar ekvator tekisligidan qutblarga tomon harakat qiladi. Ularni harakati passiv bo'lib 1 minutda 1mk masofani o'tadi. Xromosomalarning harakati vereteno iplarining qisqarishi bilan bog'lik bo'libgina kolmay, bu vaqtda hujayrani o'zi ham cho'zilgan bo'ladi, bu qutblar orasidagi masofani orttiradi va u bilan xromosomalarni tarqalishiga imkon beradi.

Shunday qilib, bu fazada kinetoxorlar bilan birikkan kiz xromosomalar ajralishadi va qutblarga harakat qiladi. Shuning uchun avval ikkilangan xromosomalar 2 ga teng taqsimlanadi.

TELOFAZA. Bu fazada tarqalgan xromosomalar qutblarda g'uj bo'lib tuplanadi va xromosomalar atrofida alchida pufakchalar hosil bo'ladi, ular bir biri bilan qo'shilib, yadroni ichki membranasini hosil qiladi. Tashki yadro membranasini endoplazmatik turni sisternlaridagi pufakchalardan tiklanadi. Yadroning tiklanishi xromosomalarni despiriallanishi va yadrochani hosil bo'lishi bilan tugaydi.

Sitokinez-Anafazani oxiri yoki telofazani boshida sitoplazmaning ajralishi-sitokinez yuz beradi. Xayvon hujayralarida ekvator egatcha hosil bo'lib, u chukurlashadi. Bu sitoplazmaning tashqi qobig'ini qisqarishidan hosil bo'ladi. O'simlik hujayralarida ekvator tekisligida, elektron mikroskopni ko'rsatishicha pufakchalar bo'ladi. Ular bir-birlari bilan qo'shilib har ikkali hujayrani membranasini hosil

qiladi. So'ng bu membranada sellulozali qobiq hosil bo'ladi. Har ikkala hosil bo'lgan hujayrani birikkan joyida kichkinagina tanacha – fragmoplast shakllanadi. U vereteno iplarining qoldigidir.



14-1 rasm. Mitoz fazalarining ifodalanish cxemasi

Mitotik sikl-Mitozni moxiyati kiz hujayralarga DNK ni to'g'ri taqsimlanishidar. Shuning uchun asosiy e'tibor DNK va xromosoma ikkilanishini vaqti va mexanizmiga karatiladi. Govard va Pelklar (1953) nishonli atomlar yordamida birinchi bo'lib, DNK sintezini interfazani o'rtasida bo'lishini va olti soat davom etishini aniqladilar. Nishonni timinni DNK reduplikatsiyasini o'rganishga qo'llash mitotik yoki hujayraning bo'linishi sikllarini aniq o'rganishga imkon beradi. Somatik hujayralarda DNK ikkilanishi bo'linish boshlanguncha tugaydi va hujayra mitozga xromosomalar reduplikatsiyasi tugagandan biroz vaqt o'tgandan keyin kirishadi.

Interfazani uch davrga bo'lish mumkin:

- 1.- bo'linish tugagandan keyingi – postmitotik davr G1;
- 2.- DNK sintezi davri – S va
- 3.– Premitotik yoki postsintetik davr G2. Bu davrdan keyin hujayra mitozga kiradi.

Butun siklni aylana shaklida ifodalab bunda mitozdan mitozgacha bo'lgan davrlarni yoylarda vaqtga proporsional qilib ko'rsatish mumkin.

Avtosintetik va geterosintetik interfazalar-Katta organizmning to'kimalarining hujayralarini har qanday populyatsiyalarida deyarli doimo ko'payayotgan hujayralari bilan birga bo'linishdan tuxtab differensiallangan holatga o'tgan hujayralar ham uchraydi. Interfazaning bu ikki holatini avtosintetik va geterosintetik interfazalar deb nomlanadi. Odatda bo'linayotgan hujayralar qancha ko'p bo'lsa, geterosintetik hujayralar miqdori shuncha kam bo'ladi. Barcha ko'payayotgan hujayralar miqdori – proliferativ pul – avtoradiografik metodi orqali aniqlanadi.

Hujayralar sikldan mitotik bo'linishdan keyin yoki mitoz boshlanishdan avval chiqadilar. Ko'pchilik to'kimalarni geterosintetik interfaza holdagi hujayralari hujayra sikliga qaytishi mumkin.

Mitozning xillari-Hujayraning bo'linishi olib keladigan natija va hosil bo'lgan hujayralarning keyingi takdiriga qarab mitozni 3 xili farq qilinadi: 1) to'g'ri (stvolovoy), 2) asimmetrik va 3) o'zgartuvchi. Tugri mitozdan so'ng ikkita bir xil hujayralar hosil bo'ladi va ular keyinchalik bo'linib deyarli bir xil hujayralarni hosil qiladi.

Asimmetrik mitozda har xil kattalikka ega bo'lgan ikkita hujayra hosil bo'ladi. Ularni biri normal bo'linish qobiliyatiga ega, ikkinchisi esa yoki faqat bo'linaolmaydi, yoki bir necha avloddan so'ng bo'linishdan tuxtovchi hujayralar hosil qiladi. Asimmetrik mitozni har xil kattalikdagi hujayralar hosil qiladigan tuxumning spiral maydalanishida kuzatish osonroq. Bunda yirik makromerlar va mayda mikromerlar bo'ladi. Bunday mitozni dastlab differensiyallanuvchi mitoz deb nomlangan.

O'zgartuvchi mitozda hosil bulayotgan ikkala hujayra keyinchalik qaytmas o'zgarishga uchraydi. Masalan, teri epiteliysida bazal membranadan siljiyotgan hujayralar sitoplazmada shox moddasini yigadi va bo'linish qobiliyatini yukotadi. Bunday mitozlarni kelib chiqish mexanizmi noaniq.

Mitotik aktivlikni boshqarilishi-Hujayralarni mitotik va interfaza bo'linish holatlarini o'rganish doimo yangilanib turadigan to'kimalarni hujayralarida umumiy qonuniyat borligini aniqlashga olib keldi. Bu qonuniyatga asosan ko'payish yo'li bilan hosil bulayotgan hujayralar soni ulayotgan hujayralar soniga teng bo'ladi. Aftidan, to'kimani tashkil qilgan hujayralar populyatsiyasi uz-o'zini boshqaruvchi sistema bo'lsa kerak.

Mitoz soxasida yirik mutaxassis bo'lgan D. Meziya har bir normal hujayra bo'linish qobiliyatiga ega, ammo ko'p hollarda tormozlangan yoki tusilgan (blokirovana) bo'ladi deb hisoblang. Uning tasavvuricha, hujayralarning mitotik aktivligini boshqarilishi tormozlash yoki tormozni olish prinsipi buyicha amalga oshiriladi. Albatta, tormozlash har xil darajada xattoki qaytmas darajagacha bo'lishi mumkin. Bu tasavvur organizmda hujayralarning aktivligini boshqarilishi bilan mos keladi. Mitotik aktivlik yoki vaqt birligi ichida bo'linayotgan hujayralarning nisbiy mikdori turli darajada bo'ladi. Turli organlar hujayralarida mitozning so'tkali ritmlari aniqlangan. Eng ko'p mikdor mitoz tinchlik davriga, organizmning yoki organning kuchli funksiyasiga past mitotik aktivlik to'g'ri keladi. Ko'p hollarda bu hujayraning mitotik aktivligi gormonlarni ta'siri natijasida yuzaga keladi. Masalan, qo'zg'olish davrida mitozning kam bo'lishiga sabab bu hollarda ko'p miqdorda ishlab chiqariluvchi adrenalini ta'siridir. Bo'linayotgan hujayralarning sonini o'zgarishi mitozni fazalarini o'zgarishi hisobiga emas, balki interfazaning turli davrlarini o'zgarishiga bog'lik. Masalan, mitozdan avvalgi G₂ va keyingi G₁ davrlar ayniksa, turli ta'sirlarga sezuvchan bo'ladi. Hujayralarning bu davrlarda ushlanib kolishi interfazani cho'zilishiga va bo'linayotgan hujayralarning umumiy sonini kamayishiga olib keladi.

Bularning hammasi mitotik aktivlikka qandaydir umumiy boshqaruvchi mexanizm ta'sir qiladi degan xulosaga olib keladi.

Endomitoz, politeniya va polisomatiya-Rivojlanish va differensiallanish vaqtida bo'linayotgan hujayralarda yuz beradigan protsesslar diqqatga sazovordir. Teytler (1953) suv urgimchagi *Gerris lateralis* da vereteno hosil bo'lmay va yadro qobig'i yukolmay xromosomalarni reduplikatsiyasi va ularning tarqalishini aniqladi. Bu protsessni u endomitoz deb atadi. Ko'pchilik hollarda endomitotik yadroda mitozdagi

fazalardagidek fazalarni ko'rish mumkin. Bu fazalarni endoprafaza , endometofaza, endoanafaza va endotelofaza deb nomlanadi. Normal holda 21 (2n) xromosomaga ega bo'lgan turni xromosomalarini soni, bu protsess tufayli xattoki 2048 gacha yetishi mumkin. To'g'ri kanotli xashoratlarni urug'donining epiteliysida yuqori ploidlikka ega bo'lgan endoploid yoki polisomatik yadrolar topildi.

Sut emizuvchilarda uchrovchi shish hosil qiluvchi hujayralarda reduplikatsiya tez-tez uchrab turadi. Xromosomani reduplikatsiyasi politeniya va polisomatiya yo'li bilan yuz beradi. Politeniya kiz xromatidalar tarqalib ketmasdan, ko'p ipli politen xromosoma hosil qiladi. Polisomatiya kiz xromatidalar tarqalib ketadi va xromosomalar normal sondagi iplardan tashkil topadi. Ba'zan bitta hujayrada politeniya va polisomatiya bo'lishi mumkin. Mitotik aktivlik yuqori bo'lgan to'kima hujayralarida xromosomalarni soni doimiy bo'ladi. Agar hujayralarni bo'linishi reduplikatsiyaga nisbatan sekin borsa politeniya va polisomatiya kelib chiqadi. Hujayralarni bo'linishi reduplikatsiyadan tezroq yuz borsa somatik reduksiya-somatik hujayralarda xromosomalarni sonini kamayishi yuz beradi. Bu ba'zi xashoratlarda va yuqori o'simlik hujayralarida tez-tez uchrab turadi.

Endoreproduksiya-Mitotik siklda S1 –davridan keyin G2 davri keladi, uni utab hujayra bo'lina boshlaydi. Shu G2 davrida oqsil moddalari ishlab chiqariladi, ular esa mitozni ishga soluvchi mexanizm bo'lib qoladi. Shuning uchun DNK sintezi mitozni boshlab beruvchi bevosita sabab bo'lmaydi. Aftidan, shuning uchun ko'pchilik hollarda xromosomalar ikkilangandan so'ng hujayralar bo'linmaydi. DNK reduplikatsiyasi natijasida yadro va hujayra kattayadi, poliploid bo'lib qoladi, ammo hujayralar soni ortmaydi. Bunday xodisa –bo'linishsiz xromosomalar reduplikatsiyasi evolyutsiya protsessida ishlab chiqilgan bo'lib hujayralar soni ko'paymagan holda organlarni o'sishini ta'minlaydi.

Xromosomalar va DNK reduplikatsiyasi hosil bo'ladigan, ammo mitoz boshlanmaydigan hamma hollarni **endoreproduksiya** deb nomlangan. U jigar hujayralarida, sut emizuvchilarni siydik chiqaruvchi yo'llar epiteliylarda doimiy protsess sifatida bo'lib turadi.

Endomitozni funksional ahamiyati shuki u hujayrani uzuliksiz faoliyatini ta'minlaydi. Masalan, kartoshkani mayda tugunaklarini hujayralari mitotik yo'l bilan ko'payadi, keyinchalik yosh tugunaklar yadrolarida endomitotik fazalarni ko'rish mumkin. Endomitozga o'tish intensiv kraxmal hosil bo'lishga to'g'ri keladi.

Endomitoz doimo poliploidiyaga va hujayralarni kattaligini ortishiga olib kelgani uchun, uni DNK va xromosomalar reduplikatsiyasi deb bilmoq kerak.

2-savol bo'yicha dars maqsadi: Amitoz hodisalarni biladi.

2-savol bayoni: **Amitoz**-bu yadroning tortilib ikki qismga to'g'ri bo'linishidir. Amitoz o'tgan asrni o'rtalarida bayon etilgan bo'lib, hujayralar ko'payishini yagona formasi deb qabul qilingan edi. Faqat 70 yillarda mikroskopni texnikasi yaxshi rivojlanishi tufayli bo'linish protsessi ancha murakkab ekanligi aniqlandi.

Dastlabki olimlar amitoz deb hujayrada ikkita yoki ko'proq sondagi yadroni bo'lishini tushunganlar. Hozirgi vaqtda amitoz deb yadroni interfaza holatida bo'linishiga aytiladi.

Amitozni aniqlashni va analizni qiyinligi shuki, hozircha DNK sintezi, xromosomalar reduplikatsiyasi va amitotik bo'linish o'rtasidagi aniq nisbat ma'lum emas.

Ba'zi olimlar umuman amitozni hujayralar reduplikatsiyaini ma'lum shakli ekanini inkor etadilar.

Amitoz bitta yadroni teng ikkiga bo'lishiga olib keladi. Amitozni boshqa formasida yadro fragmentatsilanib har kattalikdagi yadrolar hosil bo'ladi. Ba'zan yadro bo'linadi, ammo plazmatomiya bo'lmaydi. Bo'linishda yadro interfaza holida qoladi va hujayra ishlashdan tuxtamaydi. Shuning uchun, amitozni mitotik apparat hosil qilmay, xromosomalar spirallanmay yadroni bo'linishi deb qarash kerak.

Amitozda genetik materialni qiz hujayralarga to'g'ri taxsimlanishi hali aniq emas.

Shuning uchun, A.A Zavarzin shunday fikr berdi va u hozir ko'pchilik tomonidan tasdiqlanmoqda: hech qanday "generativ amitozlar" (ko'payishni amitozlari) yo'q. Amitozni hujayra yadrosini funktsional holatlaridan biri deb qarash lozim. Bundan kelib chiqadiki, Flemming tomonidan berilgan "amitoz" termini, hujayralarni ko'payish usuli ma'nosini yo'qotdi.

Nazorat savollari:

1. Mitozning mohiyati nimadan iborat?
2. Mitotik sikl nima?
3. Mitozning qanday xillari bor?
4. Amitoz nima?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

1. Mitozning biologik ahamiyati
2. Mitoz va amitoz jarayonlari ifodalangan maket tayyorlash

MA'RUZALAR KURSI

MODUL-13: HUJAYRA REPRODUKSIYASI. MAVZU-2: MEYOZ.

REJA:

1. Jinsiy hujayralarning rivojlanishi
2. Meyoz. Meyozning biologik ahamiyati

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Meyoz, profaza, metafaza, anafaza, telofaza, interfaza, hujayra, sikl endomitoz, paxinema, leptonema, diakinez

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Jinsiy hujayralarning ko'payishdagi hodisalarni tushunish.

1-savol bayoni: Jinsiy hujayralarning rivojlanishi. Xayvon va o'simliklarning ko'payishi jinsiy bo'lishi mumkin, ya'ni u mutaxassislashagan jinsiy hujayralar: tuxum va spermatozoidlar tomonidan amalga oshiriladi yoki vegetativ yo'l bilan, ya'ni somatik hujayralar gruppasi tomonidan amalga oshadi. Jinsiy ko'payish yoki sitogoniya ko'p hujayrali xayvon va o'simliklarga ham, ko'pchilik sodda hayvonlarga ham xos. Birlamchi jinsiy hujayralarning somatik hujayralardan ajralishi, ko'pchilik hayvonlarda, odatda embrional taraqqiyotning dastlabki bosqichlarida bo'ladi. Sung hujayralar jinsiy bezga yigiladi. Shunday qilib birlamchi jinsiy hujayralardan va somatik hujayralardan

iborat - jinsiy bezning ko'rtagi - boshlangichi hosil bo'ladi. Ba'zi tuban hayvonlarda (bulo'tlar, kovak ichlilar) somatik hujayralar jinsiy hujayralarga aylanishi qobiliyatiga ega; umurtqalilarda bu topilgan emas. Jinsiy hujayralar jinsiy bezlarda rivojlanadi. Spermatozoidlar urug'donlarda, tuxum hujayralar esa tuxumdonlarda rivojlanadi.

Spermatogenez

Spermatozoidlarning rivojlanish sikli spermatogenez (sperma-urug', genesis-rivojlanish, kelib chiqish) deb atiladi.

Spermatogenez birlamchi jinsiy hujayra spermatogoniya boshlanadi va to'rt davrga bo'linadi: 1- ko'payish, 2- o'sish, 3- yetilish, 4- shakllanish yoki spermiogenezlarga bo'linadi.

Spermatogoniylar xromatini yirik ancha intensiv bo'yalgan bo'lakchalar holida bir tekisda tarqalgan, nisbatan katta yadroli odatdagi hujayralardir. Ko'payish davrida spermatogoniylar mitotik yo'l bilan intensiv bo'linadi. Bu ularning miqdorini birmuncha ortishiga olib keladi. Spermatogoniylarning bo'linish soni turli hayvonlarda turlicha bo'ladi. Spermatogoniylarni qobiqlari yupqa va oson o'tkazuvchan bo'ladi va ular orqali kiruvchi oziq moddalar hujayralarning intensiv bo'linishi uchun energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Spermatogoniylarni ko'payishi urug'donni ko'payish zonasida bo'ladi.

Bir qancha ketma-ket mitotik bo'linishlardan so'ng o'sish davri keladi, bu davrda jinsiy hujayralar bo'linmaydi. Shamiladigan oziq moddalar sitoplazma tomonidan assimilyatsiya qilinadi va hujayralarning intensiv o'sishiga sabab bo'ladi. Jinsiy xujaylar-birinchi tartib spermatotsitlar bo'lib qoladi. o'sish davrida ularning yadrosida turli o'zgarishlar ruy beradi; Bu o'zgarishlar urukdonning o'sish zonasida yuz beradi.


Yetilish davri hujayraning 2 marta birin-ketin bo'linishi bilan harakterlanadi. 1 - bo'linishda hosil bo'lgan hujayralar 2 - tartib spermatotsitlar deb nomlanadi. Yetilishning 2 - bo'linishida hosil buluvchi hujayralarni spermatidalar deb ataladi. Spermatozoidni yetilish protsessi urug'donning yetilish zonasida yuz beradi.

Yetilishdan so'ng spermatozoid rivojlanishining so'ngi-4- shakllanish davri keladi. Bunda spermatida spermatozoidga aylanadi. Spermatidada bo'ladigan o'zgarishlar yana ham tushunarli bo'lishi uchun dastlab tipik spermatozoidning tuzilishi bilan tanishamiz. Har bir tur hayvonning ma'lum bir shakldagi spermatozoidlari bo'ladi. Sut emizuvchi hayvonlarning spermatozoidlari dumli bo'ladi. Dumsizlari yumolok chuval-changlarda, kiskichbakasimonlarda va boshqa ba'zi umurtkasiz hayvonlarda uchraydi.

Dumli spermatozoidlar tipik bo'lib, boshcha, buyincha va dumchadan iborat. Dumcha harakat organella bo'lib hisoblanadi. Boshcha sharsimon yoki cho'ziqroq shaklli bo'lib oldida zichlanganroq qism-akrosoma joylashadi. Akrosoma biroz o'tkirlashgan bo'lib, boshchani juda oz qismini egallaydi. Kolgan bushlikda yadro joylashadi. Spermatozoidning yadrosi gomogen bo'ladi. Elektron mikroskopni ko'rsatishicha, yadro juda ko'p zich uralgan fibrillarga ega. Boshcha bilan dumcha o'rtasida buyincha joylashadi. Buyinchani yuqori qismida sentriola joylashib, u uzunasiga ketgan tolalar fibrillar bilan uralgan. Bu yerda bir qancha tipik mitoxondriylar topilgan. Dumchani asosiy qismi 9 ta juft - chetki va ikkita tok - markaziy fibrillardan tuzilgan. (kiyrik va xivchinning tuzilishi kabi)

Yetilishning ikkinchi bo'linishi natijasida hosil bulgan spermatida tipik yumalok hujayradir: yadrosining strukturalari yaxshi ifodalangan, sitoplazmada esa shakllangan spermatazoidlarda kuchli o'zgargan holda buluvchi barcha organoidlar bo'ladi. Spermatida xiyla kichik hujayradir, chunki u o'sishini yetilish davri boshlanguncha tuxtatgan birinchi tartib spermatotsitning ikki marta bo'linishi natijasida hosil bo'lgandir. Shunga karamasdan unda sitoplazmaning nisbiy mikdori, undan keyinchalik hosil bo'ladigan spermatozoiddagiga nisbatan ko'pdir.

Spermatozoidning shakllanishi - spermiogenez yadroni hujayrani keyinchalik oldingi uchi bo'lib qoladigan qismiga kuchishidan boshlanadi. Shuning bilan birga yadro shirasining tuplanishi hisobiga quyiklashadi va spermatozoid boshchasi shaklini ola boshlaydi. Ayni zamonda ikkala sentriollar ular urab turuvchi tigiz sferadan chiqib yadro ko'chib o'tgan tomonning qarshi tomoniga joylashadi. Shu bilan birga ular hujayraning uzun uki buylab shunday joylashadiki, ulardan bittasi, ikkinchisiga nisbatan yadrodan uzokroqda bo'lib qoladi. Birinchisidan hujayradan chiqib turuvchi dumchaning uk ipiga aylanuvchi xivchin o'sib chiqadi. Protoflazmaning sentriollar bilan chegaralangan qismi buyinchani hosil qiladi. Sentriollar bilan yonma-yon turgan Golji apparati hujayraning oldingi qismiga kuchib o'tadi va akrosoma hosil bo'lishida ishtirok etadi. Spermatidalar organoidlarning qaytadan tuzilishi bilan parallel holda sitoplazma yadrodan borgan sari ko'proq ajraladi va uk ip buylab sirganib tushadi. Sitoplazmaning ozroq qismi dumchaning uchida uncha katta bo'lmagan xoshiya shaklida qoladi, ko'proq qismi esa hujayradan tamoman chiqib ketadi, yadro kichrayib qoladi. Xromosoma va undagi DNK ning mikdori o'zgarmaydi. Barcha bu qayta tuzilishlar natijasida spermatida kichkinagina harakatchan hujayra spermatozoidga aylanadi. U gaploid sondagi xromosomaga ega bo'ladi.



13.1-2-rasm. Jinsiy hujayralarning tuzilishi

OVOGENEZ

Tuxum hujayrasining rivojlanish sikli ovogenez (ovum-tuxum, genesis-rivojlanish, kelib chiqish) deb ataladi. ovogenez birlamchi jinsiy hujayra ovogoniydan boshlanadi va uch davrga bo'linadi. 1) ko'payish, 2) o'sish va 3) yetilish

Ko'payish davrida ovogoniylar mitotik bo'linadi, bu esa hujayralarning sonini anchagina ortishiga olib keladi. Bu davr hujayralarining xususiyatlari spermatogonezdagi kabi bo'ladi.

Bir qancha mitotik bo'linishlar o'tishi bilan hujayralar o'sish davriga o'tadi, bu vaqtda ovogoniy birinchi tartib ovotsitga aylanadi. Bu hujayra ham ovogoniy kabi ozik moddalarni oson o'tkazadi. Elektron mikroskop tadqiqotlari orqali ovotsitlarning (amfibiya va sut emizuvchilarda) qobig'ida bu hujayralarning shimuvchi yuzasini anchagina kengaytiruvchi mikrovorsinkalar topilgan. Ovogenez vaqtida ovotsitning sitoplazmasida va yadrolarida RNK ning miqdori ortadi. Bu unda shu kislota bilan bog'lik bo'lgan oqsil sintezining aktivligini ko'rsatadi.

Ushish kichik va katta davrlarga bo'linadi. Ulardan birinchisida ovotsit sitoplazmasining ortishi hisobiga o'sadi, yadrosining xajmi biroz o'zgaradi. Katta o'sish davri hujayraga kirayotgan ozik moddalar donachalar yoki plastinkalar ko'rinishida ajraladigan maxsus oqsil sariklarning hosil bo'lishi hisobiga yuz beradi. Bir xil hayvonlarda sariklik ko'p hosil bo'ladi va shunga ko'ra tuxum anchagina kattalashib ketadi, boshqalarida u kam ajraladi va tuxumning kattaligi uncha o'zgarmaydi. Sariklik tuplanishi tufayli urg'ochilik jinsiy hujayralarning o'sish davri erkaklik jinsiy hujayralaridagiga nisbatan anchagina uzunroqdir.

Birinchi tartib ovotsit yadrosida yuz beradigan murakkab o'zgarishlar birinchi tartib spermatotsit yadrosida kuzatiladigan o'zgarishlarga o'xshaydi.


Yetilish davrida ikkita: reduksion va ekvatsion bo'linish yuz beradi. Biroq urg'ochilarda bu o'zgarishlar natijasida bitta birinchi tartib ovotsitdan, erkaklardagidek to'rtta jinsiy hujayra emas, balki bitta hosil bo'ladi. Bu hujayra sitoplazmasining bir tekisda taqsimlanmasligi natijasida sodir bo'ladi. Birinchi bo'linishda, kiz hujayralardan bittasiga sitoplazmaning juda ozgina qismi, boshqasiga esa, deyarli xammasi kuchadi. Hosil bo'lgan kichkina hujayra birinchi yo'llovchi (qutb) tanacha deb ataladi. U keyinchalik rivojlanmaydigan ikkita yo'llovchi tanachaga bo'linadi. Yetilishning birinchi bo'linishida hosil bo'lgan ikkinchi hujayra juda katta bo'ladi va ikkinchi tartib ovotsit deb ataladi. Yetilishning ikkinchi bo'linishida bu hujayraning yana kichkina hujayra -ikkinchi yo'llovchi tanacha va juda katta yetilgan tuxum hujayra hosil bo'ladi. Shunday qilib, ovogenez protsessida uchta kichkina hujayrachalar va bitta yirik yetilgan tuxum hosil bo'ladi, shakllanish davri bo'lmaydi. Tuxum hujayra ham gaploid xromosomaga ega. Spermatozid va tuxum hujayralarida gaploid sondagi xromosomalarning hosil bo'lishi yetilishning birinchi bo'linishida reduksion bo'linadigan, ya'ni meyoza (meiosis-kamayish reduksiyasi) deb ataluvchi protsessga bog'liq.

2-savol bo'yicha dars maqsadi: Meyoza jarayoni hodisalarni tushunish.


2-savol bayoni: Meyoza -Spermatotsit va ovotsitlarni yetilish protsessida bo'ladigan ikkita bo'linish mitozdan qator belgilari bilan farq qiladi. Bu o'zgarish ko'proq yetilishning birinchi bo'linishi protsessida bo'ladi. Profazani boshlanishiga mitozdagidek, DNK reduplikatsiyasi yuz beradi. Yetilishni birinchi bo'linishi profazasi oltita stadiyaga bo'linadi: proleptonema, zigonema, paxinema, diplonema va diakinez.

Proleptonema stadiyasi mitozning ertaki profazasiga to'g'ri keladi. Xromosomalar xaddan tashqari ingichka bo'lib kiyinlik bilan farqlanadi. Ular orasida faqat jinsiy xromosomalargina yaxshiroq ajralib turadi.

Leptonema xromosomalar uzun va ingichka ip shaklida bo'lib, unda juda ko'p burtmalar- xromomeralar joylashadi. Xromosomalari soni kam bo'lgan hujayralarda iplarni sanash mumkin va ular diploid sonda ($2n$) bo'ladi. Leptonema xromosomalari ko'pincha qutblangan bo'lib, sentromerasi bilan bir tomonga yunalgan bo'ladi. Xromosomalarni bunday o'ziga xos joylashishi "buket" deb nom olgan.



13.3- rasm. profazadagi leptonema bosqichi,



13-4 rasm. Profazadagi zigonema bosqich


Zigonema juft gomologik xromosomalarni konyugatsiyasidan- juftlashishdan boshlanadi. Ba'zan dastlab xromosomalarni qutbiy uchlari birikadi va karama-qarshi tomonlarga tarqaladi, boshqa hollarda esa, konyugatsiya xromosomani turli qismlarida bir vaqtda bo'ladi, (lokal konyugatsiya). Konyugatsiya juda anik va o'ziga xos amalga oshadi: gomologik xromosomalarni xar birining ma'lum qismlari ikkinchisining xuddi shu qismiga to'g'ri keladi, xattoki bir xromosomadagi xromomera ikkinchisidagiga to'g'ri keladi.

Paxinema stadiyasida xromosomalar konyugatsiyasi tugaydi. Ular qisqarib ancha yugon iplarni hosil qiladi. Maxsus metodlar orqali bu vaqtda har bir xromosomani juft strukturalar ekanini aniqlash mumkin. Shu stadiyaning taxminan o'rtasida, yadroda yarim sondagi xromosomalar bo'lgandek ko'rinadi, chunki har bir birlik tikasiga birikkan gomologik xromosomalardan tashkil topgan bivaleit yoki «holida» tetrada bo'ladi.


Gomologik xromosomalarning har biri uz sentromerasiga egaligi tufayli bivaleitda ikkita sentromera bo'ladi. Paximena stadiyasining o'rtasida har bir gomolog konyugatsiya tekisligiga perpendikulyar holda tikasiga yoriladi. Shunday qilib har bir bivaleit endi 4 tadan xromatidadan tashkil topadi. Har bir gomologik xromosomalarni xromatidalarini kiz xromatidalar deb ataladi.

Xromosomalarni tikkasiga yorilishi bilan bir vaqtda ajralishi va gomologik xromatidalar ularni almashtirishi yuz berishi mumkin. Xromatidalarni qismlari joylarini almashtirib xromatidaning qolgan qismi bilan quyilishib ketadi. Bu protsessni chatishish yoki krossingover deb ataladi. Diplonema stadiyasida tig'iz birikkan xromosomalar bir-birini itarishib tarqala boshlaydi. Ammo, bu bo'linish to'liq bo'lmaydi, chunki ular krossingover yuz bergan nuqtada, ya'ni xiazmada o'zaro

birikkan holda qoladi. Xiazma deyarli barcha o'simlik va hayvonlar hujayralarida topilgan. Har bir bivalentda kamida bitta xiazma hosil bo'ladi, ba'zilarida u ko'proq bo'lishi mumkin.




13.5- rasm. Profazadagi paxinema bosqichi



13.6- rasm. Profazadagi diplonema bosqichi

Diakinez stadiyasida xromosomalarning qisqarishi kuchayadi, shu bilan birga terminalizatsiya, ya'ni xiazmani sentromeradan xromosomaning uchlari tomon siljishi yuz beradi, bir vaqtning o'zida orliq xiazemalar soni kamayadi.



13.7- rasm. Profazadagi diakinez bosqichi

Xromatidalar metofaza boshlanguncha terminal xiazmalar orqali birikkan holda kolaldi.

Prometofaza 1 da xromosomalarning spirallanishi maksimumga yetadi. Keyinchalik yadro qobig'i yuk bo'lib ketadi va Metofaza 1 ni boshlanishiga xromosomalar ekvatorga joylashadi. Bu stadiyada gomologik xromosomalar sentromeralari bilan karama-qarshi qutblarga qaragan holda joylashadi. Sentromeralar bir-biridan borgan sari uzoklashadi va xromosomalar ajralib ketishga tayyor holga keladi.

Anafaza 1 stadiyasida har bir gomologik xromosomani kiz xromatidlari, sentromerlar orqali birikkan holda juft bo'lib tegishli qutblarga harakat qiladi.

Shuni takidlash kerakki, krossingoverda gomologik xromatidalar bir-birlarini qismlarini almashtiradi. Shuning uchun anafaza stadiyasida yuz berilgan ajralishdan so'ng ota va ona xromosomalarni tarkibi o'zgaradi. Ularni ikkita xromatidalar aralash tarkibga ega, ikkitasi esa dastlabki haraktni saqlaydi.

Telofaza 1 xromosomalar karama-qarshi qutblarga borib yetiganda boshlanadi. Xromosomalar ancha vaqtchacha o'zlarining morfologik belgilarini saqlagan holda qoladi. Telofazadan so'ng interfaza keladi va u odatdagi meyozdagidan farq qilmaydi.

Xayvonlarda menozning birinchi bo'linishi natijasida ikkita kiz hujayralar-erkaklarda ikkita ikkinchi tartib spermatotsit, urg'ochilarda- bitta birinchi tartib ovotsit va bitta yo'llovchi tanacha hosil bo'ladi.

Meyozning ikkinchi bo'linishi. Yetilishning birinchi bo'linishi interfazasidan so'ng qisqagina profaza II bo'lib, unda vereteno hosil bo'ladi va metofaza II boshlanishidan darak beradi.

Metofaza II da xromosomalar soni somatik hujayra-larnikidan ikki marta kam bo'ladi. Xromosomalar ekvator tekisligiga joylashadi, sentromeralar bo'linadi va anafaza II da ikkita kiz xromatidalar karama-qarshi qutblarga yunaladi. Meyoz ikkinchi bo'linishi davrida ona xromosomalarning tikkasiga yorilishidan hosil bo'lgan xromatidalarning ajralishi yuz beradi. Telofaza II da hosil bo'lgan to'rtta yadroni har biriga bittadan xromatida tushadi, endi u xromosoma deb ataladi. Xamma 4 ta yadroda gaploid sondagi xromosoma bo'ladi.

Meyozning biologik ahamiyati

Meyozning mohiyati tarkibida ota va onaning har biridan faqat bittadan gomologik xromosoma tutgan to'rtta har xil yadroni hosil bo'lishidan iborat. Ammo, krossingover tufayli xromosomalar butunlay ota yoki onaning dastlabki xromosoma materialidan tashkil bo'lmaydi, balki har ikalasini ayrim qismlaridan tashkil topadi.

Shunday qilib, meyozi irsiy birliklar (genlar) ning taqsimlanish mexanizmi bo'lib, ularni tasodifiy va mustaqil qayta gruppalanishini ta'minlaydi, bu esa krossingover protsessi orqali amalga oshadi. Meyoz protsessi bo'lmasa turlarni evolyutsiyasi va tirik tabiatni shunchalik turli-tumanligi sodir bo'lmagan bulur edi. Meyozni o'rganish irsiyatning xromosoma nazariyasini tushunish uchun zaruriy shartdir.

Olimlarning fikricha meyozni juda ham o'zgargan mitoz deb qarash zarur. Bunda xromosomalarni konyugatsiya va tikasiga ajralish vaqtlari nisbatan o'zgargan bo'ladi. Meyozda profaza erta boshlanadi, shuning uchun gomologik xromosomalar ikkilanmay turib konyugatsiyalanadi.

Nazorat savollari:

1. Spermatogenez nima?
2. Ovogenez nima?
3. Meyozning mohiyati qanday?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

1. Meyozning biologik ahamiyati
2. Mitoz va meyozi farqli va o'xshashlik tomonlari ifodalangan jadval tuzing

MA'RUZALAR KURSI
MODUL-14: XROMOSOMALAR. MAVZU: XROMOSOMALAR
MORFOLOGIYASI VA KIMYOVIIY TUZILISHI

REJA:

1. Xromosomal morfologiyasi va tuzilishi
2. Xromosomalarning kimyoviy tarkibi

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Xromatin, xromosoma, kariotip, xromosomal to'plami, jinsiy xromosomal va autosomal, poliploidiya, xromosomalarning ikkilanishi, xromosomalarning spirallanishi

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Xromosomalarning tuzilishi, hujayra hayotidagi ahamiyati va vazifalarini bilish

1-savol bayoni: O'tgan asrda "Xromatin" termini bilan yadrochalardan shakli jihatdan farq qiluvchi fiksatsiyalangan yadrodagı intensiv bo'yaluvchi strukturalarni nomlashgan. Xromatinli strukturalarni ko'pchiligi asosli bo'yoqlar bilan, ba'zilari esa kislotali bo'yoqlar bilan bo'yaladi.

Shundan asosli yoki kislotali bo'yoqlar bilan bo'yalishini ko'rsatuvchi "Bazixromatin" va "Oksixromatin" tushunchalari kelib chiqqan. Shunday qilib, "Xromatin" tushunchasi dastlab faqat morfologik tushuncha edi. Lekin Geydengayn (1907) Xromatinni xususiyati nuklein kislotasi bilan bog'liqligini bilgan edi. Bundan hujayrani bo'linishida xromosomalarning hosil bo'ladı.

Xromatin strukturalariga yadrocha atrofi xromatini va xromotsentrlar ham kiradi.


Adabiyotlarni ko'rsatishicha xromatin xromosomalarning kimyoviy tarkibi o'xshash ekan. Mitoz vaqtida xromatin butunlay xromosomalarda to'planadi. Juda ko'pchilik bioximik ishlarda "xromatin" va "xromosoma" terminlari sinonim sifatida ishlatiladi. Bunday xulosa mitotik va interfaza xromosomalarni bir xil emasligini hisobga olinsa, unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda "xromatin" termini fiksatsiyalangan yadrodagı xromosomaning kimyoviy ekvivalenti ma'nosini olmoqda.

Xromosomal - yadroning asosiy funksional avtoreproduksiyalovchi strukturasidir. Ularda DNK yig'iladi va yadroning funksiyasiga bog'lik bo'ladi.

Juda ko'pchilik hollarda xromosomalarning faqat bo'linayotgan hujayralarda ko'rinadi. Bo'linish davrida fiksatsiyalangan hujayralarda ham, tirik hujayralarda ham xromosomalarning soni, kattaligi, morfologiyasini va tabiatini aniqlash mumkin. Xromosomalarni nozik tuzilishlarini elektronmikroskoplarni ishlatish, avtoradiografik va bioximik metodlarni qo'llash orqali o'rganiladi.

Xromosomalarning soni- Ma'lum bir tur o'simlik va hayvon uchun xromosomalarning soni doimiydir. Ko'pchilik organizmlar ikkita gametalarning bir-biri bilan qo'shilishi-birlashishi natijasida rivojlanadilar. Erkaklik va urg'ochilik gametalarida xromosomalarning soni teng, gaploid sonda bo'ladi. Shuning uchun organizmlarning tana hujayralarining xromosomalari soni undan ikki marta ko'p diploid sonda bo'ladi (somatik sonda). Har bir gaploid to'plam xromosomalarning n bilan, diploidlisi esa- $2n$ bilan belgilanadi.

Xromosomalar soni diploid hujayralarda bir necha yuztagacha bo'ladi. (qirq quloq - *Chioglossum vulgatum* da 500 ta).



14.1 -rasm. Xromatin va xromosomaning strukturavuy tuzilishi

Xromosomalarning morfologik tuzilishida quyidagi qismlarni ko'rish mumkin

1. Sentromera- xromosomani ikki elkaga bo'ladi va ularni birikkan joyi hisoblanadi. Funksiyasi mitozdagi xromosomalarning xarakati bilan bog'liq. Sentromera xromosoma yelkalarining chegarasini belgilaydi va uni odatda birlamchi qisilma deyiladi.

Ko'pchilik hayvon va o'simlik xromosomalar bitta sentromerli (1ta qisilmali) bo'ladi. Ba'zilarida ikkita yoki bir nechta sentromera bo'lishi mumkin. Ba'zi xromosomalar esa, ko'rinadigan sentromeralarga ega emas(diffuziya holda). Bo'linish vaqtida sentromeralarga duk (vereteno) iplari birikadi.

2. Telomera- xromosomaning chekka qismi.

3. Yelkalar- uzunligi, sentrometalarning joylashishi va ikkilamchi tortmaning va yo'ldoshning bor yoki yo'qligiga qarab xromosomalarning bir nechta turlari mavjud.

1. Metosentrik (teng yelkali)-sentromera elkalarini teng qismga bo'ladi
2. Submetasentrik (bir oz teng bo'lmagan yelkali)
3. Akrosentrik (o'ta noteng)-xaddan tashqari noteng. Elkalarining sentromeraga yaqin joylashgan qismi proksimal, uzoq joylashgan distal deb nomlanadi.
4. Telosentrik (yo'ldoshli) xromosoma

4. Yo'ldoshlar (satellit)-yumoloq yoki oval tanacha bo'lib, nozik xromatin ipchasi bilan xromosomadan ajralgan bo'ladi. Yo'ldoshga ega bo'lgan xromosomalar yo'ldoshli deb nomlanadi.

5. Yadrocha zonasi-ayrim ikkilamchi tortmalar yadrocha qismi bilan bog'liq bo'ladi. Bu takomilashgan qism yadrocha hosil qiladigan yoki yadrocha zonasi deb ataladi. Xromosomalarning kattaligi metofazada nisbatan o'zgaras bo'ladi. Bir nabordagi xromosomalarning biri boshqalardan katta bo'lishi mumkin. Har xil organizmlarning hujayralarida xromosomalarning uzunligi 0,2-50 mk, yugonligi 0,2-2mk gacha bo'lishi

mumkin. Ko'pchilik hollarda xromosomalar ikkilamchi qisilmalarga ega. Ayrim ikkilamchi qisilmalar yadrochani hosil bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan mutaxassislashgan qismlardir. Shuning uchun, ularni **nukleopolyar zona** yoki **yadrocha tashkilotchisi** deb aytiladi.

Xromosomalar ultrastrukturasi-Xromosomalarning tuzilishini submikroskopik tekshirishlarni ko'rsatishicha ularning asosida kalinligi 40-100 A bo'lgan elementar iplar yotadi. Ular DNK dan, asosli oqsil giston va oz mikdor kislotali oqsildan iborat. Kesmalarni dezoksribonukleaza deb ataluvchi DNK ni parchalaydigan ferment bilan ishlaganda elementar iplarning markaziy qismi yukolib ketadi; binobarin, u elementar ipni uzunasiga o'tgan ikki zanjirli DNK molekulasidan tuzilgan.

Elementar iplar barcha tekshirilgan organizmlarining yadrolari xromosomalarining tarkibida, shuningdek interfaza yadrolarida ham tarqalgan.

Shuning uchun hamma hujayralarda, hujayraning hamma sikllarida xromosomaning tuzilish birligi- nukleoproteidning ipsimon molekulasini ekanini isbot etilgan deb qarash kerak.

Har bir elementar ip tarkibiga ikki molekula DNK kiradi va ipni uzunasiga joylashadi. Bir necha elementar iplardan iborat tutam xromosomani hosil qiladi, 2-4 xromonema iplari esa xromosomani hosil qiladi. Ba'zi olimlarni fikriga qaraganda xromosomada faqat bitta 2 ipli DNK molekulasini bo'ladi.

Xromosomalar nabori- Xromosomalarning kattaligi, birlamchi va ikkilamchi kisilma (peretejka) larni joylanishi, yo'ldoshni borligi va urarning shakllarini doimiylixi xromosomalarning morfologik induvidualligini belgilaydi. Shularga asoslanib, naborning har qanday xromosomasini bilish mumkin.

Diploid nabor shakli va kattaligi jihatidan bir xil xromosomalardan iborat bo'ladi. Bunday xromosomalar **gomologik** xromosomalar deb atalib lotin alifbosini bir xil harflari AA yoki boshqa bilan belgilanadi. Xromosomalar sonining doimiylixi va ularni morfologik induvidualligi, induvidga, turga ba'zan avlodga mansub bo'lgan xromosoma nabori to'plamini spetsifikligini ta'minlaydi.

Xromosoma kompleksi o'xshatish mumkin bo'lgan belgilar yig'indisi kariotip deb ataladi. Kariotipni sxematik belgisi idiogrammadir. Kariotiplarni turli bo'lishi induvid yoki turlarni irsiyat jihatidan turliligini ko'rsatadi.

Jinsiy xromosomalar -Juda ko'p ayrim jinsli yuqori hayvonlarning diploid naborida bitta yoki ikkita tok xromosomalar bo'ladi. Ular jinsiy xromosomalar deb, qolganlari esa autosomalar deb nom olgan. Eraklarda bitta, urg'ochilarda ikkita jinsiy xromosomalar bo'lgan hollar ochilgan. Sut emizuvchilarda, amfibiyalarda, va ko'pchilik xashoratlarda yirik xromosoma X harfi, kichigi esa - U bilan belgilanadi. Urgochilar ikkita bir xil X xromosomalarga ega.

Gametalarning hosil bo'lishida har bir xromosomalar juftidan faqat bittasi yetilgan jinsiy hujayraga o'tadi. Shuning uchun XX xromosomalni urg'ochi induvidlarda hamma gametalar bittadan X xromosomaga ega. XU xromosomalni erak induvidlarda esa ikki xil spermatazoidlar hosil bo'ladi. 50 % X va 50 % U xromosomalni X xromosoma U xromosomadan bir necha marta katta bo'lganligi uchun unda DNK ham shuncha marta ko'p bo'ladi.

Ba'zi hayvonlarda, aksincha, bir xil tarkibli xromosomalar erkaklarda hosil bo'ladi. Bu hollarda jinsiy xromosomalarni W,Z bilan belgilanadi. Bu kapalaklarda, kushlarda uchraydi.

Kariotipning o'zgarishi - Xujaraylarni normal xromosoma noborinin o'zgarishi xromosomalar va strukturalarini o'zgarishi bilan bog'lik. Xromosomalarning sonini o'zgarishiga poliploidiya va aneuploidiyalar kiradi. Poliploidiyada xromosomalar soni gaploiddagiga nisbatan karrali nisbatda o'zgaradi. Natijada, odatdagi diploid ($2n$) hujayra urnida triploid ($3n$), tetraploid ($4n$), oktoploid ($8n$) hujayralar hosil bo'ladi. Odamlarda diploid hujayra 46 xromosomalar, triploidlarda esa 69 xromosoma bo'ladi.

Poliploidiya simliklar dunyosida keng tarqalgan. Ko'pchilik turlar xromosomalar sonininig karrali ikkilanish natijasida hosil bo'ladi.

Poliploidiyani eksperimental yo'l bilan hosil qilish juda oson. Buning uchun hujayra bo'linmayotganda alkaloid - kolxitsin ta'sir ettiriladi. Bunda mitotik apparat buziladi, ikkilangan xromosomalar qutblarga tortila olmay o'rtada qoladi. Kolxitsinning ta'siri tuxtatilgandan so'ng xromosomalar umumiy yadroni hosil qiladi. Bunday xromosomalar soni 2 marta ko'p bo'ladi. Bunday yo'l bilan olingan poliploidiyalar seleksiyada keng ishlatiladi. Bizda triploid shakarqamish, tetraploid bug'doy keng tarqalgan.

Aneuploidiyada xromosomalarning sonini ortishi yoki kamayishi gaploidga nisbatan karrali nisbatda bo'lmaydi. Bunday organizmlar kam hayotiy bo'ladi. Aneuploid hujayralar ko'p hujayrali organizmlarda hujayraning bo'linishini normal bo'lmaganidan doimo hosil bo'lib turadi. Ular tezda o'ladi.

Xromosomalar reduplikatsiyasi

Xromosomalarning ikkilanishi asosida DNK avtosintezi yotadi. Bir vaqtni ichida oqsil sintezi ham bo'lgani uchun, uni xromosomalar reduplikatsiyasi deb aytish mumkin.

Xromosomalar reduplikatsiyasini analizi uchun radiaktiv indiqator nishonlangan vodorod atomi tritiy tutuvchi timidin keng kulllanilmoqda.

Timidin DNK molekulasida buluvchi maxsus azotli asos timinni utmishdoshidir. Nishonli atom tritiyga ega bo'lgan timidin timinga aylanib yangi sintezlangan DNK tarkibiga birikadi. Radioaktiv belgiga qarab yangi sintezlangan DNK va xromosomaning takdirini kuzatish mumkin. Bunday tekshirishlar avtoradiografiya metodi bilan o'tkaziladi. Radioaktivlik maxsus fotoplyonkalarga ko'chiriladi, preparatlarda esa bir vaqtni ichida belgini ham, xromosomani ham ko'rish mumkin.

Teylorning birinchi tajribalari (1957) bu xaqda aniq natijalar berdi. Reduplikatsiya o'tgan hamma xromosomalar belgili bo'lib qolgan. Har bir ikkilangan xromosoma ham eski, ham yangi sintezlangan DNK ni o'zida to'tadi. Avval nishonlangan xromosomalar radioaktiv timidinsiz muxitda bo'linganda, ham nishonli ham nishonsiz xromosomalar hosil bo'ladi. Bu tajribalarni ko'rsatishicha har bir xromosoma ikkita subbirlik-poluxromatidallarni o'zida to'tadi.

Ikkala ipni har biri o'zini yonida, keyinchalik xromosomaga aylanadigan yangi ipni hosil qiladi. Har bir xromosoma esa bitta eski poluxromatiddan va bitta yangi

sintezlangan nishonli DNK tutuvchi poluxromatidadan iborat. Shuning uchun birinchi mitozda (nishonli timidin kiritilganda) Ikkala xromosoma nishonli bo'ladi.

Keyingi bo'linishda har bir poluxromatida DNK ni yangidan sintezlaydi, ammo bu nishonsiz bo'ladi. Ikkita yangi xromosomadan faqat bittadan poluxromatida nishonli bo'ladi. Nishonning bunday tarqalishi polukonservativ tarqalish deyiladi.

S- davrda hujayrada DNK va xromosoma reduplikatsiyasi qat'iy tartibda o'tadi. Har bir xromosoma reduplikatsiyasi ma'lum vaqtdan boshlab ma'lum vaqtda tugaydi va bu vaqt har xil xromosomalar uchun turlicha bo'ladi. Xromosomalarning alchida uchastkalarida ham reduplikatsiya bir vaqtda boshlanib, bir vatda tugamaydi. Shunday qilib, reduplikatsiya har xil xromosomalarda ham, shuningdek xromosomani o'zinasi buylab ham asinxron turli vaqtda yuz beradi. Buning mexanizmi hali aniq emas. Aftidan, I-RNK sintezi ketayotgan xromosomalarning despirallangan uchastkalari har kachon S-davrni birinchi yarmida reduplikatsiyaga uchraydi, spirallangan G1 noaktiv G2 uchastkalar esa S-davrni ikkinchi yarmida reduplikatsiyaga uchraydi. Masalan, odam hujayrasida S- davrni oxirida har doim jinsiy xromatin hosil qiluvchi ikkinchi X-xromosoma reduplikatsiyalanadi.

Xromosomalarning spirallanishi

Xromosomalar ikki xilda: tashqi spirallanish (interfazada xromosoma, xromatid yoki poluxromatidlarning buralishi natijasida vujudga keladi) va ichki spirallanish (profaza va metofaza oralig'ida bo'ladi, ya'ni alchida yoki ikkita kiz xromatidlarning ichida) bo'ladi. Ichki spirallanish meyoza yaxshi kuzatiladi. Xromosomada katta va kichik spiral bo'lib, katta spiral ma'lum diametrga yetgach, kichik spiral paydo bula boshlaydi. Har ikkala spiral xromosomalari ikkilanishini vujudga keltiradi va uni ikkilangan spiral deyiladi.

Profazadan boshlab xromosomalar kuchli spirallana boshlaydi. Metofazada kichik spiralning spirallanishi tufayli spiralning diametri kattalashadi va yugonlashadi. Anafazada spiral strukturasi o'zgarmaydi, telefozada spiral bushashadi, despirallashadi va interfaza holiga o'tadi. Ikki yoki undan ko'proq xromosoma iplarining o'zaro buralishidan ikki tip spirallar hosil bo'ladi. Paranemik spirallanishda iplar biri ikkinchisiga kirib turgandek bo'lib, ular bir-birlaridan oson ajraladi.

Plektonemik spirallanishda iplar soch urilishi kabi bo'ladi va ularning bir-birlaridan ajralishi kiyin bo'ladi.

Xromosomalarda uzunasi buylab qora belbog'lar ya'ni diskalar joylashadi. Diskalar oralig'ida oqish zonalar bo'ladi. Diskalar doimo intensiv bo'yaladi.

Ayrim ikki qanotli xashoratlarda lichinkasining ma'lum rivojlanish davrida diskalar yugonlashib, o'lchami kattalashadi, ularni pufflar yoki Balbiyani halqasi deyiladi. Pufflar bitta diskadan yoki yonidagi disklardan ham hosil bo'lishi mumkin. Ularning ba'zilar lampa cho'tkasi tipidagi xromosomalarga o'xshash bir qator halkalarni hosil qilib yon o'simtalar berishi mumkin.

Lampa cho'tkasi tipidagi xromosomalar politen xromosomalardan ham uzun bo'lib, meyoza birinchi bo'linishida diplonema bosqichida kuzatiladi. Bunda xromosomaning markazi kamida to'rtta xromatiddan tashkil bo'ladi, ularga yon o'simtalar birikadi.

2-savol bo'yicha dars maqsadi: Xromosomalarning kimyoviy tuzilishi, tarkibini bilish

2-savol bayoni: Xromosomalarning kimyoviy tarkibi- xromosomalarning komponentlari DNK va asosiy oqsillar (protamin va gistonlar) dan iborat. DNK kompleksi va asosiy oqsillar_ dezoksiribonukleoproteidlar hujayra xromosomalarida 90 % massani tashkil qiladi. Xromosomadagi RNK va kislotali oqsillar miqdori to'qima tiplariga hujayraning funksional holatlariga qarab o'zgarib turadi va xromosomalarning ximiyaviy tarkibini maxsus bo'yoqlarda bo'yash, ul'trabinafsha nurlar spektrlarining yutilishi asosida avtoradiografiya hamda yadrolarni bioximiyaviy analizi usuli bilan ham aniqlanadi. Xromosomalar tarkibida DNK polimeraza fermenti, lipidlar, kal'siy, magniy ionlari va kam miqdorda temir moddasi bor.

Har bir turga oid somatik hujayralarda diploid to'plamida xromosomalarning soni, o'lchami va shakli kariotip deb nomlanadi. "Kariotip" terminini sovet olimlari L.N. Delone va G.A. Leviskiy fanga kiritishgan. Kariotipning grafik ko'rsatishi, cxema tarzida ifodalanishi idiogramma (kariogramma) deb nomlanadi. Ayrim vaqtlarda har xil turlarning diploid soni bir xil bo'ladi, masalan, pashshalarda 6 ta, yoki mushuklar oilasida 36 ta xromosoma bo'lib, kariotipda xatto xromosomalarning morfologiyasi o'xshaydi. Kariotiplarni o'rganadigan fan kariologiya deyiladi.

GETEROXROMATIN VA EUXROMATIN RAYONLAR

Xayot 1928 yilda interfaza davrida xromosomalar har xil bo'yalishini aytib o'tgan edi. Umuman, xozirgi vaqtda xromosomalarni kuchli bo'yaladigan qismini geteroxromatin (xromosyont'r)kuchsiz bo'yaladigan qismini euxromatin deb" ataladi. Xromosomalarning euxromatin rayonlari interfaza davrida despirallangan bo'lib, profaza davriga kelib qayta spirallanadi. Bu rayonlar genlarning asosiy kompleksini tashkil qiladi va ular xromosomalarning «aktiv» zonasi isoblanadi. Geteroxromatin rayonlar interfazada despirallanmasdan xromosentr shaklida saklanadi va sentromera, telomera uchastkalarida to'planadi. Geteroxromatin rayonidagi DNK euxromadida_nisbatan to'rg'undir. Bu rayonlar genlarni saqlamashda, balki ularning miqdor ko'rinishlariga ta'sir qilib, genetik nukdai nazaridan inert hisoblanadi, ayrim geteroxromatin qismlarining yo'qolishy hujayra funksiyasiga ta'sir qilmaydi. SHuning uchun har xil ximiyaviy moddalar va tashqi faktor shu uchastkaga tez ta'sir qiladi, chunki bu qismi past labill va sezgir hisoblanadi. Xaroratning pasayishi natijasida geteroxromatin rayonlarida DNK kamayadi va ularning spirallanishi sekinlashadi.

Xromosoma struktura sining uzluksizlik nazariyasi quyidagicha.

1. Hujayralar bo'linish vaqtida xromosmalarning morfologik doimiyligi saqlanadi

2 Har bir kariotip uchun xromosomalar soni va morfologiyasi doimiydir.

3. Metafazada xromosomalar ma'lum qonuniyatlar asosida joylashadi

4. Xromosomalar o'z o'zidan qayta ishlab chiqarish xususiyatiga ega. (Reproduksiya).

5. Xromosomalar qutblik qonuniyatiga asoslangan bo'lib, telomeralar (xromosentr) yadro pustlogi bilan chambarchas aloqada bo'ladi.

6. Xromosoma sentromeralari doimiydir .

7. Xromosomalar interfaza davrida o'zining morfologik individualligini saqlab qoladi.

8. Nur ta'sir ettirilgan hujayrada nishonlar hamma xromosomaga tarqalmasdan, balki faqat ayrim xromosomada to'planadi.

9. DNK molekulalarining uzunligi yoki uning molekulyar og'irligi mitoz va interfazada o'zgarmasdan qoladi

Nazorat savollari:

1. Xromosomaning nozik tuzulishi qanday?
2. Xromosomalarning qanday xillari bor?
3. Jinsiy xromosomalar qaysilar?
4. Xromosomalar qanday ikkilanadi?
5. Xromosomalar spirallanishining qanday xillari bor?

Mavzuga oid mustaqil ish topshiriqlari:

1. Bir nechta o'simlik va hayvonlarning xromosoma naborlari aks etgan jadval tayyorlang
2. Somatik va jinsiy xromosomalarning solishtiring

MA'RUZALAR KURSI

**MODUL-15: XROMOSOMALAR. MAVZU-2. XROMOSOMALARNING
MUTASIYALARGA UCHRASHI VA UNUI OQIBATLARI**

REJA:

1. Xromosoma mutasiyalari
2. Poliploidiya, aneuploidiya xodisalari

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Xromosoma, abbertasiya, delesiya, duplikasiya, inversiya, translokasiya, poliploidiya, aneuploidiya

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Xromosoma mutasiyalari tog'risida tushunch hosil qilish

1-savol bayoni: Xromosoma soni, shakli, hajmi va tuzilishi bilan bog'liq mutasiya xromosoma mutasiyasi yoki **abbertasiyasi** deb ataladi.

Bitta xromosoma ichida sodir bo'ladigan o'zgarishlar. Xromosoma tuzilishining o'zgarishi 4 xilga bo'linadi.

1. Delesiya- xromosoma bir bo'lagining yo'qilishidir. Yetishmovchilik ba'zan xromosoma ikki marta uzilishi natijasida ro'y beradi. Xromosomaning uzilib qolgan bo'lagi tushib ketib uzilgan joylari tutashadi va xromosoma kaltalashadi. Agar uzilib qolgan bo'lak uzunroq bo'lsa, uning uchlar birlasjib, mitozning metafazasida halqasimon shakilga kiradi va keying bo'linishlarda yo'qolib ketadi.


2. Duplikasiya- xromosoma biror uchastkasining ikkiga ortishi. Xromosoma bo'laklarining etishmasligiga teskari hodisa bo'lib, organism belgilarining o'zgarishiga olib keladi. Agar normal xromosomada genlar ABC tartibda jiylashgan bo'lsa, duplikasiya natijasida ular ABBC yoki ABBBC holatida bo'ladi. Duplikasiya tufayli o'zgargan gen bilan bog'liq belgi kuchayadi. Duplikasiya delesiyaga qaraganda organism genotipining umumiy sistemasiga kamroq zarar yetkazadi. Agar duplikasiya xromosomaning ko'proq qismida sodir bo'lsa, u organizm uchun zararli hisoblanadi.

3. Inversiya- xromosoma uchastkasining 180 gradusga burilishi. Inversiya xromosomaning ikki joyidan uzilishi va uzilgan qismlarining 180 darajada burilishi natijasida sodir bo'ladi. U tabiiy sharoitda hamda ionlashtiruvchi nurlar va ximyaviy moddalar bilan ta'sir etganda sodir bo'ladi.

4. Inversiya- Bitta xromosoma qismlarining o'zaro o'rin almashinishi.

Yuqorida qayd qilib o'tilgan xromosomalar ichida ro'y beradigan qayta tuzilishdan tashqari xromosomalararo qayta tuzilish bilan bog'liq mutasiyalr ham mavjud bo'lib, translokasiya- gomologik bo'lmagan xromosomalar o'rtasida uchastkala almashinishidir. Bu xodisa xromosomalar uzilishi natijasida vujudga keladi. Translokasiyani o'rganish ham nazariy ham amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Masalan tut ipak qurti urug'idan qaysi jins rivojlanishini urug'ning rangiga qarab ajratish mumkin

CHROMOSOMAL TRANSLOCATION




www.shutterstock.com · 388324522

bo'ldi.

15.1-Xromosoma translokasiyasi

Xromosoma ichida ro'y beradigan qayta tuzilishdan tashqari xromosomalararo qayta tuzilish bilan bog'liq mutasiyalar ham mavjud. **Translokasiya**- gomologik bo'lmagan xromosomalar o'rtasida qismlar almashinishi.





2-savol bo'yicha dars maqsadi: Xromosoma sonining karra ortish sabablarini tushuntirish

Poliploidiya- xromosoma soning karra ortishi. Dastlab 1889 yilda I.I.Gerasimov spirogira suv o'tida o'rgandi. Bu atamani birinchi bo'lib G.Vinkler kiritgan. *Pole*-ko'p, *plooseidos*- tur degan ma'noni anglatadi. 1909 yilda R.Geyts G.de Frizning mutasion nazariyasi uchun asos bo'lgan enotera o'simligi tabiiy tetraploid ekanligi aniqlandi. (Kolxitsin alkaloidi)

Xromosoma soning o'zgarishi bilan bog'liq mutasiyalar gaploid va diploid soning o'zgarishi (geteroploidiya yoki aneuploidiya) natijasidir.

Hujayradagi xromosoma soning o'zgarish sabablari:

- mitozning anafazasida xromosomalarning qutublarga noto'g'ri taqsimlanishi
- yadro bo'linib, hujayra sitoplazmasi bo'linmay qolishi
- xromosomalar ikki marta ko'payib, bir-biridan ajralmasligi sababli, organizmlarning yangi turi paydo bo'lishi.



Nazorat savollari:

1. Mutasiya xillari?
2. Xromosomalarning qanday mutasiya xillari bor?
3. Allopoliploidia qaysilar?

MA'RUZALAR KURSI
MODUL-16: HUJAYRALARNING QAYTA TIKLANISHI VA UMRINING
DAVOMIYLIGI.
MAVZU: HUJAYRA PATOLOGIYASI

REJA:

1. Hujayra patologiyasiga olib keluvchi faktorlar.
2. Hujayra organoidlarida ro'y byradigan patologik jarayonlar.
3. Rak hujayrasi patologiyasi.

Mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar:

Patologiya factor, hujayra, apoptoz, nekroz, elminasiya, rak, membrane, plazmatik,

1-savol bo'yicha dars maqsadi: Patologik jarayonlarni o'rganish

1-savol bayoni: Alohida olingan hujayralar ham butun organizmlar turli ta'sirlarga uchrashi natijasida ularda strukturaviy funksional o'zgarishlar yuzaga kylib bu patologiya rivojlanishiga sabab bo'ladi. bunday patologik jarayonlar organizm ayrim funksiyalarining buzilishiga va hujayra va organizm o'limiga olb kylishi mumkin. ko'p hujayrali organizmda yuzaga keladigan patologik jarayonlar nygizida alohida olingan 1 ta hujayrada yuzaga keladigan buzilishlar yotadi. bu g'oyani r.virxov ilgari surgan.

Haqiqtdan ham keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lgan qand diabeti kasalligining patogenezini ko'rib chiqadigan bo'lsak uning boshlang'ich etapi hujayrada va oxirgi etapi a'zolarida ekanligini ko'rish mumkin. Bu kassalik giperglikymiya bilan xarakterli bo'lib uning rivojlanishi buyrak, jigarni shikastlantiradi. Oshqozonosti bezi langergans orolchalaridagi v hujayralada insulin gormoni ishlab chiqariladi. Bu hujayralarda v granulari sonining kamayib kytishi natijasida gormon ishlab chiqarilishi kamayadi va kassalik rivojlanadi. 1 ta guruhga tygishli hujayralarda yuz byradigan o'zgarishlar sykin asta boshqa gurux hujayralarini ham qamrab oladi.

Shuni aytish kerakki normal sog'lom organizmda muntazam ravishda hujayralar nobud bo'lib turadi. bular qon hujayralari, qoplovchi va ichak epityliysi hujayralari. bular o'zini vazifasini o'tagan hujayralar bo'lib xozirgacha noma'lum sasdlarga ko'ra ularda biror bir funksianing o'chishi hujayra o'limiga olib keladi. ko'pgina hujayralar embrional rivojlanish davrida nobud bo'ladi. bular vaqtinchalik a'zrlarni xosil qilishda ishtirok etadigan hujayralar. bu xolatlar organizm uchun fiziologik norma bo'lib hujayraning programmashtirilgan o'limi – apoptozdir. nobud bo'lgan hujayralar to'qimadar fagositoz yo'l bilan chiqariladi. ularning o'rni yangi hujayralar bilan to'ldiriladi. o'limdan oldin bu hujayralarda sintyz jarayonlari to'xtab aktivligi kamayadi, vakuolyar sistymasi qismlarga ajraladi,mitoxondriyalar o'zgarishga uchraydi va lizisoma ichidagi fermentlar tashqariga chiqishi natijasida hujayra lizislanadi.

Shikastlangan hujayralarda AtF sintezi to'xtab kislorodga bo'lgan extiyoj oshadi.

Yadroning strukturaviy o'zgarishida xromatin kondynsasiyalanib yadro ichi sintyz jarayonlari kamayadi. Hujayra nobud bo'lishida xromatin koagulyasiyasi,ya'ni uning agrygatlar ko'rinishida yadroda yig'ilishi kuzatiladi(piknoz) bu esa ko'pincha yadroning siqilishiga (karioryksis) yoki yadroning erib kytishiga (kariolizis) ga olib

keladi. Yadrochalar ularda RNK sintezi to'xtashi natijasida granulalarini yo'qotib fragmentlarga ajralib ketadilar.

Yadro qobig'ida ro'y beradigan o'zgarishlardan biri perenuklyar bo'shliqning kengayib ketishi, yadro membranalarining qiyshayib ketishidir.

O'zgarishlarning erta etaplarida hujayra shaklining yumaloqlashishi va uning yuzasidagi o'simtalar, mikrovorsinkalar sonining kamayishi kuzatiladi. plazmatik membrana yuzasida turli pufakchalar yuzaga keladi.

Plazmatik membrana ning buzilishiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin:

- erkin radikallarning(stabil bo'lmagan va tashqi orbitasida toq elyatronlar soniga ega bo'lgan chastisalar) xosil bo'lishi.ular aktiv kislorodga ega bo'lib membrananing lipidlari bilan ryaksiyaga kirishishi natijasida ortiqcha enyrgiya xosil bo'ladi, lipidlar oksidlanadi.
- komplymynt sistymasining aktivlashishi. bular plazmatik membrana aktiv bo'lmagan oqsillari guruxi bo'lib ularning faollashishi natijasida membrana fyrmynativ ymiriladi. sog'lom hujayrada bu fyrmynklar yod moddalarni parchalash vazifasini bajaradi.
- Fermentlar ta'sirida lizislanishi. O'tkir pantryotitda va gangrena kassaligida ortiqcha fermentlarning sintezi plazmatik membrana ning nekrozini keltirib chiqaradi.
- hujayraga kirayotgan viruslar ta'sirida lizislanadi.
- kimyoviy va fizikaviy faktorlar ta'sirida(yuqori yoki past xarorat, kimyoviy moddalar)

plazmatik membrana shikastlanishi oqibatlar:

- strukturaviy butunlikning yo'qolishi. uncha katta bo'lmagan o'zgarishlar tiklanishi mumkin,lykin bunda plazmatik membrana yuzasi kamayadi.
- to'siq vazifasining buzilishiga sabab bo'ladi,bu esa hujayra ichiga ortiqcha suv kirishiga olib keladi.

Plazmatik membrana shikastlanishi turlari: membranal patologiyasi ularning o'tkazuvchanligining buzilishi, membrana orqali trasportning buzilishi, membranal xarakati va hujayra shaklining o'zgarishi, sintez va almashinuvning buzilishi. Membranalar shaklining o'zgarishi morfologik jixatdan dyformasiya va maxsus tuzilmalar atrofiyasi bilan tyshiklar va uzilishlar xlosil bo'lishi bilan xaraktyrlandi.

Mitoxondriyalar shikastlanish sabablari AtF sintyzi buzilishi bilan bog'liq.

Gipoglikymiya: glyukoza energiya xosil bo'lishida asosiy substrat va bosh miya neyronlari uchun asosiy energiya manbaidir. Shuning uchun qonda glyukoza miqdorining kamayishi(gipoglikymiya) ATF sintezining kamayishiga olib keladi,bu ayniqsa miya hujayralarida bilinadi.

Mitoxondriyalar shaklining o'zgarishi.

M.larning shishishi. Bu xolat m.ga suv kirishi natijasida ro'y byradi. uni m. xajmining kattalashishidan(mygamitoxondriyalar) farq qilish kyarak. m. shishishi turli xolatdarda och qolish,gipoksiya, intoksikasiya.

Shishish xolati kichik amplitudalarda borganda suv sykinlik bilan tashqi membranasidan o'tib kristalar saqlanib qladi va m, oldtngi xolatiga qaytishi mumkin.

katta amplitudalarda shishish kristalarning fragmyntasiyasiga va tashqi va ichki mymbtralarning yorilishiga olib keladi.

M.lar kristalari strukturasining o'zgarishi masalan ular sonining kamayishi m.faolligining kamayishida ham kuzatiladi.

Megamitoxondriyalar yadro kattaligida bo'lib, gypatositlarda alkogolizm, sirrozda, kiyoviy moddalar intoksikasiyasida kuzatiladi. bular intoksikasiyani yo'q qilgandan kyyin o'zining shaklini tiklaydi.

Yer sistymasi ko'pincha vakuolizasiyaga uchraydi-mayda pufakchalarga ajraladi. membranalari yuzasida ribosomalar soni kamayadi bu esa oqsil sintyzini kamaytiradi. sistyrnalar yuzasi kyngayadi, bu tayyor maxsulotlarning gA ga chiqarilish buzilishi natijasidir.

GA sistyrnalari ham aloxida vakuolalarga ajraladi ular tarkibida sykryt maxsulotlarito'dalanib qoladi.

lizosomalarda yuzaga keladigan patologik jarayonlarga tarkibidagi fyrmynrlarning ytishmasligi yoki membranasi uzilib fyrmynrlari gialoplazmaga qo'shilishi kiradi. Oxirgisi hujayraning avtoliziga sabab bo'ladi.

Ribosomalar patologiya natijasida o'z shaklini o'zgartiradi, spiraly shakliga kirishi mumkin.

mikronaychalardagi duplytlar orasidagi aloqaning uzilishi kiprikcha va xivchinlar xarakatsiz bo'ladi. chykuvchi odamlarda bronxlar shilliq qavatida joylashgan kiprikchalar xarakatsiz bo'ladi.

Hujayra shikastlanishida ularning mitotik aktivligi tushadi, ular mitozning turli stadiyalarida to'xtab qoladi. bunga asosiy sabab mitotik apparatning buzilishi.

Hujayra komponyntlari ro'y byradigan bu o'zgarishlar salbiy faktorning tabiatiga bog'liq bo'lmagan xolda bir xil kychadi. masalan jigar hujayralarida ro'y byradigan kassaliklarda ham mitoxondriyalar shishib, vakuolyar tizim vakuolalarga ajraladi; yurak infarktida ham xuddi shu narsa kuzatiladi.

bu esa hujayralar protoplazmasida turli salbiy ryaksiyalarga qaratilgan yagona molykulyar myzanizm borligidan dalolat byradi. bu myxanizm-paranykroz dyb atalgan. bunday paranykroz ryaksiyasi asosida oqsillarda ro'y byradigan dynaturasiya jarayoni yotadi. ularning 2 lamchi va 3 lamchi strukturalari o'zgaradi natijada oqsillarning kimyoviy va fizik xususiyatlari o'zgaradi.

Hujayradagi patologik jarayon salbiy faktor olib tashlanganda to'xtashi mumkin. Agar o'zgarishlar uzoqqa bormagan va yadrogacha ytib bormagan bo'lsa. bu xolda hujayra o'z xoliga qaytib funksiyasini tiklaydi. masalan: mitoxondriyalarning shishishi va er ning fragmyntasiyasi qaytar jarayon.

Hujayralaning ryparasiyasi(tiklanishi) to'liq yoki qisman bo'ladi. qisman ryparasiyada hujayra tiklanadi bir oz vaqt faoliyat ko'rsatadi lykin vaqt o'tishi bilan nobud bo'ladi. bu xolat yadroda qaytmas jarayonlar boshlanganligi tufayli sodir bo'ladi. masalan: infuzoriyalarni ul'trabinafsha nurlari bilan nurlantirganda biroz vaqtdan so'ng ular o'ziga kelib xarakati tiklangan lykin yadro tuzilmalari shikastlanganligi tufayli ular baribir nobud bo'lgan. Qaytmas jarayonlar natijasi hujayra o'limidir. hujayra o'limi katta jarayon. hujayra ichidagi gidrolitik fyrmynrlar aktivlashib gialoplazmadagi oqsillarni,

lipidlarni ymiradi natijada hujayra ichi membranalari ymiriladi shu jumladan lizosomalar membranalariham. bu esa hujayra avtoliziga olib keladi.

Hujayradagi patologik xolatlariga regulyatorlik jarayonlarining buzilishi ham kiradi. Bu esa almashinuv jarayonlarinig buzilishi va turli moddalarning to'dalanishiga sababbo'ladi. patologik anatomiyada bu xolat distrofiya dyy. yog' distrofiyasida yog' kiritmalari tomchilar ko'rinishida to'dalanadi. hujayralar yog'larni yutib ularni utilizasiya qilolmaganidan yog'lar sitoplazmada to'planadi. parchalvchi fyrmynltlar ytishmasligi natijasida glikogyn ko'p miqdorda to'planadi. shuningdyk hayvon hralarida pigmyntlar to'dalanadi.

Rygulyasiya jarayonlari patologiyasining bir ko'rinishi diffyrynsiyasiya jarayonining buzilishi natijasida shishi hujayralarining hosil bo'lishidir.

Shish hujayralarining asosiy xususiyati- doim to'xtamay bo'linishi, diffyrynsiasiyalanmasligi, organizm boshqaruvidan chiqib kytishi. sog' organizmda hujayralarning hayot faoliyati nyrv gumoral yo'l bilan boshqariladi va hujayralar typadan keladigan buyruqlarga bo'ysinadi. shish hujayralari esa organizm tomonidan byradigan buyruqlarga bo'ysinmasligi bilan xaraktyrlanadi. sog' organizm bu hujayralarni tanib olib ularni o'ldiradi lykin immunityti sust organizm ular bilan kurasha olmaydi. 21 asrda odam o'limiga olib keladigan asosiy kasalliklar qatoriga yurak tomir kasalliklari va rakdir.

Saraton kasalliklariga olib keladigan faktorlarga: tashqi muhitning ifloslanishi, radiasiya, konsyragyn moddalari bo'lgan oziq moddalarni isty'mol qilish, kam xarakat qilish,asabiylashish kiradi.normal hujayraning shish hujayrasiga aylanishini 2 bosqichi bor. 1chi bosqichda hujayralar to'xtovsiz bo'linadi. lykin shunchaki bo'linayotgan hujayralar organizmga xych qanday zarar kylvirmaydi asosiy rolni bunda onkogyn o'ynaydi. 2 chi bosqichda hujayralar zararli shaklga kiradi. bunda hujayralarning o'sishiga organizmning o'zi yordam byradi. u ko'payayotgan hujayralarni asrab har birini kapillyarlar bilan ta'minlab, shish xosil bo'layotgan joyga yangi sog' hujayralarni jalb shishning kyngayib o'sishini ta'minlaydi xuddi o'zining joniga suyuqasd qilgandyk va sykin o'zini o'limga olib keladi.

Ma'lum bo'lishicha organizm shish ralarini bitayotgan yara dyb qabul qilib ularni hujayralarnio'stirish orqali tuzatmoqchi bo'ladi. nima uchun?

Agar qo'limizni pichoq bilan kysib olsak yara sykin bitib boradi. 1 chi bosqichda qov ivishi uchun qon hujayralari yara ustida to'plana boshlaydi. makrofaglar,trombositlar o'zlaridan sitokinlarni-hujayra bo'linishini boshqaruvchi oqsillarni ishlab chiqara boshlaydi. sitokinlar hujayraning bo'linishini chaqirib yaraning ochiq joyi yangi hujayralar bilan to'la boshlaydi.

qonning ivishida signal bo'lib yara yuzasidagi shikastlangan yoki o'lik hujayralar xizmat qiladi.(probirkadagi qon shisha idish bilan aloqada bo'lgani uchun iviydi). biz pichoq bilan o'ldirgan yara ustidagi hujayralar jim turmaydi.ular o'zidan o'sish faktori bo'lgan sitokinlarni ajratib yoniga hujayralar migrasiya qilishi uchun signal byradi. buning natijasida hujayralararo bo'shlig'i limfa bilan to'lib u yrga yarani ishtirok etuvchi limfositlar va boshqa hujayralar to'planadi.

Dymak hujayralar bo'linishi uchun signal bo'lib yara ustidagi o'layotgan hujayralar xizmat qiladi. bu hujayralar nykroz usuli bilan o'ladi. hujAyrAlArning 2 chi

nObud bo'lish usuli- apoptoz organizm boshqaruvi ostida bo'lib bunda o'layotgan hujayralar sitokinlarni ishlab chiqarmaydi.

Ma'lumki DNK miz qo'sh zanjirdan tuzilgan. Organizmda vaqti vaqti bilan dnk zanjirida uzilishlar xosil bo'lib turadi. uzilishlar sababi turli stryss xolatlaridir. uzilishlar bitta zanjirda bo'lib uzilgan joy 2 chi zanjirdagi shu joyga qarab tuzatiladi. ya'ni uzilgan dnk bo'lagi sog'ining oldiga kylib undan nusxa ko'chiradi. bunday uzilishlar sog' hujayralarda yuqori samaradorlik bilan tuzatiladi. lykin ba'zan uzilish joyida uning duplyksi –kopiya uchramaydi. natijada dnk sida bunday uzilishlari bo'lgan hujayralar kasal nasl byradi va hujayralarning nobud bo'lishiga olib keladi. shish hujayralari dnk sida anashunday uzilishlar yuzaga kylib ular tiklanmasligi natijasida hujayralar mutant onkogynlar yuzaga keladi. bunday hujayralar tashqi signallarni eshitmaydi, faqat ichidagi kasal gynlar byrayotgan noto'g'ri signallarni qabul qiladi. bunday hujayralar 10% tashkil etsa ularning nykrozi organizmni yara bitiruvchi myxanizmi ishga tushadi va bu hujayralarning bo'linishini stimullay boshlaydi. shu tariqa o'sma kattalashadi. qon oqimiga shunday hujayralarning 1 si tushib qolsa u qon bilan boshqa a'zolarga ytib borib u yrda shish rivojlanadi(mytastaza).

Demak nekroz yo'li bilan nobud bo'layotgan rak hujayralarini apoptoz yo'li bilan nobud bo'lishga majbur eta olsak rakni yengamiz. Rak h-rlari o'zidagi mutantlik xususiyatini avloddan avlodga beradi.

Har kuni biz to'g'ri ovqatlanmaymiz, chala xazm bo'lgan oqsil tabiatli oziqa ichakdagi chirituvchi mikroflora uchun qulay oziqa muxiti xisoblanadi. Ularni o'ldirish uchun organizm immun sistymasining 50-60 % kuchi ketadi. Natijada xolsizlanadi va xosil bo'layotgan rak hujayralariga qarshi kurashishga kuchi qolmaydi.

Xozirgi vaqtda tibbiyotda rak bilan kurashishning 3 ta usuli mavjud: xirurgik aralashuv, kimyoviy terapiya, nurlanish. bu usullar rak hujayralarini o'ldiradi lekin birinchidan sog' hujayralar ham ko'plab nobud bo'ladi, 2 chidan kasal organizmi xolsizlanib immuniteti o'ladi. Nurlanish va kimyoviy usullar natijasida ko'plab nobud bo'lgan rak hujayralari chirib intoksikasiyaga sabab bo'ladi.

Xozirda talab qilinayotgan narsa bu hujayralar myxanizmini to'g'irlovchi dorilarni yaratishdir. bunda bir qancha yo'nalishlar mavjud:

- gynytik injynyriya shish hujayrasi gynomiga ytishmaydigan antionkogynlarni yuborish yoki onkogynlarni o'ldirish.

- onkooqsillarning patologik faoliyatini susaytirish; ularning noto'g'ri signallarni yuborish qobiliyatini o'ldirish.

Xozirda ko'pgina laboratoriyalarda bu borada ishlar olib borilyapti lekin 100 % kafolat xech qaysida yo'q.

Lykin shuni ta'kidlash zarurki kasallikni tuzatishdan ko'ra uni oldini olish oson. Buning uchun esa tanamizdagi normal hujayralarni dnk ni buzuvchi mutagen agentlar bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak: nurlanish, kimyoviy moddalar.... bunday agentlar orasida har yili ko'plab insonlar o'limiga sabab bo'ladigan chekish 1 chi o'rinda turadi. epidemiolog olimlar xulosasiga ko'ra ko'p mamlakatlarda chekish rak kassliklarining yarmiga sabab bo'lar ekan. Yillar mobaynida chekuvchining o'pkasida ko'plab onkogen mutasiyalari to'planib yotadi. Bunday mutasiyalar soni ma'lum bir miqdorga yetganda hujayrada shish yuzaga keladi. Agar chekishni shu mutasiyalar soni

yig'ilguncha tashlansa kasallikning oldini olish mumkin. hujayralarimizni sog'lom saqlab qolishga va o'zini to'g'ri tutishga erishaylik.

Nazorat savollari:

1. Plazmatik membrana tuzilishining o'ziga hos xususiyatlari?
2. Plazmatik membrana buzilish sabablarir?
3. Rak hujayralariga qarshi kurash usullari?

AMALIY MASHG'ULOT DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN ASBOB- USKUNALAR BILAN TANISHISH VA FOYDALANISHDA TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI

Har bir talaba o'zining doimiy ishlash joyiga ega bo'lishi, ish xonasini doim ozoda va saranjom tutishi, amaliy mashg'ulotlarda ishlatilmaydigan asbob uskunalari, kimyoviy moddalar, kitob daftar va boshqalar bo'lmasligi lozim.

Sitologiya fani darslarida hujayra tuzilishi ularning shakllari kelib chiqishi organoidlarning vazifalarini o'rganishda, fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakaning oshirishda, talaba laboratoriya sharoitida tajribalar qo'yish uchun turli organizmlardan kerakli organlarni ajratib olish texnologiyasi, oqsillarni, uglevodlarni aniqlash metodlari, yog'larga xos sifat reak-siyalarini, vitamin va garmonlarni aniqlash, nuklein kislotalarni gidroliz qilish, ok-sidlanish-qaytarilish fermentlarining faolligini aniqlash malakalariga ega bo'lishi kerak. Laboratoriya ishlarini bajarish davomida talabalar kimyoviy jarayonlarni amalga oshirishga imkon beradigan jihozlar va vositalar bilan tanishib, ularning qanday maqsadlarda ishlatilishini bilib olishi zarur bo'ladi.

Har bir talaba o'zining doimiy ishlash joyiga ega bo'lishi, ish xonasini doim ozoda va saranjom tutishi, mazkur laboratoriya mobaynida ishlatilmaydigan asbob, idishlar, kimyoviy moddalar, kitob-daftar va boshqalar bo'lmasligi lozim. Tajriba boshlashdan ilgari talaba laboratoriya ishi uchun zarur asbob va reaktivlarni bilib, ro'yxat qilib oladi.

Amaliy mashg'ulot asosiy ish qurollari: elektroplitka, eritmalar va reaktivlar uchun javonlar, analitik tarozi va boshqalar bo'lishi kerak. Tajribaga kerakli as-bobning ishga yaroqliligini, unga zarur bo'lgan hamma jihozlarni sinchiklab tek-shirilib, xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda bajariladi.

Tajriba o'tkaziladiganda birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun kerakli bo'lgan dori-darmonlari bo'lgan aptechka va boshqa jihozlar bilan ta'min-langani bo'lishi kerak. Tajriba tamom bo'lgach, idishlarni yuvib, tozalab, o'z joyi-ga tartib bilan qo'yish lozim. Bu idishlardan foydalanishni osonlashtiradi, keyingi tajribaga tayyor bo'lib turadi, vaqt tejraladi. Yuvilgan idishlar ustki tomonidan toza sochiq bilan artilgan xrom, xlorid kislotasi eritmalarini bilan yuviladi, so'ng distillan-gan suv bilan chayqab, quritish shkafida quritiladi.

Quruq reaktiv va eritmalarining tozaligiga, saqlanishiga alohida ahamiyat berish shart. Reaktivlar solingan idishlarning og'zini ochiq qoldirish mutlaqo mum-kin emas. Reaktivlar analitik tarozilarda tortilganda, toza, quruq shisha idishlarda, buyuksda hamda kichik kimyoviy stakanchalarda tortish lozim. Konsentrlangan kislotalar va 25%li ammiak eritmasini ishqalangan tiqinli shishada saqlash kerak. Ustidan shisha qalpoq yopib qo'yiladi. Eritmalar shkafda saqlanadi. Ishlanadigan xonada konsentrlangan kislotalar ozginadan (1–2l) havosi tortiladigan javon tagi-da, isitkich asboblardan uzoqroqda saqlanadi. Karbonat angidrid, suvni shimadigan reaktivlar, eritma solingan idish va shishalarning po'kaklari eritilgan parafinda shimdirib olinadi. Eritma solingan shisha ustiga aniq va chiroyli qilib eritmaning nomi, uning konsentratsiyasi, tayyorlangan vaqti (kun, oy, yili), talabaning ismi, familiyasi yozilgan yorliq yopishtiriladi. Eritma pipetka bilan asosiy shishadan olinadi. Ish-latish

uchun eritmadan stakanga ozgina ortiqroq quyib olish kerak. Stakanga qu-yilgan eritmani yana qayta shishaga quyish mumkin emas. Konsentrlangan kislota va ishqorlarning eritmalarini, zaharli suyuqliklarni pipetka orqali og'izda so'rib olish mumkin emas. Buning uchun rezina nasos yoki avtomat pipetkadan foydalaniladi.

Amaliy mashg'ulotda ishlash qoidalari

1. Amaliyot darslarida ham huddi laboratoiya darslaridek ish boshlashdan oldin xalat kiyish, suv, elektr, gaz borligini, mo'rili shkafning ishlash-ishlamasligini ko'zdan kechirish, so'ngra xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish kerak.
2. Har bir talaba, iloji boricha, o'zi uchun ajratilgan joyda ishlashi kerak.
3. O'tkazilgan tajribaning tavsifi unda ishlatiladigan asbob va reaktivlar tala-balarning ish daftarlarida to'liq yozilgan bo'lishi lozim. Tajriba materiallarini tala-ba to'liq o'zlashtirganiga, o'qituvchi iqrar bo'lganidan keyin, ishni bajarishga rux-sat etadi.
4. Tajriba o'tkazilayotganda, tozalikka va texnika xavfsizligiga rioya qilish kerak.
5. Ish vaqtida gaz yoki vodoprovod jo'mraklari va elektr asboblari, tarozilar ishlamay qolsa, tezda laborantga murojaat qilish kerak.
6. Tajriba tugagach, gaz gorelkasi, suv jo'mraklarini berkitish, gaz asbob-larni o'chirish va tajriba natijalarini laboratoriya daftariga yozish kerak.
7. Spirt lampasi yoki gaz gorelkasi bilan ishlayotganda ehtiyot bo'ling. Spirt lampasi alangasidan foydalanib bo'lgandan keyin, uni qopqoq yordamida o'chi-ring.
8. Elektr isitish asbobidan foydalanishdan oldin elektr simining izolatsiyasi butunligini tekshirib ko'rish.
9. Talaba ishlatib bo'lgan reaktivlarni joyiga qo'yishi, o'zi sintez qilgan moddani laborantga topshirishi lozim. Ishlatgan idishlar va asboblarni tozalab, shkaflarga qo'yib, ish joyini toza qoldirish lozim.
10. Amaliyot darsini qoldirgan talabaning o'qituvchisiz yoki katta labo-rantsiz tajriba o'tkazishiga ruxsat etilmaydi.

Amaliy darslarda rioya qilish kerak bo'lgan xavfsizlik texnikasi qoidalari

Amaliyotda ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lmasligi uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak:

1. Amaliyotda o't o'chirgich uchun jun material va yashikda qum bo'lishi kerak.
2. Natriy va kaliy metallarini kerosinda, benzolda yoki toluolda saqlash lozim. Ular qisqich bilan olinib, filtr qog'oz ustida skalpel yordamida mayda bo'lak-larga bo'linadi. Filtr qog'oz ustida qolgan natriy yoki kaliy metallarning mayda bo'laklarini tashlab yuborish man etiladi. Ular maxsus idishlarga solib yoki spirtida eritib yuborishi kerak.
3. Oson uchuvchan yoki tez yonuvchan organik erituvchilar (benzol, toluol, benzin, etil spirti va h. k) saqlanadigan idish og'zini ochiq holda alanga yoki elektr plitkalari oldida qoldirish man etiladi. Bunday eritmalarini laboratoriyada bir litrdan ko'p saqlash mumkin emas. Tajriba o'tkazilayotganda asbobning germetik ulan-ganligini kuzatish kerak. Oson uchuvchan va tez yonuvchan organik moddalarning ochiq alanga yordamida qizdirish taqiqlanadi.

4. Tajriba o'tkazilayotgan vaqtda ish joyini tashlab ketish qat'iy man etiladi.
5. Kislota eritmasi tayyorlanayotganda suvni kislotaga emas, balki kislotani suvda oz-oz miqdorda solib tayyorlash lozim.
6. Organik moddalarni hidlash, mazasini tatib ko'rish va ularni og'zi ochiq idishda qoldirish mumkin emas.
7. Tajriba tugatilgach, gaz va elektr asboblarni o'chirish va ish joyini nav-batchi laborantga topshirish lozim.

Ko'ngilsiz hodisalar ro'y berganda birinchi yordam ko'rsatish

1. Amaliyotda aptechka bo'lishi shart, uning qayerda joylashganligi va undan qanday foydalanishni talaba bilishi lozim.
2. Issiq ta'sirida kuygan joyga tezda spirt yoki kaliy permanganat eritmasi bilan ho'llangan paxta qo'yiladi.
3. Ko'zga yoki badanning biror joyiga kislota sachrasa, o'sha joy, dastlab, yaxshilab suv bilan, so'ngra sodaning 3%li eritmasi bilan yuviladi.
4. Ishqor sachraganda esa, dastlab, suv bilan, so'ngra sirka kislotaning 1%li eritmasi bilan yuviladi.
5. Shisha kesgan joy, dastlab, shisha siniqlaridan tozalanadi, so'ngra yod-ning 3%li eritmasi surtiladi va sterillangan bint bog'lanadi.
6. Gazlar ta'sirida zaharlarganda novshadil spirt hidlatib, ochiq havoga olib chiqiladi.
7. Fenol ta'sirida kuyganda zaharlangan joyni spirt bilan artish kerak.
8. Brom ta'sirida kuygan joyni spirt yoki suyultirilgan ishqor eritmasi bilan yuvib, keyin yana spirt bilan artiladi.
9. Brom hidi bilan zaharlanganda spirt bug'idan chuqur nafas oldirib, sut ichirib, ochiq havoga chiqarish kerak.

1-Amaliy mashg'ulot

MAVZU: MIKROSKOP TUZILISHI VA U BILAN ISHLASH QOIDALARI

Asosiy maqsad: Mikroskop tuzilishi bilan tanishish

Vazifalar: Mikroskop qismlarini farqlang

Nazariy tushuncha: Mikroskop har bir biologning doimiy ish quroli hisoblanadi. Shu sababdan ham uning tuzilishini va unda ishlashni yaxshi bilish kerak.

Mikroskop optik asbob bo'lib, ko'rayotgan obyektini bir necha marta katta qilib ko'rsatadi. Bu vaqtda ikki optik tizim kombinatsiyasi ya'ni obyektiv — manzaralar tizimi — birlamchi kattaligini bevosita ko'rsatadi va okulyar manzaralar tizimi — obyektiv beradigan tasvirni kattalashtirib ko'rsatadi: masalan agar obyektiv 8 marta kattalashtirib ko'rsatayotgan tasvirni 7 okulyar bilan yanada kattalashtirib ko'radigan bo'lsak, biz tekshirayotgan ob'yektni 56 marta (7x8) kattalashtirib ko'rayotgan bo'lamiz. Aytish joizki, mikroskopda tasvir teskari ko'rinadi. Shuning uchun agar preparatning o'ng tomonini ko'radigan bo'lsak, chapga, tepa tomonini ko'radigan bo'lsak, pastga qarab siljitishimiz kerak. Mikroskopda tasvir kattalashib ko'rilayotgani uchun preparatni ohista, yumshoq siljitish tavsiya etiladi. Aks holda kerakli joy ko'rish maydonidan chiqib ketadi.

Mikroskop, asosan 3 qismdan iborat. Mexanik qismga barcha qismlar kiradi, asosini esa mikroskop tayanchi(oyog'i) va shtativ tashkil etadi.

Shtativ — mikroskopning mexanik qismini yorituvchi optik linzalarni birlashtirib turadi. Asosiy qismi — oyog'i ko'proq taqasimon holatda bo'ladi va u mustahkam o'rnatish uchun qulaydir. Shtativ turli linzalarda turlicha shaklda bo'lib, asosiy vazifasi tubus va revolverni birlashtirishdan iboratdir. Tubusning yuqori qismida okulyar, pastki qismida esa obyektivlar joylashgan.

Prizmatik qopchiq yarim sharsimon shaklda bo'lib, tubus vint bilan qotiriladi. Ilmiy tekshirish ishlarida stereoskopik tasvir olish uchun hamda har ikkala ko'z bilan kuzatishga mo'ljallangan binokulyar tubus ishlatiladi. Tubusni yuqoriga va pastga tushirish uchun makrovint va mikrovintdan foydalaniladi.

Revolver tubusning pastki qismida joylashgan, 3 yoki 4 uyachasi bolib, ularga obyektivlar joylashadi va revolverni aylantirib, tez sur'atda turli kattalikdagi obyektivni almashtirish imkoniyati bor.

Buyum stolchasi o'rganilayotgan preparat joylashtirib qo'yiladigan joy bo'lib, uning o'rtasi teshilgan va u tubus o'qiga to'g'ri keladi. Buyum stolchasi mikromexanizmning ustki qismi oldida harakatchan va harakatsiz joylashadi. Stolcha ustida o'rganilayotgan preparatning qimirlab ketmasligi uchun prujinasimon plastinkali ushlagichlar (zajim - klemma) fiksatorlar mavjud.

Buyum stolchasi ostida yoritqich moslamalari bo'lib, uning tarkibiga ko'zgu va kondensor kiradi, ular yoritqich asmlar qismi hisoblanadi. Bu kondensor to'plangan yorug'lik nurlarini preparat tomon yo'naltirib turish uchun xizmat qiladi.

Mikroskopning optik qismiga revolverga burab qo'yiladigan obyektivlar va tubusga qo'yiladigan okulyarlar kiradi. Obyektivlar yon qismida ularni ancha katta qilib ko'rsatadigan sonlar bitilgan. Shunga ko'ra, obyektivlar kuchsiz, o'rtacha kuchli va

o'ta kuchli bo'ladi. Okulyarlar ham kuchsiz (5.7), o'rtacha (10x) va kuchli (15x) bo'lib, ko'proq shu ko'rsatilgan holatda ishlatiladi.

Mikroskop bilan ishlashdan oldin uni yaxshilab o'rnatib olish kerak. Shundan so'ng ko'zguning botiq tomonini o'rnatib eng kichik obyektiv kondensor linzalari ustiga qo'yiladi. So'ngra quyidagilarni bajarish kerak:

1. Stolning chekkasiga mikroskopni yaxshilab o'rnatib, okulyarni ko'z bilan bir tekisda joylashtirish lozim.

2. Kuchsiz obyektivda yorug'likni topish uchun ko'zguni aylantirib, o'rganilayotgan maydonni bir tekisda yoritish kerak. Yorug'lik ko'zguni qamashligi lozim.

3. Buyum stolchasiga preparatni joylashtirib, obyekt o'rnini stolcha teshigi bilan obyektiv to'g'risiga qo'yib klemmalar bilan qotirish kerak.

4. Makrovint yordamida fokus topiladi.

5. Preparat kuchsiz obyektivda kuzatiladi va kerakli darajada yaxshilab qotiriladi.

6. Mikroskop fokusini o'zgartirmay revolvorni aylantirib, kuchsiz obyektiv kuchli obyektivga almashtiriladi. Kuchli obyektivning o'rniga tushganligini revolvorning chiqillashidan bilish mumkin.

7. Makrovint yordamida ehtiyotlik bilan kuchli kattalikning fokusi topiladi va ko'zga moslashtirish uchun mikrovintdan foydalaniladi.

8. Preparat kuchli obyektiv mikrovintning oldinga va orqaga to'xtovsiz burish yordamida o'rganiladi.

Mikroskopda, asosan, chap ko'z yordamida kuzatiladi, o'ng ko'z doimo ochiq bo'lishi lozim, chunki ko'z muskullari koordinatsiyalangan holda ishlaydi. Bir ko'zning muskuli qisqarganda, ikkinchisi ham shu holatga tushadi. Dastlab o'ng ko'z xalaqit berayotganga o'xshasa-da, keyinchalik moslashib boradi.

Ish tugagandan so'ng yordamchi apparat yordamida rasm chiziladi. Shundan so'ng obyektiv kuchsiziga o'tkazilib, preparat buyum stolchasidan olinadi. Kuchli obyektiv ostidan preparat olinmaydi, chunki u buzilib, obyektivni sindirishi mumkin.

Kuchsiz obyektiv bilan ishlayotganda, kondensor pastga tushiriladi, kuchlisi bilan ishlaganda, yuqoriga ko'tariladi. Bu usul yordamida yorug'likning qulay holati topiladi va preparat detallari yaqqol ko'rinadi.

Mikroskopning diafragmasi mikroskopik tuzilmalar kontrastligi yaqqol ko'ringuncha berkitilishi kerak.

MIKROSKOP TURLARI

Hozirgi vaqtda gistologik preparatlarni mikroskopda ko'rishning 15 dan ortiq usuli mavjud. Quyida ularning eng asosiylari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Qorong'i maydonli mikroskopda ko'rish. Bu mikroskopning tuzilishi va unda preparatlarni ko'rish tizimi yorug' maydonli mikroskop bilan deyarli bir xil bo'lib, u tirik hujayra va to'qima tuzilmalarini o'rganishga mo'ljallangan. Unda hujayrani qorong'i maydonda ko'rish kondensor yordamida amalga oshiriladi, ya'ni yorug'lik nuri kondensor orqali obyektga qiyalatib tushiriladi. Bunda obyekt (preparat) yorishib, maydon qorong'iligicha qoladi. Tirik hujayra tarkibidagi tuzilmalar yaqqol ko'rinishi uchun obyektga tushayotgan yorug'lik nuri har xil optik qalinlikda bo'lishi shart.

Mazkur mikroskopda bo'yalgan yoki bo'yalmagan tirik hujayralarni, bakteriya va strukturalarini tadqiq etish ancha qulay.


Fazali kontrast mikroskopda ko'rish. Bo'yalmagan tirik hujayralar, odatda, yorug'lik nurini tutib qolmasdan, o'zidan o'tkazib yuboradi. Shuning uchun ular mikroskopda ko'rinmaydi yoki anglab bo'lmas darajada ko'rinadi. Ularni ko'rish uchun tegishli bo'yoqlar bilan bo'yashga to'g'ri keladi. Fazali kontrast mikroskopiya usuli o'rganilayotgan bo'yalmagan tuzilmalarning bizga zarur bo'lgan kontrastligini ta'minlaydi. Kontrastlikni, odatda, obyektivda, undagi fazali plastinka deb ataladigan kondensorga o'rnatilgan maxsus halqa — diafragma hosil qiladi. Obyektning yaqqol ko'rish nurning sinishiga bog'liq, yorug'lik nuri obyektidan qancha tez o'tsa, uning yoritilishi, ya'ni kontrastligi shuncha ortadi, binobarin, hujayra tuzilmalari ham shunga yarasha aniq ko'rinadi.

Interferensiyali mikroskopda ko'rish. Mazkur mikroskopda ko'rish usuli fazali kontrast mikroskopga o'xshashda, unga nisbatan ancha ko'proq imkoniyatlarga ega. Masalan, uning yordamida bo'yalmagan tirik hujayralarning aniq tasvirini va ularning quruq vaznini (massasini) aniqlash mumkin. Bundan tashqari, bu usul yordamida hujayralarning qalinligini, tarkibidagi quruq moddalarning zichligini, shuningdek, suv, nuklein kislotalar (NK), oqsil va fermentlarning miqdorini bilish mumkin. Interferensiyali bo'yalgan preparatlarning yadrosi, odatda, qizilga, sitoplazmasi esa zangori rangga bo'yaladi.

Lyuminescent (yoki flyuoressent) mikroskopda ko'rish. Lyuminesentsiyada qator moddalarning atomlari (rionlar) qisqa toliqinli nurlanishni yutib, harakatchan holatga keladi. Ularning harakatchan holatdan normal me'yorga kelishi yorug'likni katta to'liqin uzunligida tarqatib yuborish hisobiga amalga oshiriladi. Binobarin, gistologik preparat unga nur ta'sir qilish vaqtida hosil bo'lgan energiya hisobiga nurlanadi, ya'ni flyuoressensiyalanadi. Binafsha nurlar yoki to'liqin uzunligi 0.27 - 0.4 mkm li spektorning ko'k qismi yorug'lik manbai bo'lib xizmat qiladi. Energiya obyektga (preparatlar) turli yo'llar orqali va turlicha ta'sir qilishi mumkin. Shunga ko'ra, ular bir necha xilga bo'linadi: fotolyuminesensiya, rentgenolyuminesensiya, radio-lyuminesensiya shular jumlasidandir.

Elektron mikroskopda ko'rish. Gistologik preparatlarni elektron mikroskopda o'rganish hozirgi vaqtda keng tarqalgan usul bo'lib, uning yordamida hujayralarning nozik tuzilmalari, orgonoid va hujayra kiritmalarining tuzilishi hamda ularda sodir bo'ladigan nozik o'zgarishlar kuzatiladi. Elektron mikroskop 100000 marta va undan ham ortiq kattalashtiriladi. Chunki, elektron mikroskopda yorug'lik mikroskopdagi kabi uzun toliqinli nurdan emas, balki qisqa toliqinli elektronlar nuridan foydalaniladi.

Oddiy mikroskopda hayvonlar to'qimasining mikroskopik tuzilishini o'rganish uchun kesmalarning (preparatlarning) qalinligi taxminan 3-5 mikron (mk) bo'lishi kerak. Bundan qalin boisa, hujayralar qavati ortib ketib, obyektning tasviri aniq ko'rinmaydi, ularni o'qish yana ham qiyinlashadi. Binobarin, kuzatilmoqchi boigan obyekt tasviri elektronlar nuri yordamida ko'rsatilsa, bunga elektron mikroskop deyiladi. Demak, qisqacha ta'riflaydigan boisa, elektron mikroskopda ko'rish — obyekt orqali o'tkazilgan elektronlar tutamini elektromagnitli linzalar bilan fokuslash orqali preparat tasvirini olib o'rganishdan iborat.



1.1-rasm. YEVM -100 A K markali mikroskop.

1-mikroskop kolonkasi; 2-boshqarish pulti; 3-Lyuminessent ekranli kamera; 4-tasvirni tahlil eiuvchi blok; 5-kuzatish signalini beruvchi moslama


Elektron mikroskopning afzalligi shundaki, to'qimalardan olinadigan kesma ancha yupqa (0.02 mk) bo'ladi. Albatta, bunday kesmalar, odatda, ultramikrotomdan foydalanib tayyorlanadi. Buning uchun esa mikrotom stolga qimirlaydigan qilib o'rnatiladi, pichoqlari alohida shishadan yasaladi. Kesmaning qalinligi metall sterjenning kengayishini ta'minlaydi. Oddiy mikroskopda obyektning qalinligi, ya'ni hujayra yoki yadrolarning keng maydondaligi, ularning diametri «mikron» bilan o'lchansa, elektron mikroskopda «nanomer» bilan, aksari hollarda esa «angestrem» (\AA)² bilan o'ichanadi.

Hozirgi vaqtda elektron mikroskopning yangi-yangi turlari yaratilmoqda. Masalan, hajmiy (rostlovchi) elektron mikroskop shular jumlasidandir. Uning yordamida preparatlarning hajmiy tuzilishi o'rganiladi.

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Mikroskop, buyum va qoplag'ich oynachalari, albom

Ishni bajarilishi:



Mikroskop qismlari:

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10
11	12
	13

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun tegishli savollar:

1. Sitologiyada qo'llaniladiga qanday uslublar bor?
2. Fiksasiyalangan hujayralarni o'rganish uslubi?
3. Elektron mikroskopiya uslubi?

KEYSLAR BANKI

KEYS-1

MAVZU: SITOLOGIYA FANIGA KIRISH.

Sitologiya fani bir qancha fanlar bilan uzviy bog'liq. Sitoliga juda ko'p fanlarni qamrab oladi. Sitologiyani o'rganishda bir qancha metodlardan foydalaniladi. Hozirgi vaqtda sitologiya metodlaridan biri mikroskopiya ham juda takomillashgan metod hisoblanadi.

TOPSHIRIQ-1. Aytingchi sitologiya qaysi fanlar bilan yaqindan bog'liq? Nima sababdan? Mikroskopiya metodi bu fanlarni bog'laydimi? Hozirgi kunda O'zbekistonda sitologiya fanini rivojlanishga hissa qo'shayotgan olimlar? Ular qaysi metodlardan foydalanishyapti?

2-AMALIY MASHG'ULOT


MAVZU: PROKARIOT VA EUKARIOT HUJAYRALARNING MIKROSKOPIK TUZILISHI

Asosiy maqsad: Prokariot va eukariot hujayralarni farqlash


Vazifalar: Prokariot va eukariot hujayralarni taqqoslash. Prokariot hujayralarning ahamiyatini o'rganish

Nazariy tushuncha: Qaysi hujayra va organizmda metabolizm, kopayish, harakatlanish kabi jarayonlar sodir bo'lib tursa u tirik hisoblanadi. Tiriklikning ikki hil *hujayravii* va *hujayrasiz* shakillari tafovut etiladi. Hujayradan tashkil topgan tirik tabiat olamining barcha organizmlari ikki yirik guruhga bo'linadi:

1. Prokariotlar (Pro- avvalgi, karion yadro) bakteriyalar, ko'k yashil suv o'tlari, yadrosiz hujayralar. Ularinng oziqlanishi geteratrof, ham aftotrof yoki fototrof jarayonlar bilan boradi. Ko'payishi jinssiz.
2. Eukariotlar bir hujayralilar zamburug'lar, o'simlik va hayvon hujayralari.



2.1-rasm. Bakreriya hujayrasining tuzilishi



2.2-rasm. Eukariot hujayraning umumlashgan sxemasi

	Prokariot hujayra	Eukariot hujayra
Hujayraning irsiy apparati	Yadro mavjud emas	Shakillangan yadro mavjud
	Irsiy tuzilmasi-genofor	Irsiy tuzilmasi-xromosomalar
	Genofor sitoplazmada joylashgan	Xromosomlar yadro karioplazmasida joylashib sitoplazmadan yadro qobig'I bilan chegaralangan
	Genofor DNK dan iborat	Xromosomalar-DNP dan iborat; DNP= DNK+oqsillar
	Genofor halqa ko'rinishiga ega	Xromosomalr-tayoqcha va ipsimon ko'rinishga ega
Sitoplazma	Organoidlardan ribosomalr mavjud	Hujayraning turli organoidlari mavjud
	Sitosklet yo'q	Sitosklet mavjud
	Sikloz kuzatilmaydi	Sikloz sodir bo'ladi
Plazmalemma	Sitoplazmatik membrana mezosomalrni hosil qiladi	Mezosomalr mavjud emas

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Prokariot va eukariot hujayrasining rasmi tasvirlangan slaydlar va jadvallar, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar,

Ishni bajarilishi: 1. Prokariot va eukariot hujayrani farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda prokariot va eukariot hujayralarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Prokariot hujayra qanday tuzilgan?
2. Prokariot va eukariot hujayralarni solishtiring
3. Sitolojiya oldida turgan qanday muammolar bor?

KEYSLAR BANKI

KEYS-2

MAVZU: HUYAYRA TIPLARI

Tabiatda hujayraviy shakillarning prokariot va eukariot xillari mavjud. Prokariot hujayralar-juda ham mayda, 300-500 nm diametrga ega. Ularni morfologik ajratib turadigan yadrosi yo'q. Bunday hujayralarda membranali sistemalar, hujayra markazi bo'lmaydi. Genetik apparat halqali xromosomadan iborat, u asosli oqsil gistonlarni tutmaydi. Ular uchun hujayra ichi harakati va amyobaoid harakatlanish harakterli emas. Bunday hujayralar mitoz yo'li bilan bo'linmaydilar. Bu tip hujayralarga bakterialar va ko'k-yashil suv o'tlari kiradi.

TOPSHIRIQ-1. Eukariot – hujayralar tuzilishi 2 xil bo'ladi. Ulardan birinchisi bitta hujayradan tashkil topadi va fiziologik jihatidan to'liq qimmatli individ hisoblanadi. Shu munosabat bilan ularda organlar vazifasini bajaradigan mayda tuzilmalar bo'ladi. Qanday tuzilmalar?

TOPSHIRIQ-2. Sizningcha viruslar qaysi tipga kiradi? Nima uchun. Javobingizni izohlang.

Sitologiya fani oldida turgan muammo.

3-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: HUYAYRALARNING SHAKLI VA O'LCHAMI.

Asosiy maqsad: Hujayralarning shakli va o'lchami to'g'risida tushunchaga ega bo'lish.

Vazifalar: Hujayra shakillarini o'rganadi, ularning shakli bajaradigan vazifasiga bog'liq yoki yo'qligini o'rganadi


Nazariy tushuncha: Hujayralar turli kattalikka va shaklga ega bo'lishiga qaramay, ularning tuzilishi umuman o'xshashdir. Barcha hujayralar sitoplazma, yadro va hujayra qobig'idan tashkil topgan. Hujayraning barcha asosiy qismlari — sitoplazma oqsillar, yog'lar va uglevodlardan iborat.

O'simlik hujayrasining shakli va o'lchamlari judayam turli tuman va o'simlikning qaysi qismida bajaradigan vazifasiga bog'liq, tig'iz joylashgan hujayralar o'zaro tiqilishib joylashganligidan ko'p hollarda ko'p qirrali bo'ladi. Odatda ko'p qirralisi 4-6 burchakdan iborat 14 qirrali. shuning uchun kesmalarda 4-6 qirrali ko'rinadi. Alohida o'sayotgan hujayralar yumaloq, lappaksimon, yulduz, g'ola shakllarga ega bo'lishi mumkin. uzunligi va eni ko'p farqlanmaydiganlarni *parenxima* hujayralar deb atalib voyaga yetganida odatda tirik bo'ladi. Bargda va ho'l mevalarda ko'p hollarda parenxima hujayralari ko'p.

O'simlik tanasidagi hujayralar ko'pincha ma'lum yo'nalishda siqilganligidan ancha cho'zilgan bo'ladi. Ularni *prozenxima* hujayralar deyiladi. Ikki uchi cho'ziq, bunday hujayralar yog'ochlik uchun hos bo'lib voyaga etganida o'lik holda bo'ladi.

O'simliklardagi voyaga yetgan hujayralar huyvondagilardan farqlanib deyarli hamma vaqt doimiy o'zgarish shakliga ega bo'ladi, bu ularning qattiq po'sti bilan izohlanadi.

Hujayraning katta-kichikligi ma'lum chegaralarda va u o'simlikni turkumi va hujayra tipigi bog'liq. o'simlik hujayrasi juda kichkina, uni mikroskop orqali ko'rish mumkin holos. Murakkab tuzilgan o'simliklarda ularning kattaligi 10-100 mkm (ko'pincha 15-60 mkm keladi). Suv g'amlovchi va oziq moddalar tutgan hujayralar, masalan kartoshka tuganagining parenxima hujayralari, ho'l mevalarning hujayralari odatda katta bo'ladi. Pishgan tarvuz, limon, apelsin, mandarinlarning yumshoq etini hujayralari ancha katta, bir necha millimertgachaligidan ularni shunday ko'rish mumkin. Ayrim prozenxima hujayralar masalan, kanopning lub tolasida 40 mm, qichitqio'tda esa hatto 80mmga yetsa ham ko'ndalangi kichkinaligicha qoladi. Murakkab tuzilishli yuksak o'simliklardagi hujayralarning soni astronomik kattalik bilan belgilanadi. Shuni aytish kifoyaki biror daraxtning bargidagi hujayralarning soni 100 mln dan ortiqroq miqdorda bo'lishi mumkin.



3.1-rasm. Fiksatsiya qilingan hujayralar shakllari.

1-ichak epiteliysining silindrsimon hujayrasi; 2-kubsimon hujayralar; 3-yassi epiteliy; 4-qadahsimon hujayralar; 5-qon hujayralari; 6-silliqliq muskul hujayrasi; 7-spermatozoid; 8-o'simtali nerv hujayrasi; 9-qanotli hujayra

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Hujayraning turli hil shakilli rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Hujayra shakillarini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda hujayra shakillarini kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Qanday hujayra shakillarini bilasiz?
2. Hujayra shakillarining o'zgarishi nimalarga bog'liq deb o'ylaysiz?
3. Shakli o'zgaruvchan va doimiy shakilga ega bo'lgan hujayralarga misol keltiring?

KEYSLAR BANKI

KEYS-3

MAVZU: HUJAYRALARNING SHAKLI VA O'LCHAMI.

O'simlik hujayrasining shakli va o'lchamlari judayam turli tuman va o'simlikning qaysi qismida bajaradigan vazifasiga bog'liq, tig'iz joylashgan hujayralar o'zaro tiqilishib joylashganligidan ko'p hollarda ko'p qirrali bo'ladi.

TOPSHIRIQ-1. Hujayra shaklini o'zgarishi nimalarga bog'liq?

TOPSHIRIQ-2. Shalini o'zgartirmaydigan hujayralarni

4-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: HUJAYRANING TASHQI APPARATI.

Asosiy maqsad: Hujayralarning harakat organoidlari to'g'risida tushunchaga ega bo'lish

Vazifalar: Hujayralarning harakat organoidlarini hujayra hayotidagi ahamiyati

Nazariy tushuncha: Kiprikchalar hujayra sitoplazmasining ingichka silindrsimon o'sig'i bo'lib, diametri 200 nm ga teng. Bu o'siq asosidan ustki qismigacha plazmatik membrana bilan qoplagan bo'lib, kiprikcha markazida mikronaychalar tizimi joylashadi. Kiprikchadagi mikronaychalar tizimini aksonema deyiladi.

Kiprikchalar aksonemasi bazal tanacha va sentriola mikronaychalar tizimidan farqli ravishda 9 triplet dan iborat bo'lmay, balki aksonema devorini hosil qiluvchi 9 juft periferik va 1 juft markaziy mikronaychadan iborat. Umuman kiprikchalar mikronaychalar tizimini $(9 \times 2) + 2$ deb yozish mumkin. Sentriolada esa bu tizim $(9 \times 3) + 0$ ga teng. Bazal tanacha va kiprikchalar aksonemasi uzviy bog'liq bo'lib, ular bir-biriga davom etuvchi tuzilmani hosil qiladi. Bazal tanachaning A va V mikronaychalari aksonemaning A va V mikronaychalaridir.


Hujayra markazi mitotik apparatni, shu jumladan, dukchani va yulduzchani hosil qilishda rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda shunisi aniqki, mitozda qutblanish hujayra markazi tomonidan bajariladi. Qutblar hujayra markazlarining bir-biridan qochish natijasida hosil bo'lib, dukning va xromosomalarning joylashishini belgilaydi.

Sitoplazmaning fibrillyar tuzilmalari. Sitoplazmaning fibrillyar tuzilmalariga yo'g'onligi 10 nm keladigan mikrofibrillar va yo'g'onligi 5-6 nm bo'lgan mikrofilamentlar kiradi.

Mikrofibrillalar yoki tayanch fibrillalar hayvon hujayrasi uchun xos bo'lib, u asosan epiteliy hujayralarida va ba'zan glial hujayralarda uchraydi. Mikrofibrillalar oqsil tabiatli bo'lsa kerak. Ular bir necha yuz fibrillalardan tashkil topgan tutamlar hosil qilishi mumkin, mikronaychalar singari tayanch funksiyasini o'taydi.

Mikrofilamentlar sitoplazmaning chetki yuzlarida tutamlar hosil qilgan holda joylashadi. Ularni ambalar psedopodiylarida yoki harakatdagi fibroblastlarning o'siqlarida ko'rish mumkin. Oxirgi vaqtlarda mikrofilament tutamlarida mushak to'qimasining

qisqaruvchi elementlaridagi singari aktin, miozin, tropomiozin, aktinin topilgan. Mikrofilamentlar qisqarish vazifasini bajaradi.



**4.1-rasm. 1-bakterialar; 2-epiteliy hujayrasi; 3-psevdopodiylar;
4-xivchinli yevglina; 5-infuzoriya-tufelka kiprikchalari**

Sodda hayvonlar ichida ko‘p sonli xivchinlilar (evglena) xivchinlari yordamida, ko‘p hujayrali hayvonlarning spermatozoidlari ham xuddi shu holatda harakatlanadi.


Bitta hujayrada xivchinlar soni odatda ko‘p emas, bittadan bir necha o‘ntagacha bo‘lishi mumkin.

Infuzoriya-tufelka yuzasida yuzlab, minglab kiprikchalar bo‘lib, shu kiprikchalar yordamida u suvda harakatlanadi. Umurtqali hayvonlar va odamning nafas olish tanasidagi havo o‘tkazuvchi yo‘llar hujayrasini minglab kiprikchalar qoplab turadi. Bu kiprikchalar bitta yo‘nalishda harakatlanib suyuqlik oqimini hosil qiladi va u bilan organizmdan qattiq zarrachalar, masalan, changlar chiqarib turiladi. Kiprikcha va xivchinlar o‘zlarining nozik tuzilishiga ko‘ra, bir xil ekanligi elektron mikroskop yordamida aniqlanadi. Ular devorning bu tun uzunligi bo‘ylab, guruh holda joylashgan juda mayda naychalardan o‘tadi.

Barcha hayvon va o‘simlik organizmlar kiprikcha va xivchinlarning tuzilishi bir xil bo‘lib, u organik olam kelib chiqishi birligini isbotlovchi vositadir.

Odam ham, ko‘p sonli hayvonlar ham bir xilda, ya‘ni muskul qisqarishlari yordamida harakatlanadi. Miofibrillalar, ya‘ni diametri taxminan 1 mkm, uzunligi 1 sm gacha va undan ortiq bo‘lgan ingichka iplar muskul tolalarining asosiy qisqaruvchi organoidlaridir. Mikrofibrillalar muskul tolasi uzunligi bo‘ylab joylashadi.

Maxsus harakatlanish organoidlari bo‘lmagan va psevdopodiy yordamida harakatlanadigan bir qancha hayvon hujayralari ham mavjud. Ularga sodda hayvonlardan amyobalar, umurtqali hayvonlarning leykositlari va ichki organlardagi yirik hujayralar kiradi.




4.2-rasm. Kiprikchalarni tuzilishi va elektron mikrofotogrammasi x 50000. 1-plazmatik membrana; 2-markaziy naychalar; 3-dupletlar; 4-tripletlar

MAXSUS ORGANOIDLAR

Bu organoidlarga, asosan miofibrillar, neyrofibrillar, tonofibrillar, xivchinlar, kiprikchalar, mikrovorsinkalar kiradi.

Ipsimon oqsil tabiatli tonofibrillar asosan epiteley hujayralarida uchraydi. Diametri 6 nm keladigan nozik tonofilamentlardan iborat tonofibrillar epiteley hujayrasining mustahkamligini belgilaydi.



4.3-rasm. Muskul hujayrasi maxsus organoidi miofibrillalar. Odam va hayvon organizmini harakatga keltiruvchi vosita muskul to'qima bo'lib, faqat unga xos bo'lgan maxsus organoid miofibrillalar dir



4.3-rasm. Nerv hujayrasi maxsus organoidi neyrofibrillar. 1-hujayra tanasi; a-neuroplazma; b-neurofibril; 2-yadro; 3-hujayra o'simtalari

Nerv hujayrasi sitoplazmasida nozik iplar bo'lib, ular tashqi muhit ta'siridan ta'sirlanib, impulslarni markazga va javobni efferent organlarga olib keluvchi neyrofibrillar hisoblanadi.


MIKRONAYCHA LAR

Mikronaychalar uzunligi 2,5 mkm, diametri 20-30 nm ga teng shoxlanmagan ichi bo'sh naychalar bo'lib, asosan, oqsillardan tarkib topgan xivchinlar hamda kiprikchalardan iborat. Sitoplazmada joylashgan sentriola hamda bazal tanachalar ham shu mikronaychalardan tashkil topgan. Ular, odatda, tayanch hamda shaklni belgilash vazifasini bajaradi. Aksariyat hayvonlar hujayrasidan olingan mikronaychalarning kimyoviy tuzilishi deyarli bir xil bo'lib, asosan, o'ziga xos tubulin oqsildan tarkib topgan.

HUJAYRA KIRITMALARI


Kiritmalar sitoplazmaning doimiy bo'lmagan qismidir. Bu mahsulotlar modda almashinuvi, sekretiya va pigment hosil qilish jarayonlari davomida hamda fagositoz natijasida hujayraga moddalar kirishidan tarkib topadi. Kiritmalar mikroskopda har xil zichlikdagi - granulalar yoki suyuq vakuolalar holida ko'rinadi. Kiritmalarning kimyoviy tarkibi turlicha. Bir necha guruhli kiritmalar farqlanadi.

1. Trofik kiritmalar (yog' tomchilari, oqsil granulalari, glikogen to'plamlari, vitaminlar va boshqalar).
2. Sekretor kiritmalar (zimogon granulalar va boshqalar)
3. Ekskretor kiritmalar (o't kislotasi, siydik va boshqalar)
4. Pigment kiritmalar (gemoglobin, melanin, lipofussin va boshqalar).



4.3-rasm Jigar hujayrasida yog' tomchilari.

*1-jigar hujayrasi; a-yog' tomchisi;
b-yadro; 2-eritrotsitli kapillyar*



4.4- Pigment kiritmasi. 1-pigmentli

hujayra yadrosi;

2-pigment donachalari

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: suv o'ti, igna, buyum va qoplag'ich oyna, ustara, plakatlari, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Kiprikchalar va mikrotukchalarni bir biridan farqlan. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda kuzating. 3. Biror bir suv o'tlaridan vaqtinchalik preparat tayyorlang 4. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Tavsifi	Mikronaychalar	Mikrofibrillalar	Mikrofilamentlar
Diametri (nm)			
Kimyoviy tarkibi			
Vazifalari			

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Hujayraning membranasi organoidlariga nima kiradi?
2. Mikrofilamentlar, mikrofibrillar, mikronaychalarga umumiy tavsif bering.
3. Bazal tanachalar kiprikcha va xivchinlarning tuzilishi va hosil bo'lishi haqida gapiring

KEYSLAR BANKI

KEYS-4

MAVZU: HUYAYRANING TASHQI APPARATI.

Hujayralarning tashqi apparatiga membranalar, sentriola, kiprikchalar, mikronaychalar, mikrofilamentlar, mikrofibrillar, bazal tanachalar, xivchinlarni kiritishimiz mumkin. Ular hujayrada muhim ahamiyatga ega bo'lib, turli hil funksiyalarni bajaradi. Jumladan Sentriolalar ham.

Topshiriq-1. Hujayraning qaysi tayanch – xarakat tizimini temir yo'llarining relslariga o'xshatish mumkin, Ular poyezdni yurgizmaydi lekin ularsiz poyezd yurmaydi?

5-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: MITOXONDRIA MEMBRANASINING TUZILISHINI HAYVON HUYAYRALARI MISOLIDA O'RGANISH

Asosiy maqsad: Hujayra membranasi tuzilishi to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lish

Vazifalar: Mitoxondria membranasi tuzilishini boshqa hujayra organoidlar membranasi tuzilishi bilan farqlash

Nazariy tushuncha: Mitoxondria hayvonlar va ayrim o'simliklar hujayrasida uchraydigan organella bo'lib, diametri 0,2-1 mkm ga teng. Shakli har xil: yumaloq, ovalsimon, tayoqchasimon va ipsimon bo'adi. Mitoxondriyalarning soni har xil hujayralarda turlicha: 1 donadan 100 ming donagacha bo'lishi mumkin. Masalan, sutemizuvchilar jigarning bitta hujayrasida 2500 ta mitoxondria bo'adi. Ularning vazifasi o'zgarishi bilan soni ham o'zgaradi, ya'ni hujayraning vazifasi oshganda mitoxondriyalarning soni ham ortadi. Bunda faqat soni o'zgarmay, balki shakli ham o'zgaradi.


Mitoxondriyaning nozik tuzilishini elektron mikroskopda yaxshi ko'rish mumkin. Obyektiv kattalashtirib ko'rilganda esa uning devori ikki qavatdan iborat ekanligi yaqqol ko'rinadi. Uning tashqi qavatini tekis, ichki qavatidan bo'shliq tomon o'simtalar

o'sib chiqqan boiadi. Bu o'simtalarga kriptalar deyiladi. Ularning soni ham har xil boiadi. Bo'shliq qismida yarim suyuq holdagi modda boiib, unga matriks deyiladi. Matriks takibida DNK, maxsus RNK va ribosomalar boiadi.

Ichki membranasi asosan oqsillardan (70%), fosfolipidlardan (20%) va boshqa moddalardan tashkil topgan. Tashqi membranasi 15% oqsil va 85% fosfolipidlardan iborat. Mitoxondriyalarning asosiy vazifasi energiya hosil qilishdan iborat. Masalan, hujayralardagi energiyaning 95% ini mitoxondriyalar hosil qiladi. Bu ularda uglevodlar, aminokislotalar, yog'larning oksidlanishi hisobiga ro'y beradi. Oksidlanish bilan kechadigan fosforlanish jarayonida makroenergiyaning asosiy manbai - ATF sintezlanadi. ATF sintezi mitoxondriyalarning asosiy vazifasiga kiradi. Mitoxondriyalarda ATFdan tashqari, oqsillar ham sintezlanadi.



5.1-rasm Mitoxondriyani mikroskopda ko'rinishi



5.2-rasm Mitoxondriya tuzilishi (sxema). a-uzunasiga kesim; b-mitoxondriyaning ichki tuzilishi; d-mitoxondriya kristlari

Mitoxondriya hujayra nafas olishi kechadigan asosiy tuzilma bolib, oksidlanish-fosforlanish natijasida ATF hosil bo'ladi. Shuning uchun ham mitoxondriya hujayraning energetik markazi deyiladi.

Zaruriy ashyolar: hayvon jigari, ustara, mikroskop, buyum va qoplag'ich oyna, rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: mitoxondriyaning rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar


Ishni bajarilishi: 1. Mitoxondriya membranasini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda mitoxondriya tuzilishini kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Jigar hujayrasini mikroskop ostida kuzatamiz,ozgina kattalashtirib ko'rilganda hujayralari bir biriga yopishgan holatda aylana yoki noto'g'ri ko'rinishga ega bo'ladi.Ularning atrofida qon tomirlari joylashgan.Hujayra chegaralari aniq ko'rinadigan bir bo'lagini tanlab olamiz va mikroskop obektivining katta o'lchamida,jigar hujayraralarini kuzatamiz. Jigar hujayraralari chegaralari sitoplazmatik membrana bilan qoplangan.Sitoplazma eozin bilan bo'yalganda pushti rang hosil bo'ladi.Donachali tuzilishga ega bo'lgan vakuolalarni ham ko'ramiz.

Hujayra yadrolari sharsimon yoki elipsimon shakilda jigar hujayralari qon tomirlari atrofida joylashgan.Ularning devorlari yassi qatlam bilan o'ralgan.

Qon tomirlari oralig'ida qonning shakilli elementlaridan eritrotsitlarni uchratish mumkin.Bazan esa qon tomirlar atrofida leykotsitlar joylashadi. Inversion obektivli

mikroskopda kuzatganimizda yadro sitoplazmadan membrana bilan ajralib turadi. Karioplazmada xar xil kattalikdagi xromatin parchalari joylashgan. Ular spiralsimon xromasoma bo'lakchalaridir va jigar hujayralarida yadrochalarni ham ko'rish mumkin. Ular yadroda joylashgan bo'lib, eozin bilan pushti ranga bo'yaladi.



Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Hujayraning ikki membranali organoidlariga nima kiradi?
2. Mitoxondriyada ATF sintezining borishi.
3. Nima uchun mitoxondriyalar hujayraning yarim avtonom strukturalari deb ataladi?
4. Oksiosoma nima?
5. Mitoxondriyalarning hosil bo'lish nazariyalarini tushuntiring?
6. Nima uchun mitoxondriyaning avtonomligi nisbiy hisoblanadi?

6-AMALIY MASHG'ULOT

MODUL: PLASTIDA HILLARI.

MAVZU: O'SIMLIK LARDAN PLASTIDALARNI AJRATIB OLIH.

Asosiy maqsad: Plastida hillarini o'rganish

Vazifalar: Plastida hillarini ahamiyatini aniqlash. Nima sababdan bargning rangi yashil ekanligini ilmiy jihatdan izohlash

Nazariy tushuncha: Hamma o'simlik hujayralari sitoplazmasida plastidalar bo'ladi. Bu organoidlar o'simlik hujayralarida mavjud, hayvon hujayralarida

uchramaydi. Plastidalarning uchta asosiy turi bor: 1) yashil-xloroplastlar; 2) qizil, zarg'aldoq va sariq-xromoplastlar; 3) rangsiz leykositlar.

Xloroplastlar — bu eng ko'p tarqalgan plastidalar bo'lib, tirik tabiatda ular ayniqsa, muhim o'rin tutadi. Xloroplastlarga xos yashil rang ularda maxsus yashil pigment — xlorofill borligiga bog'liq. Xloroplastlar barg hujayralarida va o'simlikning boshqa yashil organlarida bo'ladi. Yashil o'simliklar xlorofilli bo'lgani uchun Quyoshning yorug'lik energiyasidan foydalana oladi va uning hisobiga anorganik moddalardan organik moddalar sintezlay oladi. Anorganik moddalardan organik moddalar, ya'ni uglevodlar hosil bo'lish jarayoni foto- sintez deb ataladi.


Xloroplastlar ko'pincha oval shaklli 4-6mkm o'lchamli bo'ladi. Yuksak o'simliklarning bitta hujayrasida odatda 40- 60 xloroplast uchraydi.

Mitoxondriyaning tashqi va ichki membranalar ham hujayraning tashqi membranasini kabi uch qavatdan tuzilgan. Xloroplast ichini yarim suyuq modda todirib turadi, unda faqat xloroplastlarga xos alohida tuzilmalar — qirralar joylashadi.

Qirralar silindrsimon shaklda bo'lib membranalaridan tuzilgan, bir-birining ustiga joylashgan yassi xaltachalardan iborat. Bu yassi xaltachalar ustma-ust taxlangan tangalar ustuniga o'xshab ketadi; bitta qirra tarkibida 50 tagacha bunday xaltachalar bo'lishi mumkin. Qirralarning ko'ndalangiga qirqimi yumaloq ko'rinadi. Bitta xloroplastda bir necha o'n qirra bo'ladi. Xloroplastlarning hamma qirralari membranalar bilan o'zaro birlashgan.

Gultojibarglar turli-tuman va mevalar kuzgi barglarning har xil sariq, zarg'aldoq va qizil rangda bo'lishi xloroplastlarga bog'liq.

Leykoplastlar rangsizdir. Ular o'simliklarning rangsiz qismlari sitoplazmasida, masalan, poyalarda, ildiz va tugunaklarda ko'zga tashlanadi. Leykoplastlarning shakli har xil. Ko'pincha bular yumaloq yoki 5-6 mkm uzunlikdagi tayoqcha shakliga ega. Keng tarqalgan leykoplastlarga kraxmal donalari to'planadigan kartoshka tugunagi misol bo'la oladi. Xloroplastlar, xromoplastlar va leykositlar o'zaro bir-biriga aylanishi mumkin.



6.1-Xloroplastning anatomic tuzilishi. a-kesmasi; b-tuzilish chizmasi; d-tilakoid membranasi tuzilishi

Fotosintez anorganik moddalar quyosh energiyasidan foydalanadigan organik moddalar sintezi bo'lib, bu jarayon plastidalarda kechadi.

Yorug'lik fazasi. Buning natijasida yorug'lik energiyasini suv fotolizi ximik energiyasiga aylantiradi. Buning natijasida ATF va NADF.N hosil boiadi. Bu jarayon tilakoidlarda kechadi.

Qorong'ulik fazasi: bu jarayon stromalarda kechadi.Qator reaksiyalar natijasida organik moddalar sintezlanadi va bu jarayon ATF va NADF.N borligi uchun yuzaga keladi. Hosil boigan glyukoza sitoplazmaga tushadi yoki polimer holatda saqlanadi.



6.2-Plastidaning anatomic tuzilishi

Zaruriy ashyolar: Biror o'simlikning quruq yoki xo'l barglari, etil spirti,benzin, kaltsiy korbanat, chinni xovoncha,filtr qog'oz,voronka ,qaychi ,shisha tayoqcha,shtativ va probirkalar rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Prokariot va eukariot hujayrasining rasmi, plakatlari, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Plastida hillarini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda plastid organoidlarini kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Pigment eritmasini tayyorlash uchun o'simlikning quruq yoki xo'l barglari olinadi.Agar barg quruq bo'lsa u ezilib kolbadagi spirtga solinib qo'yiladi,bu pigment ajralishi jarayonini tezlashtiradi.So'ngra pigmentlarni spirtidagi to'q yashil eritmasi filtrlanib olinadi. Xo'l o'simlik barglaridan pigment ajratib olish uchun 4-5gr barg qaychida mayda qilib qirg'iladi.Bunda yirik tomirlar va barg bandi olib tashlanadi. So'ngra chinni xovonchaga solinib barg yaxshi ezilishi uchun kvartsiya qumi solinadi.

Hujayra shirasi kislotasini neytrallash uchun kaltsiy karbonat qo'shib eziladi. Bargni ezishdan oldin oz ozdan etil spirti quyib turiladi.So'ngra bu ezilgan massa toza probirkaga filtrlanib olinadi. Chinni xovonchada eritma oqib ketmasligi uchun xovoncha chetiga vazelin surtiladi. Olingan yashil filtrdan xlorofil a, b, karotin va ksantofin pigmentlari mavjud.Pigmentlarni ajratib olish uchun quyidagi usullardan foydalanamiz.

1. **Kraus usuli.** Pigmentlarni ajratishda ularni spirt va benzindan turlicha erish xossasida foydalanamiz.Buning uchun probirkaga pigmentning spirtidagi eritmasidan 4 ml quyib, ustiga 6 ml benzin qo'shiladi. Probirkaning og'zi probka bilan yopilib yaxshilab chayqatiladi va tinish uchun shtativda bir necha minut qoldiriladi. Probirkaning benzin qavatida yashil rangli xlorofil a va b va probirkaning pastki spirtli qavatida sariq rangli ksantofil pigmentlarini ko'ramiz. Agar pigmentlarni ajratish yaxshi

bo'lmasa 3, 4 tomchi suv tomizilib chayqatiladi. Agar suvning miqdori oshib ketsa spirt qismi loyqalanib qoladi.

2. **Xromotogramma usuli.** Rus fiziologi Sved tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu usul pigmentlarni xromotogramma usulida ajratish, pigmentlar aralashmasini atsorbetga yani shimuvchi qog'ozga o'tkazishga asoslangan. Xar xil pigmentlar bir xil erituvchida erish darajasi xar xil bo'lib, ularni bitta atsarbetta shimilish darajasi ham xar xildir. Erituvchidagi pigmentlar erish xususiyati qancha yuqori bo'lsa u atsorbet tomonidan sekin shimiladi. Bunda pigmentlar harakati tez bo'lib atsarbetlar yuzasida yuqori joylashadi. Bunung uchun uzunligi 20 sm eni esa 1 sm filtr qog'oz olinib, bir uchi eritmaga botiriladi. Filtr qog'ozdan yashil pigmentlar, ularning ustida sariq eng yuqorigi qavatda rangsiz pigmentlar joylashadi.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Plastidalar-ularni strukturalari va turlari
2. Plastidalarining vazifalari va biologic ahamiyati haqida gapiring
3. Prokariot hujayralarning fotosintezlovchi tuzilmalari qanday tuzilgan?
4. Nima uchun plastidalar hujayraning yarim avtonom strukturalari deb ataladi?
5. Plastida va mitoxondriyalar kelib chiqishi haqidagi endosimbioz nazariya haqida gapiring.

7-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: ENDOPLAZMATIK RETIKULUMNING ORGANOIDLAR O'RTASIDAGI MODDALAR HARAKATINI TA'MINLASH A'LOQASINI O'RGANISH

Asosiy maqsad: Endoplazmatik to'ring ahamiyatini bilish

Vazifalar: Moddalar harakatini ta'minlash a'loqasini o'rganish

Nazariy tushuncha: Endoplazmatik to'r. Endoplazmatik to'r hamma hayvon va o'simliklar hamda barcha bir hujayrali organizmlar sitoplazma- sida aniqlangan, ya'ni u har bir hujayraning zaruriy organoididir. Hujayraning bu organoidi juda kichik o'lchamli bo'lgani uchun endoplazmatik to'r hujayralarni elektron mikroskopik tekshirila boshlangandan keyin, bundan 50 yilcha oldin kashf etilgan edi.

Tuzilishi. Endoplazmatik to'r kattaligi 500 A gacha boradigan va undan ham oshadigan kanal va bo'shliqlardan iborat murakkab tizimga ega. Kanal va bo'shliqlar bir-biri bilan qo'shilib, tarmoqlanuvchi murakkab to'r hosil qiladi. Endoplazmatik to'r kanal va bo'shliqlari sitoplazmadan membranalar bilan chegaralangan. Membrana qalinligi 75 A ga yaqin.

Funksiyalari. Endoplazmatik to'r ko'pgina turli-tuman funksiyalarni bajaradi. Donador endoplazmatik to'ring asosiy vazifasi oqsil sintezida qatnashishdir. Shuning uchun u oqsil ko'p sintezlanadigan hujayralar (turli bez hujayralari)da, ayniqsa, kuchli

rivojlangan, kam miqdor oqsil sintezlanadigan hujayralar (limfatik tugunlar, qora jigar va boshqalar hujayralari)da kam rivojlangan.


Silliqlik endoplazmatik to'ra membranalarida yog'lar va polisaxaridlar sintezlanadi. Bu sintez mahsulotlari kanal va bo'shliqlarda yig'iladi, so'ngra hujayraning turli organoidlariga yetib boradi va shu yerda iste'mol qilinadi yoki sitoplazmada hujayra kiritmalari sifatida to'planadi.

Binobarin, endoplazmatik to'ra — hujayra organoidi bo'lib, u oqsillar, uglevodlar va yogiar sintezida faol ishtirok etadi, shuningdek, bu moddalarni hujayraning turli burchaklariga tashiydi.

Sitoplazmatik to'ra murakkab tuzilishini faqat elektron mikroskopda o'rganish mumkin. Hujayraning fiziologik holatiga bog'liq ravishda sitoplazmatik to'ra elementlari to'q va och rangda bo'lishi mumkin.

Endoplazmatik to'ra hujayra organoidi sifatida faqat oqsil, lipid va uglevodlarni sintez qilishda ishtirok etmasdan, balki hujayrada sodir bo'ladigan harakatlarni ham ta'minlaydi.

O'rni kelganda shuni ham aytish kerakki, sitoplazmatik to'ra juda ta'sirchan va o'zgaruvchan organella bo'lib, har xil ta'sir natijasida vakuolalari shishib, naychalari parchalanib ketishi mumkin. Ularning bunday tuzilmali o'zgarishlari ayrim kasalliklarda aniq-ravshan kuzatiladi va ularga tashxis qo'yishda juda qol keladi.



*Transport
Kondensatsiya
Konsentratsiya*

Endoplazmatik to'ra oqsil yig'ilishi va transporti

Polisomalarda sintezlangan, membrana bilan bog'langan mahsulotlar to'g'ri endoplazmatik to'ra bo'shlig'iga tushadi va shu yerda murakkab bo'lgan oqsillar kompleksini hosil qiladi. Oqsillar fiziologik nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega fermentlar, antitelalar va hk

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Endoplazmatik to'ra rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Endoplazmatik turlarini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda endoplazmatik to'ra kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Silliqlik endoplazmatik to'rt tuzilishi va vazifasi?
2. Donador EPT tuzilishi va vazifasi. Ergastoplazma?
3. EPT ning yadro membranasi va hujayraning boshqa komponentlari bilan bog'lanishi?


8-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: LIZOSOMALARNING HUJAYRADAGI HAZM QILISH JARAYONINI O'RGANISH.


Asosiy maqsad: Lizosomalarning hujayradagi ahamiyatini o'rganish

Vazifalar: Hazm qilish jarayonidagi ahamiyatini bilish.

Nazariy tushuncha: Lizosomalar organellalar qatoriga kiradi. Ularning vazifasi hujayralarda ovqat hazm qilish hamda fagositoz jarayonlarida ishtirok etishdan iborat. Sitoplazmadagi lizosomalarning atrofl bir konturli membrana bilan o'ralgan, diametri 0,2 - 0,8 mkm keladigan yumaloq shaklga ega. Matriks bilan membrana tarkibida 20 dan ortiq gidrolitik fermentlar (kislotali fosfataza, nukleazalar, katepsin, kollogenez, glyukozidaza va boshqalar)



8.1- rasm Fagositoz hodisasi



8.2-rasm. Lizosomaning anatomik tuzilishi

Ularning qobig'i buzilganda fermentlari sitoplazmaga chiqib ketadi. Lizosomalar amfibiyalar, qushlar, sutemizuvchilar va boshqa hayvonlar hamda odamda topilgan. Ayniqsa, ular fagositoz qilish xususiyatiga ega bo'lgani hujayralarda yaxshi ko'rinadi. Hujayralardagi ikki xil - birlamchi va ikkilamchi lizosomalar Golji apparati atrofida joylashgan bo'lib, ular tarkibidagi fermentlar sust faoliyat kechiradi. Plazmatik membradan hosil bo'lgan endositoz pufakchalar (fagosomalar)ning birlamchi lizosomalar bilan birikishi natijasida ularning fermentlik faoliyati kuchayadi va ikkilamchi lizosomalar, ya'ni hazm vakuolalari hosil bo'ladi. Oziqa moddalarini hazm bo'lishi jadallashadi.

Lizosomalar litik funktsiya bajaruvchi, ichki membranalardan tuzilgan organoidlar. Ekzogen moddalarni hazm qilishda - avtofagiya ishtirok etadi.

Lizosomalarda gidrolaza miqdori juda ko'p bo'lib, ular er-kin holga o'tsa butun hujayrani buzadi va shuning uchun «o'z-o'zini o'ldiruvchi» organoidlar deyiladi.

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: lizosomalarning rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Lizosomalarda fagositoz hodisasini kuzating 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda lizosomalar tuzilishini kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.


9-AMALIY MASHG`ULOT

MAVZU: VAKUOLA SHIRASINING KIMYOVIY TARKIBINI O`RGANISH

Asosiy maqsad: Vakuolaning hujayradagi ahamiyati

Vazifalar: Hujayraning kimyoviy tarkibi va vakuolaning kimyoviy tarkibini solishtirish

Nazariy tushuncha: Vakuolalar ichi suyuqlik bilan to'lgan membranali haltacha. Hujayra shirasida doimo bo'ladigan moddalar qatoriga qandlar, ulardan saxaroza hamda glyukoza va fruktoza kiradi. Yetilayotgan urug'larning hujayralaridagi vakuolada kolloid eritma holida oqsil to'planganligi tufayli ular oqsilli vakuola deb ham aytiladi. Urug' quriyorganda yetilishini ohirida vakuoladan suv chiqib ketishi bilan oqsil konsentrasiyasi ortadi bu esa uni kristal holiga o'tishiga olib keladi. Bunday vakuolalarni aleyron donalari deyiladi.



9.1, 2 -Rasm. Hujayraning umumiy ko'rinishi

	O'simlik vakuolasi	Hayvon vakuolasi
Tuzilishi		
Kimyoviy tarkibi		
Bajaradigan vunksiyasi		

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Vakuolaning rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Vakuolalarning hosil bo'lish jarayonini o'rganing 2. Vakuolaning kimyoviy tarkibini o'rganing 3. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda

mikroskopda vakuolalar tuzilishini kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Vakuolaning hujayra hayotidagi ahamiyati?
2. Qanday tipdagi vakuolalarni bilasiz?
3. Qanday vazifalarni bajaradi?
4. Vakuola qanday hosil bo'ladi?
5. Vakuolaning osmos va turgordagi ahamiyatini tushuntiring

10-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: ENDOPLAZMATIK TO'R, PEROKSISOMA, SFEROSOMALAR. GOLJI APPARATI. LIZOSOMALAR.

Asosiy maqsad: Hujayraning vakular tuzilishi to'g'risidagi tushunchaga ega bo'lish

Vazifalar: Endoplazmatik to'r, Peroxisoma, Sferosomalar. Golji apparati. Lizosomalar hujayra hayotidagi ahamiyati



Nazariy tushuncha: Golji apparati. Golji apparati — hujayra orgonoidi, italyan olimi K. Golji nomi bilan atalgan, uni nerv hujayralarining sitoplazmasida birinchi marta K. Golji ko'rgan (1898) va to'r apparat deb atagan. Hozirgi vaqtda bu orgonoid barcha o'simlik va hayvon organizmlarining hujayralarida topilgan. Golji apparatining shakli va kattaligi turli-tuman.

Tuzilishi. Aksari hujayralarda, masalan, nerv hujayralarida bu organoid yadro atrofidagi murakkab to'r shaklida bo'ladi. O'simliklarning va eng sodda organizmlarning hujayralaridagi Golji apparati o'roq yoki tayoqcha shaklidagi ayrim tanachalardan iborat. O'simlik va hayvon organizmlarining hujayralaridagi Golji apparatining shakli har xil boisa ham elektron mikroskopik tuzilishi bir xil. Golji apparatiga uchta asosiy tuzilma komponenti: 1) guruh-guruh bo'lib (5-8 tadan) joylashgan yirik bo'shliqlar; 2) bo'shliqlardan boshlangan naychalarning murakkab tizimi; 3) naychalar uchlarida joylashgan yirik va mayda pufakchalar kiradi.

Bu elementlarning hammasi yagona to'plamani tashkil etadi va hujayraning tashqi membranalari bilan chegaralangan boiadi.

Funksiyalari. Golji apparati bir talay muhim biologik funksiyalarni bajaradi. Hujayrada sintezlanadigan mahsulotlar- oqsillar, uglevodlar va yog'lar, endoplazmatik to'r kanallari orqali Golji apparatiga tashib beriladi.

Ana shu hamma moddalar dastlab Golji apparati elementlarida to'planadi, so'ngra naychalar uchida joylashgan yirik va mayda pufakchalarga aylanadi. Pufakchalar naychalardan ajralib, tarkibidagi moddalar hujayra hayot faoliyati jarayonida foydalaniladi yoki tashqariga chiqariladi.



Golji apparati funksiyasi: Golji apparati, sekretor jarayonlarda ishtirok etadi. Polisaxaridlar polimerizatsiyasi va ularni oqsilli to'plamni Golji apparatida sodir bo'ladi. Bulardan tashqari biologik faol moddalar ham shu apparatda yig'iladi. (Lipopratsidlar, fermentlar, gormonlar).

PEROKSISOMA.

Eukariot hujayraning universal organoidi. Lizosomalar Kabi K.De Dyuv tomonidan topilgan. Bir qavat membrana bilan o'ralgan bo'lib, membranalari suyuq mozaika tuzilishga ega. Ichida nukleodi bo'ladi(yadroga aloqasi yo'q) U fibrill va mikronaychalardan iborat bo'lib urat oksidaza fermentiga ega lizosomalardan farq qilib faqat mavjud peroksisomaning bo'linishi orqali ko'payadi. SHuning uchun o'z peroksisomalarini yo'qotgan hujayra ularni qayta tiklay olmaydi.

Xayvon va odamda jigar va buyrak hujayralarida uchraydi. Soni 70-100ta. Endoplazmatik to'r membranalari bilan aloqada bo'lib taxmin qilinishichi endoplazmatik to'rning kengaygan sisternalaridan kelib chiqadi. O'simliklarda peroksisomalar mitoxondriya va plastidalar bilan bog'liqdir.


Peroksisomalarning biokimyoviy vazifasi ulardagi oksidlanish reaksiyalarining fermentlari (katalaza) bo'lishi bilan bog'liq bo'lib moddalarning parchalanishi natijasida xosil bo'lgan vodorod peroksidini (H_2O_2) suv va kislorodgacha parchalaydi. Vodorod peroksidi hujayrada boradigan reaksiyalar natijasida xosil bo'lib juda toksik, zararlidir va hujayradar chiqarilishi kerak. Bu vazifani peroksisomalar tarkibidagi katalaza fermenti bajarib uni suv va kislorodga parchalaydi.

Umumhujayraviy vazifasi hujayraga oziq moddalar tarkibi bilan kiradigan uzun zanjirli yog' kislotalarini parchalashdan iborat. Jigar hujayralari peroksisomalarga boy bo'lib organizm tushayotgan etil spirtining 50% bu erda atsetildegid va sirka kislotasigacha parchalaydi. Alkogolni(arabcha- al-kuhl-ingichka kukun) uzoq muddat va katta dozalarda iste'mol qilish jigar hujayralari tarkibida sirka kislotasi miqdorining ko'payishiga va undan yog' kislotalari sintezlanishiga olib keladi. Natijada lipidlar miqdori ko'payib sirroz(grekcha-sariq) kasali rivojlanadi.

O'simliklarda uchraydigan peroksisomalar 3 guruxni tashkil qiladi:


1. Glioksisomalar yog'larga boy urug'larda lipidlarning saxarozaga parchalanishida ishtirok etadi.
2. Barglar peroksisomalari mitoxondriya va plastidalar bilan bog'liq bo'lib nafas olishda ishtirok etadi.

3. Boshqa turdagi to'qimalarda uchraydigan differensiatsiyalanmagan peroksisomalar.



10.3-rasm. Peroksisomaning anatomik tuzilishi
SFEROSOMA

O'simlik hujayralarida uchraydigan membranali pufakchalar. Endopalazmatik to'ra elementlaridan xosil bo'ladi. Endopalazmatik to'ra sisternalari uchlarida osmiofil material to'planib, mayda pufakcha yuzaga kelib endopalazmatik to'rdan ajrala boshlaydi. Bu 100-150 nm kattalikdagi 1 qavat membrana bilan o'ralgan prosferosoma. Sferosomaning o'sishi ularda yog'larning to'planishi bilan bog'liq bo'lib sekinlik bilan u katta yog' tomchisiga aylanadi. Yog'lardan tashqari sferosomalar tarkibida turli oqsillar, jumladan lipaza fermenti topilgan.





Gambar 8 . Rangka sel atau sitoskeleton.

10.4- Hujayra sitoskleti

LIZOSOMALAR

Lizosomalarni 1955 yilda belgiyalik bioximik (sitolog) De Dyuv tomonidan (sichqon) topilgan. (Nobel). Lizosomalarni gidrolitik fermentlarga ega ekanligini payqadi. Kalamush jigaridan olingan fraksiyalarni o'rganish mobaynida olim ularning ba'zilar turli moddalarni parchalash xususiyatiga ega bo'lgan gidrolitik fermentlarga ega ekanligini payqaydi. Bu fermentlar maxsus sitoplazmatik tanachalar LIZOSOMALAR ekanligi va ularning fermentlari faqatgina lizosoma membranasini shikastlanganda, shok holatlari yuzaga kelganda yoki lizosomalarining o'zi boshqa bir vakuola bilan qo'shilganda faollashadi.



10.6-Lizosomaning hazm jarayonidagi ishtiroki

Eukariot hujayra tuzilmasi jadvalini to'ldiring

	Endoplazmatik to'r	Peroksisoma	Sferasoma	Goldji apparati	Lizosoma
Membranasining tuzilishi					
Kimyoviy tarkibi					
Bajarilgan funksiyasi					

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Hujayra organoidlarining rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Organoidlarni farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda hujayra organoidlarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftariga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Qaysi olim EPT ning tuzilmasi va vazifalarini o'rgangani uchun Nobel mukofatiga sazovor bo'ldi?
2. EPT dagi garmo sintezi va kalsiy deposini tushuntiring
3. Golji apparatining lipidlar transportidagi vazifasini tushuntiring.
4. Nima sababdan GA ti oqsil, lipid, vapolisaxaridlar sintezlanmaydigan hujayralarda ham uchraydi?
5. Lizosomal harakati qanday amalga oshadi?
6. Lizosomalarning hujayra ichi maxsulotlari o'zgarishidagi ishtirokini tushuntiring
7. Peroksisomalar guruhi? (o'simliklarda)
8. Sferasomaning kimyoviy tarkibi?

11-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: SEKRET MODDALARNING HUYAYRADAN AJRALISHINI O'RGANISH

Asosiy maqsad: Moddalarni hujayradan ajralishini o'rganish

Vazifalar: Moddalarni ajralish turlarini farqlang

Nazariy tushuncha:Maxsus ajratmalar ajratuvchi tuzilmalar asosan ikki xil tipda tashqi va ichki bo'ladi. Tashqi sekretor tuzilmalarga temirsimon tukchalar (trixonalar), bezchalar (tuzli, hasharotxo'r o'simliklar), nektarchilar, osmoforlar, ya'ni gulning har xil qismlarida joylashgan va ularga turli xushbo'y hidlarni beruvchi bezchalar, va gidatodlar misol bo'ladi. Ichki sekretor tuzilmalarga kiruvchi-idioblastlar g'aroyib hujayralar bo'lib, ayrim moddalarning yig'ilishiga xizmat qiladi va boshqa hujayralardan o'zlarining o'lchamlari va k o'rinishi bilan farq qiladi. Oqsilli shira ajratuvchi hujayralarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu ularda ajraluvchi oqsillarni sintezlovchi donador ER va ko'plab mitoxondriyalarning bo'lishligidir. Shuningdek, ushbu hujayralarda GA faol holda bo'lishi ham oqsillarning qandlashishiga va glikoproteinlar hosil bo'lishiga olib keladi. Nektar ko'p komponentli mahsulotdir. Ammo uning asosini bir muncha o'zgargan floema shirasi tashkil qiladi. Ammo floema shirasida saxaroza ko'p bo'lsa, nektar tarkibida odatda glukoza, fruktoza va saxaroza ko'p bo'ladi. Shuningdek, kichik miqdorda bo'lsa ham nektar tarkibida K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , pol kabi ionlar, ikki va uch karbon organik kislotalar, vitaminlar (askorbat, nikotinat kislotalari va boshq.), oqsillar, ayrim hollarda lipidlar ham uchraydi.

Polisaxaridlarning ajralishi. O'simliklarda polisaxarid shirasini ajratuvchi maxsus tuzilmalar ham mavjud. Shira hujayra devori va plazmolemma o'rtasidagi idioblastlarda hosil bo'ladi. Ildiz tukchalari qinchalari hujayralarida shira avvalo hujayra devori va plazmolemma orasida yig'iladi va so'ngra hujayra devorini teshib tashqariga chiqadi. Goldji apparatining har bir vezikulasida 30 soniyada polisaxarid ajralib turadi. Hujayralarning sekretorlik faolligi esa davriy ravishda har bir uch soatda ro'y berib turadi. Shirapolisaxarid ajralishi davrida hujayraning o'zi vakuolaga aylana 300 boshlaydi va oxir-oqibatda o'zlari ham shiraga aylanadi, ya'ni golokrin sekretsiyasi ro'y beradi. **Oqsillarning ajralishi.** O'simliklarning oqsilli ajratmalaridan nisbatan keng ma'lum bo'lgani bu hasharotxo'r o'simliklarning umurtqasiz hayvonlarni oziq sifatida ajratgan hazm suyuqligidir. Ammo oqsilli ajratmalar boshqa o'simliklar barglaridan ham ajralishi mumkin. Masalan, terak va tol o'simliklari barglaridan ajraluvchi shiralarning tarkibi ontogenez davomida terpenoidlardan glikoproteinlarga o'zgarishi mumkin (X.3-rasm). Shuningdek, oqsilli shira ajratuvchilarga boshqodoshlar aleyron qavati hujayralaridan ajraluvchi shirani ham misol qilish mumkin. **Tuzlarning ajralishi.** O'simliklarda mineral moddalarni ajralishida uchta guruh sekretor hujayralar qatnashadi. 1. Galotit. o'simliklarning barglari va poyalaridan tuz ajralishini ta'minlovchi bezchalar. Ushbu bezchalar 'gillofit' o'simliklarning miqdori yuqori bo'lgan sharoitda o'sishi va rivojlanishi davomida olgan tuzlarning ajralishini ta'minlaydi va tuzlar bilan birgalikda ko'p miqdorda suvning ham yo'qolishiga olib keladi. Tuzlar barg va poyalarning yuzasidagi kutikulalarda yig'ilishi yoki yomg'ir suvlari bilan yuvilib ketishi mumkin. 2. O'simliklarning barglaridagi ikki qismdan, ya'ni boshcha va oyoqchadan iborat, ikkita hujayradan tashkil topgan tuz ajratuvchi tukchalar. Boshcha hujayrasi vakuolasida ko'p miqdorda tuz to'planganidan so'ng u oyoqchadan uziladi (apokrin sekretyasi) va o'simlik shu yo'l bilan ortiqcha tuzdan qutiladi. O'simlik vegetatsiyasi davrida uning o'rnida bir necha marotaba yangi boshcha hosil bo'lib uzilib turadi. Tuzli tukchalar bilan juda kam miqdorda suv yo'qotiladi va u shorlangan tuproqlarda o'suvchi o'simliklar orasida keng tarqalgandir. 3. Hasharotxo'r

o'simliklarning ionlar, suv va gidrolitik fermentlar ajratuvchi bezchalari. Tuz ajratuvchi sistemalarning o'simlikning boshqa o'tkazuvchan tizimi bilan bevosita aloqasi yo'q. Bezchalardagi va tukchalardagi ionlar simplast bo'yicha tashiladi. Chunki, ushbu hujayralarning yon devorlari suberin va lignin bilan to'yingan bo'ladi. Tuzlarning chiqarilishi membrananing tashuvchi pompalari yoki vezikulalarning ishi tufayli ro'y beradi. Masalan, limonium o'simligining tuz bezchalarining tashqi hujayralarining plazmalemmasida xlor ionlarini tashqariga yo'naltiruvchi elektrojen nasoslari mavjud. Xlor bilan birgalikda esa natriy ionlarining ham passiv tashiluvchi ro'y beradi

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: hashorotho'r o'simliklar, mayda hashorotlar, rasmi, plakatlari

Ishni bajarilishi: 1. Sekret moddalarni ajralishini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda hujayra organoidlarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

12-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: IKKI MEMBRANALI YARIM AVTONOM ORGANOIDLAR


Asosiy maqsad: Ikki membranali organoidlarning yarim avtonomlik xususiyatini anglab yetish

Vazifalar: Mitoxondriya va Plastidalarining hujayra hayotidagi vazifalariga qarab kelib chiqishi to'g'risidagi umumiylikni yoritib berish

Nazariy tushuncha: **Mitoxondriya**- sitoplazmatik hosilalar bo'lib, ular da asosan hujayraning energiyasini ajratadigan nafas olish prosessi va boshqa metabolik funksiyalar amalga oshadi. Ular hujayralar hayotida juda katta ahamiyatga ega bo'lib, asosan kuvvat ishlabchi stansiya hisoblanadi. Ba'zan mikroskopda ham aniqlab olish mumkin bo'lgan don shaklida bo'lishi aniq langan tekshirishlardan ma'lum bo'lishicha, Mitoxondriyalarning shakli o'zgaruvchan bo'ladi. Bunga asosiy sabab ular membranasining hamma vaqt qisqarib va bo'shashib turishidir. Mitoxondriyalar ko'proq ipsimon yoki tayoqcha shaklida uchraydi. SHuning uchun ham ular asosan sitoplazmaning energiyaga va kislorodga muhtoj bo'lgan qismlarida ko'proq to'planadi. Ximiyaviy tarkibi jihatidan olganda, ular tanasining 65—70% (quruq vaznida) oqsil, 25—30% lipidlar, nafas olish fermentlari va ma'lum darajada nuklein kislotalar (DNK va RNK), sul'fgidril gruppalar hamda vitaminlar tashkil qiladi. Bunda 5—7% oqsil, 25—30% fosfolipidlar, 0,5% RNK bo'ladi. Fermentlar tashqi membranada va matriksda joylashgan.

Mitoxondriyalarning funksiyasi uglevodlarni, aminokislota moy va uch karbon kislotalarini oksidlashdir. Ma'lumki, hayot doimo energiya sarflanishi bilan davom etadi. Energiya esa hujayra nafas olish jarayonida. Buning uchun uglevodlar parchalanadi.

Oksidlanish bilan boradigan fosforlanishda makroenergiyaning asosiy manbai ATF vujudga keladi. Umuman hujayra talab etiladigan energiya deyarli 90% ni mitoxondriyalardan oladi, degan nazariyalar mavjud.




12.1-rasm. Mitoxondriyaning ichki tuzilishi




12.2-rasm. Mitoxondriyaning ATF dagi ishtiroki

Plastida- Xlorofil pigmentlari murakkab strukturali organik moddalar bo'lib tarkibidagi magniy atomi to'rtta pirol halqasiga bog'langan va tusi yashildir. Bularga xlorofil-A, xlorofil-B, xlorofil-S, xlorofil-D va bakterioxlorofil kiradi. Ko'k yashil xlorofil A(S55N72O6N4Mg) va yashil xlorofil (S55N70O6N4Mg) tarkibiga ega. Suv o'tlarining xromotoforida yashil suv o'tlar bilan birga qizil pigment fikoeritin (S35N47N4O8) qizil suv o'tlarida va yashil suv o'tlarida uchraydi. Ko'k pigment fikatsian (S34N42N4O9) ko'k yashil suv o'tlarida va ba'zan qizil suv o'tlarining xromotoforida xlorofil va fikoeritin pigmentlari bilan birga uchraydi.



12.3-rasm. Tilakoidlar.



12.4-rasm. Plastidaning anatomik tuzilishi

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Hujayra organoidlaridan mitoxondriya va plastidaning rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Organoidlarni o'xshashlik va farqli tomonlarini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda hujayra organoidlarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Xlorofil pigmentlari qanday strukturalardan iborat?
2. Karatinoidning organizmdagi roli?
3. Josef Priestli ishlari?
4. Fotosintezning amalga oshishi?
5. Mitoxondriya va plastidalarining bajaradigan vazifalaridagi o'xshashlik va farqlarni izohlang?

13-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: MEMBRANASIZ ORGANELLAR


Asosiy maqsad: Membranasiz organoidlar bilan tanishish

Vazifalar: Membranasiz organoidlarning o'xshashlik va farqli tomonlarini ajratish


Nazariy tushuncha: Ribosomalar- juda kichik bo'lganligi uchun hujayrani differensial sentrafugalashda ular eng oxirida ajraladi ya'ni sedimentatsiyalanadi. Ular prokariotlarda 70 S (Svedberg) birligi bo'lib, sentrafugadagi sedimentasiya birligini ifodalaydi.

Ribosomalarda aminokislotalar bir-biriga ulanib, uzun polipeptidni hosil qiladi. Ribosoma oqsil sintezida molekulalarning bir-biri bilan bog'lanadigan joy bo'lib hiz-

mat qiladi. Subbirliklar bir biri bilan muloqatda bo'lib oqsil sintezlovchi yoki translatsiyada ishtirok etuvchi faol markazlarni hosil qiladi. Oqsil sintez jarayoni 3 bosqichga bo'linadi: 1. Inisiatsiya 2. Elongasiya 3. Terminasiya




13.1-rasm. Ribosomaning tashqi ko'rinishi




13.2-rasm. Ribosomaning oqsil biosintezidagi ishtiroki

Sentriola- Sentriola tuzilmasi 1875 yilda V.Flemming 1876 yilda Z.Beneden tomonidan topilgan. Hayvon hujayralari uchun hos. Bo'linayotgan hujayralarda bo'linish dukini hosil qilishda ishtirok etadi. Sentriolani hosil qilishda aylana boylab joylashgan mikronaychalarning 9 ta tripleti ishtirok etadi. Tripletning birinchi mikronaychasi (A) 13 globulyar subbirliklardan tuzilgan. 2-ch va 3-ch mikronaychalar (B,C) A mikronaychadan to'liqmasligi bilan ajralib 11 globulyar birlikdan tuzilgan. Sentriolaning mikronaychalari tizimi $(9+3)+0$. Interfaza hujayralarida ikkita yonma-yon joylashgan sentriolalar bo'lib, ular **diplosoma** deyiladi. Ularning biri ona ikkinchisi qiz sentriola deb ataladi. Sentriolalar soning oshishi duplikasiya deyiladi.



13.3-rasm. SENTRIOLA KESMALARI



13.4- Sentriola va mikronaychalar tuzilishi

Bazal tanacha va kiprikchalar- Kiprikchalar aksonemasi bazal tanacha va sentriola mikronaychalar tizimidan farqli ravishda 9 triplet dan iborat bo'lmay, balki aksonema devorini hosil qiluvchi 9 juft periferik va 1 juft markaziy mikronaychadan iborat. Umuman kiprikchalar mikronaychalar tizimini $(9 \times 2) + 2$ deb yozish mumkin. Sentriolada esa bu tizim $(9 \times 3) + 0$ ga teng. Bazal tanacha va kiprikchalar aksonemasi uzviy bog'liq bo'lib, ular bir-biriga davom etuvchi tuzilmani hosil qiladi.

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Hujayra organoidlaridan membranasiz organoidlarning rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Organoidlarni o'xshashlik va farqli tomonlarini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda hujayra organoidlarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Membranasiz organoidlarni farqlang
2. Bazal tanacha va kiprikchalarning hosil bo'lish jarayonini izohlang
3. Hujayradagi ahamiyati?

KEYSLAR BANKI

KEYS-13

Mavzu: Membranaga ega bo'lmagan organellalar

Sentriola bo'linayotgan hujayralarda bo'linish dukini hosil qilishda ishtirok etadi. Sentriolani hosil qilishda aylana boylab joylashgan mikronaychalarning 9 ta tripleti ishtirok etadi. Tripletning birinchi mikronaychasi (A) 13 globulyar subbirliklardan tuzilgan. 2-ch va 3-ch mikronaychalar (B,C) A mikronaychadan to'liqmasligi bilan ajralib 11 globulyar birlikdan tuzilgan. S-laning mikronaychalari tizimi $(9+3)+0$.

Topshiriq-1. Bo'linmaydigan hujayralardagi sentriolaning vazifasi?

14-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: YADRO KIMYOVIY TARKIBI VA HUJAYRA HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Asosiy maqsad: Yadro tuzilishi va kimyoviy takibini o'rganish

Vazifalar: Hujayra hayotidagi ahamiyati


Nazariy tushuncha: Yadro apparati hujayraning universal subsistemi bo'lib ba'zi hujayralarda uchramaydi. Prokariotlarda yadro rolini nukleoid bajaradi. U xalqasimon DNKdan iborat bo'lib gialoplazmadan chegaralanmagan bo'lib mezosomaga birikib turadi.

Yadrosiz xujayralarning bulinishi tuxtaydi. Masalan, bir xujayrali suv utiatsetabulyariya kundalang kesilganda, yadrosiz soyabon kismi xalok buladi.

Yadro juda murakkab faoliyatlarni bajaradi; yadro xujayraning eng zarur kismi bulib, barcha xayotiy jarayonlarni boshkaradi; yadro irsiy belgilarning nasldan naslga berilishida va xujayrada oksil moddalar sintezlanishida asosiy rol o'ynaydi;

Yadro va uning tarkibiy qismlari xujayraning interfaza xolatida o'rganiladi. Yadro umumiy tuzilishga ega bulsa xam, ular kattaligi, shakli xamda ichki tuzilmalarining rivojlanishi, kurinishiga kura farklanadi. Ko'pincha xujayralarning yadrosi yumalok, tuxumsimon shakllarda buladi. Yadroning shakli xujayraning shakliga mos buladi, fakat ba'zi xujayralarda noto'g'ri shaklda xam bulishi mumkin. SHarsimon, kubsimon, kup kirrali xujayralarda yadro yumalok. shaklga ega. Prizmatik, silindrsimon xujayralarda yadro uzun ellipssimon, yassi xujayrada esa duksimon bo'ladi. Noto'g'ri shakldagi yadrolarga ba'zi bir leykotsitlarning yadrosi misol bo'ladi.

Yadro hujayrada asosan bitta (bir yadroli hujayrada) yoki ikkita (ikki yadroli hujayrada) bo'l hujayrada) bo'ladi. Masalan, infuzoriya tufelkasida ikkita yadro, ya'ni katta yadro (makronukleus) va kichik yadro (mikronukleus) bo'ladi. Ko'p yadroli hujayralar yoki simplastlar xam mavjuddir. Masalan, karnaychi degan infuzoriyaning yadrosi tasbexsimon, qizil ko'mikdagi hujayralarda uzuksimon, leykotsitlarda kolbasimon sigmentlangan bo'ladi.



14.1-rasm. Yadro kesmasining ko'rinishi


Yadroning asosiy kimyoviy komponenti DNK bo'lib u xromosomal tarkibiga kiradi. DNK avlodidan avlodga genetik axborotni uzatadi; oqsil sintezini kodlaydi. Hujayra yadrosidan DNKni 1 chi marta 1869 yilda Misher ajratib olgan. Bu modda tarkibida azot va fosfor borligini aniqlagan va unga nuklein deb nom bergan. 1914 yilda Fyolgen DNKga rangli reaksiyani qo'rsatib bergan. 10 yildan so'ng Felgen o'z reaksiyasiga asoslanib DNKning xromosomalarda joylashganligini ko'rsatgan.

DNK dan tashkari xujayra yadrosida uch xil: informatsion, ribosomal va transport RNK bor. YAdroda bir xil fermentlar ATF-aza, glikolitik fermentlar bor, lekin oksidlanish fermentlari uchramaydi..

Yadroda kalsiy, magniy, natriy, fosfor, temir, rux, mis, kobalt va boshka elementlar xam topilgan.

Yadro ikki gurux umumiy vazifalarni bajaradi: 1.genetik materialni saqlash. Genetik material DNKning o'zgarmas strukturasi ko'rinishida saqlanadi. 2.Uni realizatsiyalash va oqsil sintezlash. Yadroda DNK replikatsiyasi amalga oshib yangi hosil bo'lgan hujayralarga genetik material teng taqsimlanadi. Meyoz natijasida DNK ning yangi rekombinatsiyalari vujudga keladi.

Yadro: yadro tashqi apparati, yadro shirasi, matriksi, genetik materialdan tarkib topgan.



14.2-rasm. Hujayra yadrosi ko'ndalang kesimining ifodasi.

1-yadro teshigi; 2-yadroning tashqi membranasi; 3-yadroning ichki membranasi; 4-membranalararo bo'shlig'i; 5-yadrocha; 6-ribosomalar; 7-donador endoplazmatik to'r; 8-xromatin

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Yadro tuzilishi tasvirlangan rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar.

Ishni bajarilishi: 1. Yadro qismlarini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda yadro tuzilishini kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

	Yadro	Mitoxondriya	Plastida	Lizosoma	Golji kompleks	Endoplazmatik to'r
Kimyoviy tarkibi						

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Yadro porasining ko'ndalang kesmasi tuzilmasining tuzilishi?
2. Lamina qanday oqsillardan tashkil topgan?

15-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: XROMOSOMA MORFOLOGIYASI, XROMOSOMA TIPLARI.


Asosiy maqsad: xromosoma morfologiyasi, xromosoma tiplarini o'rganish.

Vazifalar: xromosoma kasalliklari to'g'risida ma'lumot to'plang.

Nazariy tushuncha: Xromosoma: xroma-bo'yoq, soma-tanacha degan ma'noni bildiradi. Xromosomalar asosan bo'linayotgan hujayraning metofaz-asida ko'rinadi. Bu xromosomalar ikkita yelkadan iborat bo'lib, ularning o'rtasida birlamchi belbog' joylashgan. Ular uch xil ko'rinishga ega: 1-teng yelkali, 2- bir tomon yelkasi ikkinchisidan uzun, 3-tayoqchasimon (bir yelkasi juda kichik, ikkinchisi esa juda uzun).



Har bir o'simlik yoki hayvon turining hujayrasida xromosomalar soni o'zgarmas, ya'ni bir xildir. Masalan, askarida hujayralarida 2 ta, drozifila pashsha hujayralarida 8 ta, odam hujayrasida 46 ta xromosoma bor. Bu holat xromosomalar sonining doimiylik qoidasi deyiladi. Jinsiy hujayralarda esa kam. Ularda xromosomalar gaploid (toq) to'plamda, somatik hujayralarda esa xromosomalar diploid to'plamda bo'ladi. Bu xususiyat xromosomalar juftlik qoidasi deyiladi. Har bir juftga kiruvchi xromosomalar o'z o'lchami, shakli bilan bir-biriga o'xshaydi. Bunday xromosomalar gomolog xromosomalar deyiladi.

Birinchi juft xromosomalari esa ikkinchi juftga kiruvchi xromosomalardan farq qiladi, ular nogomologik xromosomalar deyiladi. Bu xususiyat xromosomalarning individualligi qoidasi deyiladi.





15.1-rasm. Xromosomaning tuzilishi va tiplari.

A-tashqi ko'rinishi, 1-sentromera(birlamchi belbog'); 2-kichik yelka; 3-katta yelka; 4-ikkilamchi belbog'; 5-yo'ldosh; B-ichki tuzilishi.1-iyentromera; 2-xromonemalar D-xromosoma tiplari: 1-akrosentrik; 2-submetatsentrik; 3-metatsentrik



15.2-rasm. Xromosoma xromonemasining ketma-ketlik tuzilishi.

*1-euxromatin; 2-geteroxromatin; 3-birlamchi belbog
;4-sentrosoma; 5-xromotid; 6-xromonema; 7-ikkilamchi belbog, 8-yadrocha*



15.3-rasm. Odam xromosomasi kariotipi x800

*Odamning jinsiy xromosomasi x2500 J-ayollarning ikki o'xshash xromosomasi;
2-erkaklarning turli xromosomalari*

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Har xil organizmlar xromosomasining rasmi, plakatlari, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Organizmlar xromosomalaridagi farqlarni farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda xromosomalarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftariga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Xromosomalar morfologik jihatdan qanday turlarga ajraladi?
2. Kariotip nima? Idiogrammachiligi?
3. Xromosomalarning kimyoviy tarkibi?
4. Xromosomaning ultrastrukturaviy tuzilishini izohlang

16-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: MITOZ. MITOZ FAZALARI

Asosiy maqsad: Mitoz fazalarini to'liq o'rganish

Vazifalar: Mitozning biologik ahamiyati

Nazariy tushuncha: Ma'lumki, hujayralarning o'ziga xos yashash muddati bor. Ontogenez davrida hujayralar nobud bo'lib, ularning o'rnini yangi - ko'payish jarayonida hosil bo'lgan yosh hujayralar egallaydi. Hozirgi vaqtda hujayralar ko'payishining uch xili aniqlangan: 1) mitoz (mitos-ip) yoki noto'g'ri bo'linish yoxud kariokinez; 2) amitoz (a-inkor etish, mitos- ip yoki to'g'ri bo'linish) va 3) meyoza (meiosis -kamayish).


Mitoz yoki vositali bo'linishda hujayrada xromosoma ipchalari paydo bo'la boshlaydi. Bunday usulda bo'linish organizmda ko'pchilik hujayralarga xos bo'lib, bunda hujayra ikkiga bo'linib, irsiy axborotni belgilovchi tuzilmalar hamda boshqalari ham qiz hujayralar orasida ikkiga bo'linadi. Hujayralarning bo'linishi jarayonida sitoplazma va yadro tarkibida murakkab o'zgarishlarni kuzatamiz. Bu jarayon to'rt bosqichga (fazaga) bo'linadi: profaza, metafaza, anafaza, telofaza. Ikkita faza o'rtasidagi davrga intermitoz faza yoki interfaza deyiladi.

Profaza hujayralardagi yadro mahsulotlarining o'zgarishidan boshlanadi: tayoqchasimon yoki yumaloq shakldagi xromosomalar paydo bo'lib, hujayrada qutblanish jarayoni boshlanadi. Xromosoma tarkibida bo'lgan xromatindagi DNK yaxshi ko'rinib turadi. Shunga o'xshash jarayon hujayra markazida ham sodir bo'lib, ulardagi sentriolalar bir-biridan uzoqlashadi va qarama-qarshi tomonga o'tadi va duk ipchalari yordamida birikib turadi. Profazaning oxiri xromosomalarning tiklanishi, yadro qobig'i va yadrochaning yo'qolishi bilan yakunlanadi.

Metafaza yoki ona yulduz bosqichida xromosomalar hujayra markaziga siljib, duk o'rtasida metafazali yoki ekvatoriyali bir tekis plastinka hosil qiladi. Metafaza oxirida har bir xromosoma ikkita xromatidga, ya'ni qiz xromosomalarga bo'linadi.


Anafaza. Bu davrda gomologik xromatidlar qarama- qarshi qutblarga ajraladi. Ona hujayrada nechta xromosoma bo'lsa, har bir qutbda shuncha xromosoma jonlanadi. Hujayra tanasida belbog' hosil bo'lib, hujayrani asta-sekin ikkiga boiadi.

Telofaza. Bunda yangi hosil bo'lgan hujayrada bir butun hujayra shakllana boshlaydi. Axromatin duk yo'qolib, sentrioladan hujayralar markazi hosil bo'ladi. Xromosomalarda yig'ilgan yadro moddasi bir tekis ko'rinishni egallaydi, yadrocha bilan yadro qobig'i yuzaga keladi. Sitoplazmada ikkiga ajralib, ikkita yosh mustaqil hujayra hisoblanadi.



16.1-rasm. Piyoz po'stlog'ida mitoz x400

1-interkinez; 2,3-profaza; 4-metafaza; 5-axromatin ip; 6-anafaza; 7-telofaza




16.2-rasm. Hayvon jigari hujayrasida mitoz.

1-bo'linmayotgan hujayra; 2-3-zich va yumshoq tupcha profaza bosqichi; 4-metafaza; 5-anafaza

AMITOZ

Jigar hujayralarining kichik obyektivi pushti rangli sitoplazmaga ega bo'lib, ko'p qirrali noto'g'ri shaklda ko'rinadi. Yadrosi yumaloq och binafsha rangga, yadrochasi esa to'q bo'yaladi. Amitoz jarayonini kuzatish uchun preparatda jigarning cho'ziq yadroli hujayralari joylashgan yerni topish lozim.



16.3-rasm. A-ko'p yadroli jigar hujayrasi B-ko 'z pardasi hujayrasida amitoz

Preparat katta obyektiv ostiga olinganda yadro cho'ziq bo'libgina qolmay, balki o'rtasining torayganligi ko'zga tashlanadi. Bu amitozning boshlang'ich bosqichidir. Keyinchalik yadroning o'rta qismi yanada ingichkalashib, nihoyat uziladi va yangi ikkita yadro hosil bo'ladi.

Hujayra sitoplazmasi ham o'rta qismidan ingichkalasha bo-rib, oxiri bo'linadi va ikkita qiz hujayra yuzaga keladi. Ba'zan faqat yadro ikkiga bo'linadi, ammo hujayra sitoplazmasi butun qoladi, natijada ikki yadroli va ko'p yadroli hujayralar hosil bo'ladi. Tabiiyki, preparatda bo'linish bosqichlarini bayon etilgan tarzda kuzatib boimaydi.

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Mitoz va mitoz fazalarining rasmi, plakatlar, doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Mitoz fazalarini farqlang. 2. Doimiy preparatlarda mikroskopda hujayralarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Mitozning genetik ahamiyatini tushuntiring
2. Mitozning qaysi fazasida genetik ahborot ikki marta ortadi?
3. Mitozning qaysi fazasida sentromera ikkiga bo'linadi?
4. Mitozning qaysi fazasida axromatin iplari sentromeraga ulanadi?

17-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: MEYOZ


Asosiy maqsad: Meyoz fazalarini to'liq o'rganish

Vazifalar: Meozning biologik ahamiyati







Nazariy tushuncha: Meyoz hujayralar bo'linishining muayyan usuli bo'lib, jinsiy hujayralarga xosdir. Ma'lumki, hayvon va o'simliklar har bir turining hujayra yadrolarida o'zgaras ma'lum sonli xromosomalari mavjud. Odam hujayralarida bu son 46 ga teng. Jinsiy ko'payishda tuxum va urug' hujayralarining qo'shilishi yuz beradi. Bunday rivojlanadigan pushtda shu tur uchun xos bo'lgan xromosomalar soni saqlanib qolishi uchun yetilgan jinsiy hujayralarda xromosomalarning soni ikki baravar kam bo'lishi lozim. Jinsiy hujayralarda xromosomalar sonining ikki baravar

kamayishi (reduksiyasi) jinsiy hujayralar rivojlanishining yetilish fazasida yuz beradi. Reduksion bo‘linishga tayyorgarlik jinsiy hujayralar rivojlanishining o‘rish fazasidayoq boshlanadi. Bu fazada gomologik xromosomalarning juftlashuvi (kon‘yu- gatsiyasi) yuz berib, ular bir-biriga zich tutashib yotadi. So‘ngra kon‘yugatsiyalangan har bir xromosomada uzunasiga yo‘nalgan yoriq paydo bo‘ladi. Natijada xromosoma juftlari to‘rtta tanachadan iborat bo‘lib qoladi. Bu tetrada (tetra- to‘rt demakdir) deb ataladi. Har bir tetrada ikkita juftlashgan xromosomalardan iborat bo‘lgani sababli ularning miqdori dastlabki xromosomalardan sonidan ikki baravar kamdir. Chunonchi, odamda ularning soni 23 taga yetadi. Tetradalar hosil bo‘lishi bilan spermatositlarning o‘rish davri tugaydi va ular yetilish fazasiga o‘tadi. Bunda spermatositlar ketma-ket ikki marta bo‘linadi. Birinchi bo‘linishda II tartibdagi spermatositlar hosil bo‘lib, har bir tetrada ikkita diadaga bo‘linadi va yangi hosil bo‘lgan II tartibdagi spermatositlar diadalarga ega bo‘ladi. Natijada II tartibdagi spermatositlarda 23 tadan diada tashkil topadi. II tartibdagi spermatositlar darhol yana bo‘linadi va hosil bo‘lgan spermatidlar diadalarining bo‘linishi natijasida vujudga kelgan monadalarga (yakka-yakka xromosomalarga) ega bo‘ladi. Demak, kelgusida shakllanib, spermatozoidlarga aylanuvchi ushbu spermatidlarda 23 tadan xromosoma bo‘lishi mumkin.

Meyoz jarayonida ikki marta mitoz ketma-ket yuzaga kelishi munosabati bilan mitoz-1 va Meyoz II- tarkib topadi va har ikkalasida mitoz bosqichlari kuzatiladi. Yani profaza-1, metafaza-1, anafaza-1, telofaza-1 va profaza-2, metafaza-2, Telofaza-2. Profaza-1 da genetik materiallardan rekombinatsiya jarayonlari, ya‘ni gomologik uchastkalar o‘rin almashuvi, ribosoma va informatsion RNK sintezi, yadrocha faollashuvi ko‘rinadi. Bu faza leptonemma, zigonemma, pexinemma, diplonema dikinez kabi besh bosqichdan iborat.



17.1-rasm. Meyoz fazalari.



Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Meyoz jarayoni tasvirlangan rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Meyoz bo'linishning fazalarini farqlang 2. Doimiy preparatlarda preparatlarda mikroskopda meyo hujayralarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4.

Mitoz va Meyozning o'xshashligi farqi

Savollar	Mitoz	Meyoz
O'xshashligi		
Bo'linish fazalari		
Interfazada DNK da qanday hodisa ro'y beradi?		
Farqlari		
Gomolgik xromosomalarning konyugasiyasi bo'ladimi yoki yo'q		
Qiz hujayralarning xromosomalarining ona hujayraga nisbati o'zgaradimi?		
Nechta qiz hujayra hosil qiladi?		
O'simlik va hayvonlarning qaysi organlarida sodir bo'ladi?		
Biologik ahamiyati		

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Meyozning qaysi fazasida har bir xromosoma juft-juft xromatidlardan tashkil topgan bo'ladi?
2. Meyozning genetik ahamiyati nimadan iborat?
3. Xazma qachon boshlanadi va tugallanadi?

18-AMALIY MASHG'ULOT

MAVZU: ENDOREPRODUKSIYA

Asosiy maqsad: Endoreproduksiyani o'rganish

Vazifalar: Endoreproduksiyaning ahamiyati

Nazariy tushuncha: Bo'linayotgan hujayralar ma'lum vaqt muzlatilsa yoki bo'linish duki mikronaychalarini buzuvchi modda(kolxitsin) ta'sir ettirilsa, bo'linish to'xtaydi. Bo'linish duki buzilib xromosomalar qutblarga tortilmasdan o'zing siklini davom ettiradi: yo'g'onlashib yadro qobig'i bilan o'raladi. Natijada xromosomalari xech qaerga tarqalmay o'zida qolgan yirik yadrolar vujudga keladi. Bunday hujayra tarkibida DNK 4s ni xromosomalar 4n ni tashkil etganligi uchun u diploid emas tetraploid bo'ladi. Bunday hujayralar G1 bosiqdan chiqib S bosqichga kirishlari va kolxitsinning ta'siri olib tashlansa yana mitotik yo'l bilan bo'linishi va 4nga ega bo'lgan avlod berishi mumkin. Bu usul seleksiyada poliploid organizmlarni olishda ishlatiladi.

Ma'lum bo'lishicha tabiatda ham normal diploid organizmlarda DNK miqdori bir necha karra ko'p bo'lgan yirik yadroli organizmlar uchraydi. Bu hujayralar somatik poliploidiya maxsulotidir. Bu hodisa endoreproduksiya- DNK miqdori ortiqcha bo'lgan hujayralarning yuzaga kelishidir.

Bunday hujayralarning yuzaga kelishi mitozning borishida qandaydir buzilishlar yuzaga kelishi natijasida paydo bo'ladi. Mitozning bir qancha nuqtasi bo'lib ularni blokada qilish natijasida bo'linish to'xtab poliploid hujayralar rivojlanadi. Bular G2

dan mitozga o'tish davri, profaza, metafaza davrida va sitotomiya jarayonining buzilishi poloploidiyaga sabab bo'ladi.

Xromosomalarning kondensatsiyasi kuzatilmaydi. Ba'zi umurtqasiz hayvonlarda poliploidiya darajasi katta bo'ladi. Tut ipak qurtining so'lak ajratuvchi bezi hujayralari yadrosi ploidligi ko'pligidan shoxlanib ketgan bo'ladi. Askarida qizilo'ngachi hujayralari 100ming s DNKga ega.

Endoreproduksiyaning bir ko'rinishi politeniya xodisasidir. Politeniyada S davrdagi DNK replikatsiyasida xromosomalar despiralizatsiya xolida qolib bir-biridin ajralmaydi va kondensatsiyalanmaydi. SHu xolatda ular yana keyingi replikatsiya sikliga o'tadilar yana ikkixissa oshadilar va yana ajralmaydilar. Natijada ko'p ipli politen xromosomaxosil bo'ladi. Bu xromosomalar xech qachon mitozda ishtirok etmaydi ular interfaza xromosomalari bo'lib DNK va RNK sintezida ishtirok etadilar. Mitotik xromosomalardan o'lchamlari, yo'g'onliklari bilan farq qiladilar, chunki bir qancha iplar tutamidan iborat bo'ladilar. Drozofilla pashshasining politen xromosomasi mitotik Xxromosomasidan ming marta katta va 70-250 martagacha uzunroqdirlar. Ularning hujayradagi soni gaploid bo'ladi, chunki gomologik xromosomalar qo'shib kon'yugatsiyalanadi. Drozofilaning somatik hujayrasida 8 ta xromosoma. So'lak bezida 4 ta bo'ladi.

Politen xromosomalar tuzilishi jixatidan ham farq qiladilar. Ular uzunligi bo'ylab bir xilda tuzilmagan: disklar diskaro qismlar va puflardan tuzilgan. Rasm.

Disklar-kondensatsiyalangan xromatid uchastkalari. Ular 1-1idan qalinligi bilan faqr qiladi. Ularning umumiy soni 1,5-2,5 tagacha bo'ladi.

Disklar diskaro qismlar bilan ajratilgan. Ular ham disklar singanri xromatin fibrillardan tuzilgan lekin ancha bo'sh taxlangan.

Politen xromosomalar yuzasida shishlar ko'rinadi, ular disklarning dekontensatsiyalanishi natijasida xosil bo'ladi. SHishlarda RNK sintezlanadi. Demak shishlar transkripsiya joyi xisoblanadi. SHishlar xromosomalar yuzasidagi vaqtinchalik tuzilmalar hisoblanadi. Organizm rivojlanishi mobaynida ular muayyan joyda va vaqtda xosil bo'ladi. Ularning hosil bo'lishi gen aktivligi natijasidir. Ularda xasharotlar rivojlanishining turli etaplarida turli oqsillarning sintezi uchun RNK xosil bo'lib turadi.

Xromosomalardagi disk va shishlarning joylashishi turga xos belgi bo'lgani uchun genetik metodlar yordamida turgi genlr joylashish joyi, morfologiyasi o'rganilib ular asosida xromosoma xaritasi tuzilgan.



Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Politen xromosomalarni rasmi, plakatlar, mikroskop, doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Endorepraduksiya hodisasini kuzating. 2. Doimiy preparatlarda mikroskopda hujayralarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Endorepraduksiyani izohlang
2. Politen xromosomalar?
3. Endorepraduksiyaning biologik ahamiyati

19-AMALIY MASHG`ULOT

MAVZU: NEKROZ

Asosiy maqsad: Nekroz hodisasini o`rganish

Vazifalar: Nekrozning ahamiyati

Nazariy tushuncha: Alohida olingan hujayralar ham butun organizmlar turli ta`sirlarga uchrashi natijasida ularda strukturaviy funksional o`zgarishlar yuzaga kelib bu patologiya rivojlanishiga sabab bo`ladi. Bunday patologik jarayonlar organizm ayrim funksiyalarining buzilishiga va hujayra va organizm o`limiga olib kelishi mumkin. Ko`p hujayrali organizmda yuzaga keladigan patologik jarayonlar negizida alohida olingan 1 ta hujayrada yuzaga keladigan buzilishlar yotadi. Bu g`oyani R.Virxov ilgari surgan.

Yadro qobig`ida ro`y beradigan o`zgarishlardan biri perenuklear bo`shliqning kengayib ketishi, yadro membranalarining o`iyshayib ketishidir.

O`zgarishlarning erta etaplarida hujayra shaklining yumaloqlashishi va uning yuzasidagi o`simtalar, mikrovorsinkalar sonining kamayishi kuzatiladi. Plazmatik membrana yuzasida turli pufakchalar yuzaga keladi.

Plazmatik membrana ning buzilishiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin:

1. Erkin radikallarning(stabil bo'lmagan va tashqi orbitasida toq elektronlar soniga ega bo'lgan chastitsalar) xosil bo'lishi.Ular aktiv kislorodga ega bo'lib membrananing lipidlari bilan reaksiyaga kirishishi natijasida ortiqcha energiya xosil bo'ladi, lipidlar oksidlanadi.
2. Komplement sistemasining aktivlashishi. Bular Plazmatik membrana aktiv bo'lmagan oqsillari guruxi bo'lib ularning faollashishi natijasida membrana fermentativ emiriladi. Sog'lom hujayrada bu fermentlar yod moddalarni parchalash vazifasini bajaradi.
3. Fermentlar ta'sirida lizislanishi. O'tkir pantreotitda va gangrena kassaligida ortiqcha fermentlarning sintezi Plazmatik membrana ning nekrozini keltirib chiqaradi.
4. Hujayraga kirayotgan viruslar ta'sirida lizislanadi.
5. Kimyoviy va fizikaviy faktorlar ta'sirida(yuqori yoki past xarorat, kimyoviy moddalar)

Plazmatik membrana shikastlanishi oqibatlari:


1. Strukturaviy butunlikning yo'qolishi. Uncha katta bo'lmagan o'zgarishlar tiklanishi mumkin,lekin bunda Plazmatik membrana yuzasi kamayadi.
2. To'siq vazifasining buzilishiga sabab bo'ladi,bu esa hujayra ichiga ortiqcha suv kirishiga olib keladi.

Plazmatik membrana shikastlanishi turlari: Membranal patologiyasi ularning o'tkazuvchanligining bshzilishi, membrana orqali trasportning buzilishi, membranalar xarakati va hujayra shaklining o'zgarishi, sintez va almashinuvning buzilishi.

Membranalar shaklining o'zgarishi morfologik jixatdan deformatsiya va maxsus tuzilmalar atrofiyasi bilan teshiklar va uzilishlar xlosil bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Mitoxondriyalar shikastlanish sabablari ATF sintezi buzilishi bilan bog'liq.

Gipoglikemiya: glyukoza energiya xosil bo'lishida asosiy substrat va bosh miya neyronlari uchun asosiy energiya manbaidir. SHuning uchun qonda glyukoza miqdorining kamayishi(gipoglikemiya) ATF sintezining kamayishiga olib keladi,bu ayniqsa miya hujayralarida bilinadi.



Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Mavzuga doir rasmi, plakatlar, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1.Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Nekroz nima?
2. Odamning barcha hujayralari qancha vaqtda to'liq yangilanadi?
3. Katabioz va nekrozni izohlang?

19-AMALIY MASHG'ULOT


MAVZU: APOPTOZ

Asosiy maqsad: Apoptoz hodisasini o'rganish

Vazifalar: Apoptoning ahamiyati

Nazariy tushuncha: Hujayralarning 2 chi nobud bo'lish usuli- apoptoz organizm boshqaruvi ostida bo'lib bunda o'layotgan hujayralar sitokinlarni ishlab chiqarmaydi.

Ma'lumki DNK miz qo'sh zanjirdan tuzilgan. Organizmda vaqti vaqti bilan DNK zanjirida uzilishlar xosil bo'lib turadi. Uzilishlar sababi turli stress xolatlaridir. Uzilishlar bitta zanjirda bo'lib uzilgan joy 2 chi zanjirdagi shu joyga qarab tuzatiladi. YA'ni uzilgan DNK bo'lagi sog'ining oldiga kelib undan nusxa ko'chiradi. Bunday uzilishlar sog' hujayralarda yuqori samaradorlik bilan tuzatiladi. Lekin ba'zan uzilish joyida uning duplexi –kopiyasi uchramaydi. Natijada DNK sida bunday uzilishlari bo'lgan hujayralar kasal nasl beradi va hujayralarning nobud bo'lishiga olib keladi. SHish hujayralari DNK sida anashunday uzilishlar yuzaga kelib ular tiklanmasligi natijasida hujayralar mutant onkogenlar yuzaga keladi. Bunday hujayralar tashqi signallarni eshitmaydi, faqat ichidagi kasal genlar berayotgan noto'g'ri signallarni qabul qiladi. Bunday hujayralar 10% tashkil etsa ularning nekrozi organizmni yara bitiruvchi mexanizmi ishga tushadi va bu hujayralarning bo'linishini stimullay boshlaydi. SHu tariqa o'sma kattalashadi. Qon oqimiga shunday hujayralarning 1 si tushib qolsa u qon bilan boshqa a'zolarga etib borib u erda shish rivojlanadi(metastaza).



CELL DEATH:
NECROSIS VS. APOPTOSIS

Zaruriy ashyolar: Rasm daftar, qalam va ruchka

Vosita, jihoz, qurilma: Nekroz hujayrasining rasmi, plakatlar, mikroskop, vaqtinchalik va doimiy preparatlar

Ishni bajarilishi: 1. Nekroz va apoptozni farqlang. 2. Doimiy preparatlarda va vaqtinchalik preparatlarda mikroskopda hujayralarni kuzating. 3. Kuzatganlaringizni rasm daftarga tushiring. 4. Hulosalaringizni qayd qiling.

Nazariy va amaliy tushunchalarni egallash uchun savollar:

1. Apoptoz nima?
2. Apoptozning sodir bo'lish sabablari?
3. Nekroz va apoptozni solishtiring.

KEYS-6

MAVZU: APOPTOZ

Hujayralarning 2 chi nobud bo'lish usuli- apoptoz organizm boshqaruvi ostida bo'lib bunda o'layotgan hujayralar sitokinlarni ishlab chiqarmaydi.

Ma'lumki DNK miz qo'sh zanjirdan tuzilgan. Organizmda vaqti vaqti bilan DNK zanjirida uzilishlar xosil bo'lib turadi. Uzilishlar sababi turli stress xolatlaridir. Uzilishlar bitta zanjirda bo'lib uzilgan joy 2 chi zanjirdagi shu joyga qarab tuzatiladi. YA'ni uzilgan DNK bo'lagi sog'ining oldiga kelib undan nusxa ko'chiradi. Bunday uzilishlar sog' hujayralarda yuqori samaradorlik bilan tuzatiladi. Lekin ba'zan uzilish joyida uning duplexi –kopiyasi uchramaydi.

O'simlik va hayvonlarda boradigan APOPTOZning farqi nimada?

MUSTAQIL ISH MASHG'ULOTLARI

Mustaqil ishini tayyorlashda quyidagi shakildan foydalanishni tavsiya etamiz:

- amaliy mahsg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish
- darslik va o'quv qo'llanmalar bo'yicha fan boblari va mavzularni o'rganish
- tarqatma materiallar bo'yicha ma'ruzalar qismini o'zlashtirish
- yangi texnika va texnologiyalar bilan ishlashni o'rganish
- ilmiy tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog'liq bo'lgan fanlar bo'limlari va mavzularini chuqur o'rganish

Mustaqil ish-1

Mavzu: Amaliyot mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Yorug'lik mikroskopining tuzilishi
2. Radioavtografiya va mikroxiirurgiya usuli
3. Tirik hujayralarni o'stirish va hujayralarni fiksasiya qilish usuli

Mustaqil ish-2

Mavzu: Hujayra nazariyasining yaratilish tarixi

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Dastlabki hujayra nazariyalari
2. Hujayra nazariyasining mohiyati
3. Shleydin va Shvann nazariyalari

Mustaqil ish-3

Mavzu: O'simlik va hayvon hujayrasining o'xshashlik va farqli tomonlari

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Hujayrasiz shakillar guruhi va ularning tuzilishi
2. O'simlik va hayvon hujayrasining o'xshashlik tomonlari
3. O'simlik va hayvon hujayrasining farqli tomonlari

Mustaqil ish-4

Mavzu: Hujayra tiplari

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Prokariot hujayralar
2. Eukariot hujayralar
3. Prokariot hujayralarning biologik ahamiyati

Mustaqil ish-5

Mavzu: Mitoxondriyaning tuzilishi va vazifasi

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Xondriasomaning vazifasi va hujayradagi miqdori
2. Mitoxondriyaning tuzilishi va vazifasidagi bog'liqlik
3. Mitoxondriyaning yarim avtonomligini izohlash

Mustaqil ish-6

Mavzu: Hujayra plastidalarining ta'rifi, guruhlari, ultrastrukturaviy va kimyoviy tuzilishi

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Plastidalarining hosil bo'lish xilma-xilligi
2. Plastida va mitoxondriyalarning o'xshashlik tomonlari
3. Pigmentlar qanday strukturadan ibotat

Mustaqil ish-7

Mavzu: Plastidalar va ularda fotosintez jarayoning amalga oshishi

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. J.Pristli ishlari.
2. Plastida va mitoxondriyalarning o'xshashlik tomonlari
3. Plastidalarining fotosintezdagi ahamiyati

Mustaqil ish-8

Mavzu: Membranaga ega bo'lmagan organoidlar

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Ribosomalarining hosil bo'lishi va vazifalari
2. Mikronaychalarning hosil bo'lish jarayoni
3. Bo'linmaydigan hujayralardagi sentriolaning vazifasi.

Mustaqil ish-8

Mavzu: Sekret moddalarning hujayradan ajralishini o'rganish

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Oqsillarning ajralishi
2. Sekret moddalarning ajralishida membrananing roli
3. Moddalar ajralishining hillari.

Mustaqil ish-9

Mavzu: Sekret moddalarning hujayradan ajralishini o'rganish

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Oqsillarning ajralishi
2. Sekret moddalarning ajrealishida membrananing roli
3. Moddalar ajralishining hillari.

Mustaqil ish-10

Mavzu: Hujayra yadrosi

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Yadroning kashf qilinishi va uning o'lchami
2. Interfazada yadroning holati
3. Xromatin va xromosoma tuzilishlari

Mustaqil ish-11

Mavzu: Hujayraning qayta tiklanishi va umrining davomiyligi

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Hujayralarning o'ziga hos ko'payish usullari
2. Mitoz va Meyoz
3. Ko'payishning biologik ahamiyati

Mustaqil ish-12

Mavzu: Xromosomalarning mutasiyaga uchrashi va uning oqibatlari

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Mutasiya hillari
2. Xromosoma mutasiyalari
3. O'simlik va hayvon organizmidagi ijobiy va salbiy mutasiyalar

Mustaqil ish-13

Mavzu: Hujayra evolyutsiyasi

Mavzuga oid topshiriqlar:

1. Prokariot va eukariot, o'simlik va hayvon hujayralarida irsiy axborotning saqlanishi va amalga oshirilishi
2. Murtakning partenogenez va androgenez rivojlanishi
3. Hujayra funksiyasining buzilishi

GLOSSARIY

Sitologiya	<i>Цитология</i>	<i>Sitology</i>	Hayvon va o'simlik hujayralarining tuzilishi, rivojlanishi va funksiyasini o'rganadigan fan
Hujayra	<i>Клетка</i>	<i>Cell</i>	O'simlik va hayvonlarning eng kichik birligi
O'simlik	<i>Растение</i>	<i>Plant</i>	Atrofimizdi o'rab turgan yashil tabiat
Hayvon	<i>Животное</i>	<i>Animal</i>	
Hujayra devori	<i>Мембрана клетка</i>	<i>Cell wall</i>	Hujayrani tashqi muhitdan himoya qiluvchi to'siq
Mikroskop	<i>Микроскоп</i>	<i>Microskop</i>	Mayda organizmlarni ko'radigan asbob
Markaziy vakuola	<i>Центральная вакуола</i>	<i>Central vacuole</i>	Hujayradagi eng yirik hujayra shirashi
Sentrosoma	<i>Центросома</i>	<i>Centrosome</i>	Hujayra markazi atalmish hujayra organoidi.
Lizosoma	<i>Лизосома</i>	<i>Lysosome</i>	Gidrolitik fermentlar gruppasini tutgan sitoplazmadagi submikroskopik tanachalar
Mikroorganizmlar	<i>Микроорганизм</i>	<i>Microorganisms</i>	Kelib chiqishiga ko'ra o'simlik va hayvonlarga mansub bo'lgan, mikroskopdagina ko'rinuvchi o'ta mayda organizmlar.
Prokariot	<i>Прокариот</i>	<i>Prokaryote</i>	Shakillanmagan yadroga ega bo'lmagan hujayralardan iborat organizmlar
Eukariot	<i>Эукариот</i>	<i>Eukaryotic</i>	Shakillangan yadroga ega bo'lgan hujayralar
Membrana	<i>Мембрана</i>	<i>Membrane</i>	Hujayrani tashqi tomondan ajratib turuvchi nozik qobiq.
Yadro	<i>Ядро</i>	<i>Nucleus</i>	Hujayradagi asosiy organoid
Leykoplatt	<i>Лейкопласты</i>	<i>Leykoplast</i>	O'simlik hujayralarining rangsiz plastidallari bo'lib, ularda kraxmal, oqsil va yog'larning ikkilamchi sintezi kechadi.
Genetik ahborot	<i>Генетик информация</i>	<i>Genetic information</i>	Genetik axborotda irsiy ma'lumotlar nasildan nasilga ko'chadi
Yadro membranasi	<i>Ядерная мембрана</i>	<i>Nuclear membrane</i>	Yadroni tashqi tomondan o'rab turuvchi qatlam
Yadro teshiklari	<i>Ядерная поры</i>	<i>Nuclear pore</i>	Yadro devoridagi teshiklar
Qo'shqavat membrana	<i>Двойная мембрана</i>	<i>Double membrane</i>	Ikki qavatli organoidlar asosan qo'sh qavat membranadan tashkil topgan
Yadrocha		<i>Nucleolus</i>	Hujayra yadrosi tarkibiga kiruvchi organoid
Yadro shirasi	<i>Кариплазма</i>	<i>Nucleoplasm</i>	Hromatin, yadrochalarni tutgan hujayra yadrosining ichki moddasi

DNK genetik material	<i>ДНК генетик материал</i>	<i>Genetic material DNA</i>	DNK o'zida irsiy ma'lumotlarni saqlovchi dezoksribonukein kislota
Replikasiya	<i>Репликация</i>	<i>Replication</i>	Genetik informatsiyani aniq nusxalashi va avlodlarga o'tishini ta'minlovchi, nuklein kislotalar makromolekulalarining o'zini o'zi hosil qilish jarayoni
Transkripsiya	<i>Транскрипция</i>	<i>Transcription</i>	DNK dagi nukleotidlarni joylanish tartibini ko'chirib oluvchi iRNK molekulasi DNK molekulasi hosil bo'lish jarayoni
Oqsil	<i>Протеин</i>	<i>Protein</i>	20 xil aminokislotalardan tashkil topgan biopolimerdir
Sitoplazma	<i>Цитоплазма</i>	<i>Cytoplasm</i>	Yadrodan tashqari hujayraning barcha hayotiy borlig'iga taaluqli bo'lgan hujayraning muhim tarkibiy qismi
Endoplazmatik to'r	<i>Эндоплазматическая сеть</i>	<i>Endoplasmic reticulum</i>	Eukariot hujayra organoidi. Sitoplazmada joylashgan naylar sistemasidan iborat.
Donador endoplazmatik to'r	<i>Гранулированный эндоплазматическая сеть</i>	<i>Rough endoplasmic reticulum</i>	Endoplazmatik to'rning bir turi. Ribosomalardan tashkil topgan
Silliqli endoplazmatik to'r	<i>Гладкая эндоплазматическая сеть</i>	<i>Smooth endoplasmic reticulum</i>	Endoplazmatik to'rning bir turi ribosomalar yo'q.
Goldji apparati	<i>Аппарат Гольджи</i>	<i>Golgi apparatus</i>	Hujayraning muhim organoidi. U ses, medium va trans bo'limlardan tashkil topgan
Vazifalari	<i>Функции</i>	<i>Function</i>	Har bir organoidlarni bajaradigan vazifalari
Xloroplast	<i>Хлоропласт</i>	<i>Chloroplast</i>	O'simliklarga xos bo'lgan organoid
Mitoxondrya	<i>Митохондрия</i>	<i>Mitochondria</i>	Hujayradagi oksidlanish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan organoid
Tashqi membrana	<i>Внешний мембрана</i>	<i>Outer membrane</i>	Hujayralar qo'shqavatdan iborat bo'lib, tashqi va ichkiga bo'linadi
Ichki membrana	<i>Внутренний мембрана</i>	<i>Inner membrane</i>	Hujayralar qo'shqavatdan iborat bo'lib, tashqi va ichkiga bo'linadi
Stroma	<i>Строма</i>	<i>Stroma</i>	Plastidalarining matriks qismi
Tilakoid	<i>Тилакоид</i>	<i>Thylakoid</i>	Plastidalaridagi tangacha ko'rinishdagi qismi. Pigmentlar tilakoidlarda joylashgan
Peroksisoma	<i>Пероксисома</i>	<i>Peroxisome</i>	Hujayra organoidlaridan biri
Organoidlar	<i>Органоиды</i>	<i>Organelles</i>	Hujayrada joylashgan muhim ahamiyatga ega, ma'lum vazifalarni bajaradigan tuzilmalar
Mitoz	<i>Митоз</i>	<i>Mitosis</i>	Tana hujayralarining bo'linish usuli
Meyoz	<i>Мейоз</i>	<i>Meiosis</i>	Jinsiy hujayralarining bo'linish usuli
Amitoz	<i>Амитоз</i>	<i>Amitosis</i>	Hujayraning to'g'ri bo'linish usuli

Xromosoma	<i>Хромосома</i>	<i>Chromosome</i>	
Telomera	<i>Теломера</i>	<i>Telomere</i>	Xromosomalarning chekka qismi
Xromatid	<i>Хроматид</i>	<i>Xromotide</i>	Xromosomaning DNK sintezdan keyin hosil bo'lgan qismi
Xromatin	<i>Хроматин</i>	<i>Chromatin</i>	Yadro modda. Xromosomlardan dezoksiribonulleoproteiddan , gistondan va qisman RNK dan tashkil topgan
Poliploidiya	<i>Полиплоидия</i>	<i>Polyploidy</i>	O'simlik va hayvon hujayralaridagi gaploid xromosomalar yig'indisining ikki, uch, to'rt hissava undan ko'p marta oshishi
Sentromera	<i>Центромера</i>	<i>Centromere</i>	Xromosomani teng ikkiga bo'ladi
Giston oqsillari	<i>Протеин гистоны</i>	<i>Histone proteins</i>	
Endisitoz	<i>Эндоцитоз</i>	<i>Endocytosis</i>	Yirik moddalarning hujayra ichiga kirishi

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
БИОЛОГИЯ КАФЕДРАСИ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

ГулДУ проректори
Н.Баракаев

«__» _____ 2017 й.

ЦИТОЛОГИЯ

Ғани бўйича

(5140100-Биология таълими)

ишчи ўқув дастури

Умумий ўқув соати	– 130
Шу жумладан:	
Маъруза:	– 32
Амалий машғулот:	– 40
Мустақил таълим:	– 58

ГУЛИСТОН – 2017

Фаннинг ишчи ўқув дастури намунавий ўқув дастури ва ўқув режасига мувофиқ ишлаб чиқилди.

Тузувчи: Аблакулова Н. – ГулДУ “Биология” кафедраси ўқитувчиси
_____ (имзо)

Тақризчи: Каримқулов А. – ГулДУ “Биология” кафедраси доценти
_____ (имзо)

Фаннинг ишчи ўқув дастури “Биология” кафедрасининг 2017 йил “___” _____ даги
___ - сонли мажлисида кўриб чиқилиб, факультет Илмий-услубий Кенгашида кўриб чиқиш
учун тавсия қилинди.

Кафедра мудири:

Абдикулов З.У.

Фаннинг ишчи ўқув дастури “Табиий фанлар” факультети Илмий-услубий Кенгашининг
2017 йил “___” _____ даги “___” - сонли мажлисида тасдиқланди.

Факультет Илмий-услубий

Кенгаши раиси:

б.ф.д. профю Х. Кўшиев

КИРИШ

Цитология фани организмнинг асосий таркибий қисми-хужайраларнинг микроскопик ва ультрамикроскопик тузилишига бағишланади. Талабалар бу фанни ўрганиш асосида прокариот ва эукариот хужайраларнинг тузилиши асослари ва хусусиятлари, хужайранинг бўлиниши, хужайра эволюциясини бир-бирига боғлаган ҳолда тасвирлаб бериш мумкин. Шундай қилиб, цитология фани малакали биологлар умумбиологик тайёргарлигидаги асосий пойдеворлардан бири ҳисобланади.

1.1. Фаннинг мақсади ва вазифалари.

Фан талабаларни прокариот ва эукариот хужайраларнинг тузилиши асослари, эукариот хужайра эволюцияси, хужайраларнинг тузилиши ва хусусиятлари билан таништиради. Булардан ташқари цитология хужайраларнинг компартментализацияси жараёнлари, компартментларнинг юзага келиши ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги сингари билимларни умумлаштиришни кўзда тутди.

1.2. Фанни ўзлаштирилган талабанинг малакавий даражалари

Фаннинг назарий асосларини мукамал билишлари керак. Организмларнинг кўпайишини амалга оширувчи хужайраларни юзага келиши ва ўсиши, ривожланиш ҳамда шаклланиш босқичларини. Организмларни хилма-хиллиги уларни ҳаётий жараёнлари, ривожланиш ва малекуляр-генетик асосларини, кўпайиш хусусиятларини мукамал *билишлари керак*.

Хужайра ва унинг тузилиши, хужайра цитоплазмасининг таркиби, субмикроскопик тузилиши, хужайра органеллалари ва функцияларини, хромосома ва мағизнинг (ядро), тузилиши хужайранинг митоз бўлинишини микроскоп остида кўриш ва аниқлаш, интерфаза ва ишчи ҳолатлари, хужайранинг оддий ва мураккаб бўлинишлари ҳақида *кўникмаларига эга бўлиши керак*.

1.3. Фаннинг ўқув режасидаги бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги

“Цитология” фани асосий умумқасбий фани ҳисобланади. Чунки ҳамма тирик мавжудотларнинг тузилиши бирлиги бўлган хужайранинг тузилишини ўрганмай туриб, бошқа биология соҳасидаги фанларни эгаллаб бўлмайди. Шунинг учун бу фан ўқув режасида режалаштирилган математик ва табиий (олий математика, информатика ва ахборат технологиялари, биометрия, физика, анорганик ва аналитик кимё, органик кимё, физик ва коллоид кимё), умумқасбий (зоология, ботаника, гистология, генетика, индивидуал ривожланиш биологияси, биокимё, микробиология ва вирусология, ўсимликлар физиологияси, одам ва ҳайвон физиологияси, биофизика, биотехнология, эволюцион таълимот) ва ихтисослик (гидрокимё, балиқ маҳсулотларини қайта ишлаш ва маркетинг хизмати, балиқлар касалликлари) фанларини ўзлаштиришда бу фандан етарли билим ва кўникмага эга бўлишлари талаб этилади.

Фанни ўқитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялардан фойдаланиш.

Фаннинг ўқитиш турлари- дастурда кўрсатилган мавзулар маъруза, амалий машғулоти шаклида олиб борилади. Шунингдек мустақил иш мавзулари ҳам берилади. Фаннинг замонавий педагогик услублар “Кластер”, “Бумеранг”, “Дебат”лар тарзида ўтиш ҳам кўзда тутилгандир. Кўргазмали ўқув қуроллари, кадаскоп, мултимедия, микроскоп, кесмалар препаратлар ёрдамида олиб борилади. Фанни ўқитишда талабаларнинг билимини баҳолаш тизимини қўллаб аниқлашга асосланган замонавий педагогик технологиялар қўлланилади. Талабаларга ушбу фанни ўқитишда компьютер технологиясидан, Internet маълумотларидан маъруза материаллари сифатида, амалий машғулотларда, ҳамда тест синовлари тўпламидан фойдаланиш тавсия этилади.

**Фандан ўтиладиган мавзулар ва улар бўйича машғулоти турларига ажратилган
соатларнинг тақсимооти**

№	Фаннинг бўлими ва мавзуси, маъруза мазмуни	Соатлар			
		Жами	Маъруза	Амалий машғулоти	Мустақил таълим соати
1	Кириш. Цитология фанига кириш. Микроскоп, тузилиши ва у билан ишлаш қоидалари.	4	2	2	
2	Амалий машғулотларга тайёргарлик қўриш	20			20
3	Ҳужайра назариясини яратилиш тарихи	2			2
4	Ўсимлик ва ҳайвон ҳужайрасининг фарқи ва ўхшашлик белгилари.	2			2
5	Ҳужайра типлари Прокариот ва эукариот ҳужайраларнинг микроскопик тузилиши.	6	2	2	2
6	Ҳужайраларнинг шакли ва ўлчами	2		2	
7	Цитоплазма. Ҳужайранинг вакуоляр тизими. Ҳужайранинг ташқи аппарати.	4	2	2	
8	Митохондриянинг тузилиши ва вазифаси. Митохондрия мембранасининг тузилишини ҳайвон ҳужайралари мисолида ўрганиш.	8	2	2	4
9	Ҳужайра пластидаларининг таърифи, гуруҳлари, ультраструктуравий ва кимёвий тузилиши	4	2		2
10	Пластидалар ва уларда фотосинтез жараёнини амалга ошириш. Пластид хиллари	8	2	2	4
11	Эндоплазматик ретикулум (ЭПР) Эндоплазматик ретикулумнинг органоидлар ўртасидаги моддалар ҳаракатини таъминлаш аълоқасини ўрганиш	4	2	2	
12	Гольжи аппарати.	4	2	2	
13	Лизосомалар. Лизосомаларнинг ҳужайрадаги ҳазм қилиш жараёнини ўрганиш.	4	2	2	

14	Ўсимлик ҳужайраси вакуоласи. Вакуола ширасининг кимёвий таркибини ўрганиш	4	2	2	
15	Мембранага эга бўлмаган органеллалар Мембранасиз органеллалар.	6	2	2	2
16	Секрет моддаларнинг ҳужайрадан ажралишини ўрганиш.	6		2	4
17	Икки мембранали ярим автоном органоидлар.	2		2	
18	Ҳужайра ядроси Ядро – кимёвий таркиби ва ҳужайра ҳаётидаги аҳамияти.	8	2	2	4
19	Ҳужайра репродукцияси. Эндорепродукция.	4	2	2	
20	Ҳужайраларнинг ҳаракатланиши, таъсирланиши, шикастланиши. Некроз ходисасини ўрганиш. Апоптоз ходисасини ўрганиш.	6	2	4	
21	Ҳужайранинг қайта тикланиши ва умрининг давомийлиги. Митоз. Митоз фазалари. Мейоз. M_1, M_2	10	2	4	4
22	Хромосомаларининг мутацияларга учраши ва унинг оқибатлари. Хромосома морфологияси, типлари.	8	2	2	4
23	Ҳужайра эволюцияси	4			4
Жами:		130	32	40	58

2.ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ МАЗМУНИ

2.1 МАЪРУЗА МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ МАЗМУНИ

2.1.1. Кириш. Цитология фанига кириш.

Цитологиянинг ривожланиш тарихи ҳақида қисқача маълумот. Цитологиянинг Ўзбекистонда ривожланиш тарихи. Фанга умумий тавсиф ва унинг биологияга доир бошқа фанлар орасида тутган ўрни, мақсади вазифалари. Цитологик объектлар ва усуллар.

2.1.2. Ҳужайра типлари

Цитологиянинг текшириш объектлари. Ҳужайра тирикликнинг элементар бирлиги. Ҳужайра назариясининг яратилиши ва аҳамияти. Ҳужайра тузилишининг умумий қонуниятларни тадқиқ этишда солиштирма цитологик йўналишлар. Ҳужайраларнинг микроскопик ва субмикроскопик тузилиши.

2.1.3. Цитоплазма. Ҳужайранинг вакуоляр тизими.

Цитоплазма. Цитоплазма матрикси. Цитоплазматик мембрана. Мембранология. Биологик мембрана эволюцияси ички ва ташқи мембраналар. Ҳужайра мембранасининг липид, оксил ва углеводлари уларнинг ҳужайра фаолиятидаги роли. Ташқи мембрана плазмолемма. Кимёвий таркиби ўсиши, вазифалари, Доимий ҳужайравий алоқалар. Адгезия ҳодисаси. Ҳужайралар аро боғланишлар. Плазмолемма ҳосилалари: микротукчалар, киприкчалар, хивчинлар. Ҳужайра қобиғи, унинг ҳосил бўлиши, кимёвий таркиби, тузилиши ва хусусиятлари.

2.1.4. Митохондриянинг тузилиши ва вазифаси.

Митохондрия. Умумий таърифи, сони, шакли, катталиги. Митохондриялар энергия алмашинув органеллари. Уларнинг келиб чиқиши, биокимёвий таркиби, тузилиши: вазифаларидаги ўхшашлик ва фарқлар. Вазифаси. Биогенези. Автономлиги ва унинг нисбийлиги.

2.1.5. Хужайра пластидаларининг таърифи, гуруҳлари, ультраструктуравий тузилиши ва кимёвий тузилиши.

Пластидаларнинг умумий таърифи. Уларни гурӯҳлаш. Морфологик белгиларига қараб турланиши. Ультратураструктураси, кимёси ва мембраналарнинг ўзига хос хусусиятлари. Вазифалари. Ярим автономлиги унинг сабаблари, ахамияти. Цитоплазматик ирсийлик.

2.1.6. Пластидалар ва уларда фотосинтез жараёнининг амалга ошириши.

Хужайра пластидаларининг таърифи, гуруҳлари, ультраструктуравий ва кимёвий тузилиши. Фотосинтетик пигментлар.

2.1.7. Эндоплазматик ретикулум (ЭПР)

Силлиқ ва донатор эндоплазматик ретикулум. Тузилиши, вазифаси ва фарқлари. ЭПР нинг ядро ташқи мембранаси билан алоқаси. Унинг мембранасиз органоидлар орасида тутган ўрни, сферосомалар, пероксисомалар.

2.1.8. Гольджи аппарати.

Гольджи аппаратининг тузилиши вазифаси ва хужайрадаги ахамияти. Хужайрада моддалар алмашинувдаги асосий “созловчи” аппарат. Вакуляр тизим метоболизм жараёнлари асосчиси.

2.1.9. Лизосомалар.

Лизосомалар. Таркиби, кимёвий ва функционал таърифи. Лизосомаларни морфологик гуруҳлаш (бирламчи, иккиламчи ва ўзгарган шакллари). Лизосомаларнинг хужайра ичида овқат хазм қилиш жараёнидаги роли.

2.1.10. Ўсимлик хужайраси вакуоласи.

Ўсимлик вакуолалари. Вазифасининг турли туманлиги. Вакуляр тизим қисмлари ўзаро боғлиқлиги.

2.1.11. Мембранага эга бўлмаган органеллалар

Умумий таъриф. Гуруҳлари: микрофиламентлар, оралик филоментлар, микроайчалар. Цитоплазма микроайчалари, центриола, центрола даври. Бўлиниш урчуғи, микроайчалари. Базал таначалар. Ультраструктураси, кимёси ва вазифалари.

2.1.12. Хужайра ядроси

Хужайра ядросининг эволюцияси. Ядронинг таркибий қисмлари, уларнинг структураси, кимёси, вазифалари. Ядронинг хужайра тўғрисидаги генетик ахборотни сақловчи жой сифатидаги роли, уни амалга ошириш ва қайта тиклаш фаолияти. Бўлинаётган хужайрадаги ҳолати, хужайранинг ҳаёт фаолиятидаги ўрни. Ядро қобиғи. Ядро қобиғининг ахамияти. Ядро қобиғининг таркибий қисмлари: ташқи ва ички мембраналар. Нуклеоплазма (ядро шираси). Кимёвий таркиби ва вазифалари. Ядроча–хужайра рибосомаларининг ҳосил бўлиш маркази. Ядро ультраструктуравий тузилиши, физик- кимёвий таркиби, хоссалари, вазифалари. Ядрочалар сони-хужайра метаболизми даражасининг кўрсаткичи. Физиологияси ва кимёси. Ядрочанин РНК ва ДНК лари. Ядрочанин ультраструктураси. Турли функционал ҳолатларда ядрочанин тузилиши. Хужайра бўлинаётганда ядрочанин тақдири.

2.1.13. Хужайра репродукцияси.

Ўсимлик хужайрасининг сунъий репродукцияси. Кариотип ва унинг ўзгариши, полиплоидия, анеуплоидия ҳолатларининг юзага келиши.

2.1.14. Хужайраларнинг ҳаракатланиши, таъсирланиши, шикастланиши.

2.1.15. Хужайранинг қайта тикланиши ва умрининг давомийлиги.

Хужайра ҳаёт фаолияти учун умрининг давомийлиги Хужайралар умрининг узунлиги ва қариш механизми. Политен ва лампасимон тукчаларга ўхшаш хромосомаларининг шаклланиши ва ахамияти. Хужайра патологияси.

Хужайранинг митотик ва ҳаётий цикли ҳақида тушунча. Итерфаза даври (пересинтетик, рестрикциявий нукта, синтетик ва постсинтетик давлари) ва митотик даври (профаза, метафаза,

анафаза, телофаза). Хужайранинг бўлиниш ва ўсишини бошқарувчи механизм. Митознинг биологик ва генетик аҳамияти. Митоз хиллари: ортомитоз ва плевромитоз.

Амитоз. Унинг амалга ошиши, хусусиятлари ва митоздан фарқи.

Мейоз (редукцион бўлиниш) Мейоз шакилларининг эволюцияси. Ҳазалари ва унинг моҳияти. Хромосомалар конъюгацияси ва кросинговер жараёнларининг аҳамияти. Мейозда синаптенимал комплекснинг роли.

2.1.16. Хромосомаларининг мутацияларга учраши ва унинг оқибатлари.

Хроматин. Хромосома цикли. Таркибий функционал диффуз ва конденсацияланган ҳолат. Уларнинг ҳужайра ҳаёт фаолиятидаги ўрни. ДНК нинг хромосомалар таркибидаги тузилиши. Оксилларнинг ҳужайра ядроси ичида маълум бир ДНК структурасининг шайлланишдаги роли. Митотик хромосомалар морфологияси, ультраструктураси. Хромосомаларининг тузилиши: хроматидлар, хромонемалар, теломерлар, центромерлар, бирламчи ва иккиламчи беобоғлар. Хромосомалар тури: метацентрик, субметацентрик, макроцентрик, йўлдош хромосомалар. Эухроматин ва гетерохроматин. Кариотип ва идиограмма ҳақида тушунча. Хроматиннинг ядро қобиғи ва цитоплазма билан боғлиқлиги ва алоқаси.

2.2. Амалий машғулотлар мазмуни.

2.2.1. Микроскоп тузилиши ва иш принципи. (2 соат)

2.2.2. Прокариот ва эукариот ҳужайраларининг микроскопик тузилиши. (2 соат)

2.2.3. Ҳужайраларнинг шакли ва ўлчами. (2 соат)

2.2.4. Ҳужайранинг ташқи аппарати. Гликокаликслар. Киприкчалар, микротукчалар. Трихомалар. (2 соат)

2.2.5. Митохондрия мембранасининг тузилишини ҳайвон ҳужайралари мисолида ўрганиш. . (2 соат)

2.2.6. Пластида хиллари. (2 соат)

2.2.7. Эндоплазматик ретикулимнинг органоидлар ўртасидаги моддалар ҳаракатини таъминлаш алоқасини ўрганиш. (2 соат)

2.2.8. Лизосомаларнинг ҳужайрадаги ҳазм қилиш жараёнини ўрганиш. (2 соат)

2.2.9. Вакуола ширасининг кимёвий иаркибини ўрганиш. (2 соат)

2.2.10. Эндоплазматик тўр, пероксисома, сферасомалар. Гольжи аппарати. Лизосомалар. (2 соат)

2.2.11. Секрет моддаларнинг ҳужайрадан ажралишини ўрганиш. (2 соат)

2.2.12. Икки мембранали ярим автоном органоидлар. (2 соат)

2.2.13. Мембранасиз органеллалар. (2 соат)

2.2.14. Ядро-кимёвий таркиби ва ҳужайра ҳаётидаги аҳамияти. (2 соат)

2.2.15. Хромосома морфологияси, типлари. (2 соат)

2.2.16. Митоз. Митоз Ҳазалари. (2 соат)

2.2.17. Мейоз. M_1 , M_2 . (2 соат)

2.2.18. Эндорепродукция. (2 соат)

2.2.19. Некроз ҳодисасини ўрганиш. (2 соат)

2.2.20. Апоптоз ҳодисасини ўрганиш. (2 соат)

3. Мустақил таълимни ташкил этишнинг шакли ива мазмуни

“Цитология” Ҳанини ўрганувчи талабалар аудиторияда олган назарий билимларини мустаҳкамлаш ва бажарган амалий машғулотларни бажаришда кўникма ҳосил қилиш учун мустақил таълим тизимига асосланиб мустақил иш бажарилади. Мустақил иш учун белгиланган мавзуларни талабалар мустақил равишда кўрсатилган адабиётлар ёрдамида ўзлаштириб жорий, оралиқ назорат шаклида ёки дарсликлардан ташқари вақтда реферат ёки мулоқат тарзида топширадилар.

Талаба мустақил ишни тайёрлашда муайян фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

Талаба мустақил ишни тайёрлашда муайян фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади:

амалий машғулотларга тайёргарлик кўриш;
дарслик ва ўқув қўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;
тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;
махсус адабиётлар бўйича фан бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;
амалий машғулотларга тайёргарлик кўриш;
янги техникалар, технологиялар билан ишлашни ўрганиш;
талабанинг ўқув-илмий –тадқиқот ишларини бажариш билан боғлиқ бўлган фанлар бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш.

№	Мустақил таълим мавзулари	Дарс соатлари ҳажми
1	Амалиёт машғулотларига тайёргарлик	20
2	Ҳужайра назариясини яратилиш тарихи	2
3	Ўсимлик ва ҳайвон ҳужайрасининг фарқи ва ўхшашлик белгилари	2
4	Ҳужайра типлари	2
5	Митохондриянинг тузилиши ва вазифаси.	4
6	Ҳужайра пластидаларининг таърифи, гуруҳлари, ультраструктуравий ва кимёвий тузилиши	2
7	Пластидалар ва уларда фотосинтез жараёнининг амалга ошиши.	4
8	Мембранага эга бўлмаган органеллалар Мембранасиз органеллалар.	2
9	Секрет моддаларнинг ҳужайрадан ажралишини ўрганиш.	4
10	Ҳужайра ядроси	4
11	Ҳужайранинг қайта тикланиши ва умрининг давомийлиги.	4
12	Хромосомаларининг мутацияларга учраши ва унинг оқибатлари.	4
13	Ҳужайра эволюцияси	4
Жами:		58

Рейтинг жадвали

Назорат тури	ОН №1	ОН №2	ЯН
Ўтказилиш вақти	6-7- ҳафта	13-14- ҳафта	20- ҳафта
Назорат Шакли	Ёзма* (2 тадан назарий ва 1 тадан амалий топшириқ берилади)	Оғзаки (2 тадан назарий ва амалий топшириқ расмларини тўғри чизилиши)	Ёзма (2 тадан назарий ва 1 тадан амалий топшириқ берилади)

**Изоҳ. Назоратлардаги ҳар бир савол ва топшириқлар қуйидаги баҳолаш мезонлари бўйича баҳоланади.*

Рейтинг тизими асосида талабалар билимини баҳолаш мезонлари

а) “аъло” баҳо учун талабанинг билим даражаси қуйидагиларга жавоб бериши лозим:

- Ҳулоса ва қарор қабул қилиш;
- Ижодий фикрлай олиш;
- Мустақил мушоҳада юрита олиш;

- Олган билимларини амалда қўллай олиш;
 - Моҳиятини тушуниш;
 - Билиш, айтиб бериш;
 - Тасаввурга эга бўлиш;
- б) “**яхши**” баҳо учун талабанинг билим даражаси қуйидагиларга жавоб бериши лозим:
- Мустақил мушоҳада юрита олиш;
 - Олган билимларини амалда қўллай олиш;
 - Моҳиятини тушуниш;
 - Билиш, айтиб бериш;
 - Тасаввурга эга бўлиш;
- в) “**қоникарли**” баҳо учун талабанинг билим даражаси қуйидагиларга жавоб бериши лозим:
- Моҳиятини тушуниш;
 - Билиш, айтиб бериш;
 - Тасаввурга эга бўлиш;
- г) талабанинг билим даражаси “**қоникарсиз**” деб қуйидаги ҳолларда баҳоланади:
- Аниқ тасаввурга эга бўлмаслик;
 - Жавобларда хатоликларга йўл қўйилганлик;
 - Билмаслик.

5.ИНФОРМАЦИОН-УСЛУБИЙ ТАЪМИНОТ

• 5.1. АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР

№	Муаллиф, адабиёт номи, тури, нашриёт, йили, ҳажми	Кутуб-хонада мавжуд нусхаси
1.	Karp G . Cell and molecular biology. USA, 2013. – P. 850.	Электрон
2.	Билич Г.Л. Биология, Цитология, Гистология, Анатомия человека.	Электрон
3.	Санкт- Петербург, «Союз». 2001. - 444 с.	2

5.2. ҚЎШИМЧА АДАБИЁТЛАР

№	Муаллиф, номи, тури, йили, ҳажми, сақланиш жойи, электрон адреси	
•	Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. Тошкент, Ўзбекистон нашриёти, 2017.	
•	Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Тошкент, Ўзбекистон нашриёти, 2017.	
•	Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент, Ўзбекистон нашриёти, 2016.	
•	Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик- ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Тошкент, Ўзбекистон нашриёти, 2017.	
•	Ченцов Ю.С. Введение в клеточной биологии. М., МГУ, 2014.	
•	Заварзин А.А., Харазова А.А. Основы общей цитологии. Л. ЛГУ, 1982.	

•	www.maik.uz	
•	www.ziyonet.uz	
•	www.google.uz	
•	www.edu.uz	

Ишчи ўқув дастурга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида

_____ ўқув йили учун ишчи ўқув дастурига қўйидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилмоқда:

Ўзгартириш ва қўшимчаларни киритувчилар:

(профессор-ўқитувчининг И.Ф.О.)

(имзоси)

Ишчи ўқув дастурга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар “Табиий фанлар” факультети Илмий-услубий Кенгашида муҳокама этилди ва маъқулланди (_____ йил “___” _____ даги “_____” - сонли баённома).

Факультет Илмий-услубий

Кенгаши раиси:

б.ф.д. Х. Қўшиев

TEST

Ким биринчи бўлиб тухум хужайраларнинг мураккаб тузилишини тасвирлайди ва уруғланган хужайрани ўрганади.
К.М. Бэр
Я. Е. Пуркинъе
А. М. Шумлянскийнинг
К. Ф. Вольф
Фанга биринчи марта митоз атамасини киритган олим.
Д. Чистяков
М. Шлейхер
П. И. Переменко (1833)
А. Рема
Кариокинез атамаси фанга ким томонидан ва қачон киритилди.
М. Шлейхер 1878 йили
Д. Чистяков (1874)
П. И. Переменко (1833)
А. Рема 1841 йили
Амитоз бўлиниш биринчи марта хайвон хужайраларида ким томонидан ўрганилган.
А. Рема 1841 йили
М. Шлейхер 1878 йили
Д. Чистяков (1874)
П. И. Переменко (1833)
Амитоз бўлиниш биринчи марта ўсимликларда ким томонидан ўрганилган.
Э. Страсбург 1882 йили
А. Рема 1841 йили
М. Шлейхер 1878 йили
Д. Чистяков (1874)
Профаза, метафаза, анафаза атамасини фанга олиб кирган олим бу
Страсбург
Чистяков
Шлейхер
Рема
Телофаза термини фанга ким томонидан олиб кирилган.
Гейденгейн
Чистяков
Шлейхер
Рема

Nazorat savollari

1. Sitologiyada qo'llaniladiga qanday uslublar bor?
Fiksasiyalangan hujayralarni o'rganish uslubi?
2. Elektron mikroskopiya uslubi?
3. Prokariot hujayra qanday tuzilgan?
4. Prokariot va eukariot hujayralarni solishtiring
5. Sitolojiya oldida turgan qanday muammolar bor?
6. Qanday hujayra shakillarini bilasiz?
7. Hujayra shakillarining o'zgarishi nimalarga bog'liq deb o'ylaysiz?
8. Shakli o'zgaruvchan va doimiy shakilga ega bo'lgan
9. Hujayraning membranasiz organoidlariga nima kiradi?
10. Mikrofilamentlar, mikrofibrillar, mikronaychalarga umumiy tavsif bering.
11. Bazal tanachalar kiprikcha va xivchinlarning tuzilishi va hosil bo'lishi
12. Hujayraning ikki membranali organoidlariga nima kiradi?
13. Mitoxondriyada ATF sintezining borishi.
14. Nima uchun mitoxondriyalar hujayraning yarim avtonom strukturalari
15. Oksiosoma nima?
16. Mitoxondriyalarning hosil bo'lish nazariyalarini tushuntiring?
17. Nima uchun mitoxondriyaning avtonomligi nisbiy hisoblanadi?
18. Plastidalar-ularni strukturalari va turlari
19. Plastidalarining vazifalari va biologik ahamiyati haqida gapiring
20. Prokariot hujayralarning fotosintezlovchi tuzilmalari qanday tuzilgan?
21. Nima uchun plastidalar hujayraning yarim avtonom strukturalari deb ataladi?
22. Plastida va mitoxondriyalar kelib chiqishi haqidagi endosimbioz nazariya
23. Silliqlik endoplazmatik to'r tuzilishi va vazifasi?
24. Donador EPT tuzilishi va vazifasi. Ergastoplazma?
25. Qanday tipdagi vakuolalarni bilasiz?

26. Qanday vazifalarni bajaradi?
27. Vakuola qanday hosil bo'ladi?
28. Vakuolaning osmos va turgordagi ahamiyatini tushuntiring
29. Qaysi olim EPT ning tuzilmasi va vazifalarini o'rgangani uchun Nobel mukofatiga sazovor bo'ldi?
30. EPT dagi garmo sintezi va kalsiy deposini tushuntiring
31. Golji apparatining lipidlar transportidagi vazifasini tushuntiring.
32. Nima sababdan GA ti oqsil, lipid, vapolisaxaridlar sintezlanmaydigan hujayralarda ham uchraydi?
33. Lizosomalar harakati qanday amalga oshadi?
34. Lizosomalarning hujayra ichi maxsulotlari o'zgarishidagi ishtirokini tushuntiring
35. Peroksisomalar guruhi? (o'simliklarda)
36. Sferasomaning kimyoviy tarkibi?
37. Hujayra tuzilishi?
38. Prokariot va eukariot hujayralar?
39. Prokariot hujayralarning ahamiyati?
40. Hujayra qanday organioidlardan tashkil topgan?
41. Hujayra kiritmalari?
42. Hujayralarning bo'linishi?
43. Karatinoidning organizmdagi roli?
44. Josef Pristli ishlari?
45. Fotosintezning amalga oshishi?
46. Mitoxondriya va plastidalarining bajaradigan vazifalaridagi o'xshashlik va farqlarni izohlang?

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar

1. Gupta K.K. Cell. University of Delhi
2. Karp G . Cell and molecular biology. USA, 2013. – P. 850.
3. Билич Г.Л. Биология, Цитология, Гистология, Анатомия человека. Санкт-Петербург, «Союз». 2001. - 444 с.

Qo'shimcha

1. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va oluyjanob halqimiz bilan birga quramiz. Toshkent O'zbekiston nashriyoti, 2017.
2. Mirziyoyev Sh. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash –yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent O'zbekiston nashriyoti, 2017.
3. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent O'zbekiston nashriyoti, 2016.
4. Mirziyoyev Sh. M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent O'zbekiston nashriyoti, 2017
5. Ченцов Ю.С. Введение в клеточной биологии. М., МГУ, 2014.
6. Заварзин А.А., Харазова А.А. Основы общей цитологии. Л. ЛГУ, 1982.

www.maik.uz

www.ziyonet.uz

www.google.uz

www.edu.uz

